





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.  
CFMAGL 1.7.250











Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.  
CFMAGL 1.7/250





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.  
CFMAGL 1.7.250





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.  
CFMAGL 1.7.250

1.7.250

1 L.7.











XIV  
BAVH.  
P. Dr.

8

707

1.11







ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  
THEATRIBO-  
TANICI CASPARI  
BAVHINI BASILEENS.  
ARCHIATRI ET  
Profess.ordin.

1  
7  
250

IN QVO  
PLANTÆ SVPRÆ SEXCENTÆ  
*ab ipso primùm descriptæ cum plurimis figuris  
proponuntur.*



Frankofurti ad Mœnum,  
Typis Pauli Jacobi, impensis Ioannis Treudeli.  
Anno MDCXX.



THEATRUM  
TANICICASPARI  
BAVINI BASILENSIS  
ARCHIATRI ET  
Prof. ordin.

PLANTAE SVPERAE EXCELSAE  
et proprimis et scriptis plantis  
proprimis.



Francfortis Mocunum  
Typogr. Pauli Jacobus impensis Joannis Trephellii.  
Anno MDCXX.





REVERENDISSIMI PER-  
ILLVSTRIS ET GENEROSI  
DOMINI,

D. ERDTMANNI LIB. BARONIS IN PVTBVS;  
ET ORDINIS EQVITVM DIVO IOHAN. SACROR. COMMENDA-  
TORIS IN WILDENBVRCH, &c. FILIO

PERILLVSTRI ET GENEROSO  
DOMINO,

D. PHILIPPO LVDOVICO LIB. BARONI IN PVTBVS, &c.

Hunc THEATRI sui BOTANICI ΠΡΟΔΡΟΜΟΝ

CASPARVS BAVHINIVS BASILEENS. ARCHIATROS OBSERV. MON.  
ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΠΟΝΩ offert.

Epistola Dedicatoria.



ALOMONEM populi Iudaici regem, PERILLVSTRIS & GENEROSI  
DOMINE BAKO, de omnium stirpium natura commentarios scri-  
pisse, & quidem pro sapientia quam diuinitus acceperat, (omnium  
priscorum, etiam Aegyptiorum sapientiam longe post se relinquirente)  
sacra docet pagina: ut vel minima ac vilissima naturæ opera consi-  
derarit, ita ut à Cedro Libani, vsque ad Hyssopum quæ è pariete pro-  
gignitur, disputarit. Quos in templi Hierosolymitani vestibulo diu asseruatos, Ezechias  
rex, vna cum iματάων libris, sustulisse asserunt, eo quod animaduertisset, egros, ad hos

);( 2 tanquam



E P I S T O L A

à præ-



# DEDICATORIA.

à præstantiss. vereque modesto & ingenuo D. Joachimo Volschouio, moribus & vita  
præcunctibus, instructus fueris. Non immerito ergo illustriss. parentibus & gaudio &  
solatio, patria & Reip. feliciter te natum suo tempore abunde testatum facies: ad quod  
ab vno & trino, porro fœlicissima quæque precor: & vt hunc laborem meum, serena  
hilarique fronte suscipias, tuearis, & me porro tuo fauore prosequi digneris, opto, rogo-  
que. Basilee Jdib. Martij MDCXX.



XC 5

AD





## AD MEDICINÆ STUDIOΣ.



IGNA fane est, CANDIDE Lector, Galeni i. de Antidotis s. sententia, quæ ab omnibus Medicis perpendatur. Medicus ait omniū STIRPIVM, si fieri possit, peritiam habeat, consulo, sin minus, plurium saltem quibus frequenter vtimur. Nam qui studio Medico operam dare in animo habet, nil in artis operibus laude digni præstabit, si HERBARVM cognitione destituatur : tam enim medico necessaria

*ὡς ἐχέοντες εἶναι χωρὶς αὐτὸς ἰατρικὴν ὁρῶς, vt Oribasius scribit : siquidem partem Medicinæ potissimam semper complexa sit: Homeri Scholiastæ ἡ ἀρχαία ἰατρικὴ ἐν βόταναις ἦ: seu vt Seneca, Medicina quondam paucarum herbarum scientia fuit. Et apud Plutarchum Tryphon asserit, Chironem & Cadmum Agenoridem, qui duo primi Medicinam exercuisse credebantur, ægros suos solis herbis & radicibus sanasse. Sic cum Eurypylus apud Homerum ab Alexandro sagitta sauciatus fuisset, vulnus eius Patroclus ita curauit.*

*αἰμασι πιλαμίδων  
Νίτ' ὅδ' ἐξελιγρῶς, ἐπὶ δ' ἐρεζορ βάλαν πικρὴν  
χρὶ π' διατρέψα: ὅδ' ὠνίφατον.*

Hæc & similia mecum perpendens, nunc ab annis quadraginta quatuor, studium Botanicum, ea qua fieri potuit diligentia excolui, nullis laboribus, nullis sumptibus parcens, ne quidem molestas peregrinationes intermittens, quo & plantarum cognitionem, quantum fieri humanitus licet, solidam mihi compararem: easdem colligerem & collectas asseruarem, & cum authorum descriptionibus conferrem: vnde factum, vt domi meæ in horto meo sicco supra quatuor millia Plantarum demonstrare possim, quod quam plurimi & Doctores & Studiosi diuersarum nationum testari poterunt, vt qui eas singulas, à me ipsis demonstratas, vtique frequenter soleo, viderint. Et ad huius fidam cognitionem Authores etiam consulendi fuere, quare omnes quotquot hætenus habere potui, qui de herbis scripsere, vt & Florilegia, mihi comparaui. At quia non omnis fert omnia tellus, infinitis literis ad clarissimos viros datis, vt alibi plenius, suppellectilem meam Herbariam auxi, & ex ipsorum literis non pauca ad rem facientia, cognoui. Quare ne talentum à Domino mihi concreditum defoderem, sed Spartam quam nactus sum exornarem, ante annos vigintiquatuor, in iuuenum gratiam Phytopinacis partem primam proposuimus, in quo plantas sparsim ab authoribus descriptas, certa methodo proposuimus, & quidem supra bis mille & circiter quinquagentos: cuius libri exemplaria cum fuerint vendita & distracta, proxime si Deus volet, Pinacem Theatri nostri Botanici, qui loco Phytopinacis erit, dabimus, vna cum synonymiis herbarum supra quinque millia, conuenienti methodo disposita, quo eo Studiosi in Herbarationibus vti possint. Sic & Matthiolum emaculatum cum synonymiis & multarum nouarum Plantarum auctario, ante annos viginti duos dedimus: & ante annos nouendecim in historiam Lugduni suppresso nomine editam, animaduersiones scripsimus: &

ante



ante septennium Tabernæmontanus, plurimis & plantis & medicamentis additis lo-  
cupletior redditus excusatus fuit. Nunc vero PRODROMVM THEATRI nostri BOTANICI  
damus, in quo supra sexcentæ plantæ à me primum descriptæ, exhibentur: & licet ea-  
rum aliquæ apud C. Clusium, & nobiliss. Fabium Columnam Lynceum, & per paucæ in  
horto Eystadiensi reperiantur, nostris tamen adiecimus, quia eas in supra dictis libris,  
antequam horum scripta prodirent, descripsimus. Figuras quas sculpi curauimus, tot  
quot ad manus fuere iam absolutæ adiecimus, sperantes futurum, vt & reliquæ THEA-  
TRO addendæ, sculpantur. Hoc labore nostro, iuuandi studio instituto, vt ere, donec  
Theatrum nostrum Botanicum accipias. Nam cum & Iohannis Bauhini Illust. Ducis  
Wirtembergici Archiatri, fratris mei pie defuncti opus præclarum sub prælo sit: & et-  
iamnum Romæ, historia plantarum Mexiocanarum cum figuris excudatur, & ad me-  
dium absoluta sit, vt ex literis clariss. Fabii Columnæ cognoui, hæc opera expectare a-  
nimus est, quo, si DEVS volet, in Theatro nostro, & vno volumine omnes omnium plan-  
tarum, à quibuscunque authoribus propositarum descriptiones, & quidem methodice,  
omnibusque superuacuis recisis, tibi, Candide Lector, exhibere valeamus, sicque per-  
fectum opus accipias.

His interim in rem tuam vt ere, auctori faue, & si potes plantarum transmissione  
iuuato: & si quæ minus recte proposita animaduertaris, pro humanitate tua moneto:  
monitus non solum gratias habebo, sed etiam lubens, quod homines ingenui, & fate-  
bor & sententiam mutabo. Nam vt recte Galenus, χαλεπὸν ἀνθρῶπον ὄντα, μὴ δίστασθαι, ἐν  
πολλοῖς, ἅμα δὲ ὅλως ἀγνοήσαντα, τὰ δὲ κακῶς κείοντα, τὰ δὲ ἀμελείῃσιρον γράψαντα. Vnum addam, paginis  
titulum Theatri Botanici, me in scio, impositum esse, qui vel omittendus, vel Prodromi  
nomen præponendum erat. Nunc nomina eorum à quibus plantas accepimus subit-  
iamus, cum ingenuum deceat, per quos profecerit, fateri, quod hætenus fecimus, &  
porro, si DEVS volet, facturi sumus. Viue & vale.

NOMI-



**NOMINA EORVM QVORVM OPERA**  
*in prodromo adiutifuiamus.*

**A** Clotius Medicus Alftrodamenfis.  
**A**rnoldus Gillenius, Ducis Megapolitani  
 Medicus.  
 Bernhardus Paludanus, Medicus Enchufianus.  
 Cafpar Weckerlinus, p. m. Argentinenfis Medi-  
 cus.  
 Cafpar Bartolinus, Hafniae Medicinæ Professor.  
 David Vafmarus, p. m. Lubecenfis Medicus.  
 Daniel Lotitzius, Paterniacenfis Medicus.  
 Euerhardus Vorftius Professor Lugd. Batauorum.  
 Fabius Columna Lyncæus.  
 Fridericus Meyer, p. m.  
 Ferrandes Imperatus, Pharmacopæus Neapoli-  
 tanus.  
 Georgius Rumbaum Medicus Vratislauienfis.  
 Henricus Heyl Medicus Dantifcanus.  
 Honorius Belli Medicus in Creta.  
 Iacobus Albinus, Medicus Hamburgenfis.  
 Iacobus Antonius Cortufus, p. m. Patricius Pata-  
 uinus & hortipræfectus.  
 Iacobus Cargillus, Medicus in Scotia.  
 Iacobus Zuingerus, p. m. Medicus Bafileenfis.  
 Iacobus Hagenbachius, Bafil. Med. Studiofus.  
 Ioachimus Burferus, Medicus Annæbergenfis.  
 Ioannes Bauhinus, p. m. Wirtembergenfis Ar-  
 chiater.  
 Ioannes Fleifferus Vratislau. D. qui in Virginia  
 obiit.

Ioannes Francus, Senior Medicus Camicenfis.  
 Ioannes Henricus Churterus, p. m. Medicus Bafi-  
 leenf.  
 Ioannes Neudorffer, Medicus Norinbergenfis.  
 Ioannes Pona, Pharmacopæus Veronenfis.  
 Ioannes Rudolphus Saltzman, Poliater & Profes-  
 for Medicinæ Argentinæ.  
 Ioannes Sigfridus, Medicinæ Professor Helmfta-  
 dij.  
 Laurentius Rosenau, Pharmacopæus Linebur-  
 genfis.  
 Laurentius Scholtzius Senior, p. m. Medicus Vra-  
 tislau.  
 Leonhardus Doldius, p. m. Medicus Norinber-  
 genfis.  
 Ludouicus Furer Senator Northufanus.  
 Ludouicus Iungermannus, Professor Gieffanus.  
 Matthias de Lobel, p. m. Botanographus An-  
 glia.  
 Matthias Lifterus, Medicus Londinenfis.  
 Nicolaus Agerius, Phyfices Professor Argenti-  
 næ.  
 Nicolaus Contarenus, Patritius Venetus.  
 Olaus Worm, Professor Hafniae.  
 Pafchalis Gallus, Piétauienfis Medicus.  
 Philippus Stephanus Sprengerus, p. m. Pharmaco-  
 pæus Heidelbergenfis.  
 Samuel Sattler, Ducis Brunfvic. Medicus.

THEA-





THEATRI BOTANICI  
CASPARI BAVHINI BASI-  
LIENSIS ARCHIATRI  
PRODROMVS.

**P**LANTARVM vniuersalem historiam, in THEATRO, Deo clementer vitam  
viresque largiente, propositurus, hoc vero in libro, solum Plantarum à me pri-  
mo descriptarum, historiam expressurus, eandemque methodum, quam in Theatro, ob-  
seruaturus à GRAMINIBVS auspicari lubet.

LIBER PRIMVS.

DE GRAMINIBVS.

CAPVT I.



GRAMINIS differentias ducentas  
in THEATRO nostro, si Deo pla-  
cuerit, proponemus, in præsens ve-  
ro eas graminis species, quas à cæ-  
teris Botanicis prætermittas cense-  
mus, breuiter describere est animus, & id perspi-  
cuae & sine omni verborum lenocinio: tu DEVS  
cæptis clementer, quod supplex peto, aspira.

I. GRAMEN caninum vineale: radice est alba,  
tenui, repente, geniculis distincta, ex quibus fibræ  
capillares in terram defiguntur: culmos habet te-  
nuës, læues, geniculatos, in terram reclinatos: ex  
quorum geniculis singulis, folium, duas, tresve vn-  
cias plerumque longum, angustum, atrovirens  
prodit: culmorum summo panicula brevis, parum-  
que expansa, ex paruis glumis composita, insidet.

Apud nos in vinearum vijs, solo aliquantulum aë-  
riore, circa æstatis initium reperitur.

II. GRAMEN caninum supinum panicula-  
tum dulce: ex radice oblonga, capillata, & nigra,  
folia pauca, læuia, viridia, angusta, vnciarum trium  
vel quatuor longa, prodeunt; inter quæ calamus  
tenuis, internodijs distinctus, folijs paucis oblon-  
gis cinctus; parte inferiore supinus, mox palmum  
longus, erigitur, & paniculam tenuem, albam, glu-  
mis exiguis donatam, sustinet: agris Londinensi-  
bus vdis gaudet, vnde D. Lobelius, Graminis  
dulcis nomine misit.

¶(;)¶

A

III. GRA-



Gramen caninum maritimum  
asperum.

III. GRAMEN caninum maritimum asperum: radicem habet ex multis fibris oblongis; albis, capillaribus compositam, ex qua ramuli plures dorso-ventrales, in terram primum reflexi prodeunt, calamis rotundis rufescentibus donati, quos folia quasi in fasciculō iuncta, brevia, dura, veluti in aculeum fastigiata, in circuitu leuiter hirsuta, ferre instar minutissime exasperata, cingunt: spica, folliculo primum inclusae, angustae, ceu ex lappulis elegantissimis, exiguis, asperis & echinatis compositae. In litore Veneto, maritimis quoque circa Anconam, & Monspelusii reperitur. Lobelius aduersariorum parte altera in catalogo graminum, gramen caninum medicatum maxime spica echinata C. Bauhini (sed sine descriptione) vocat, quia hoc nomine in Phytopinae nostro ante annos viginti quatuor brevissime descripsimus.

Gramen caninum maritimum  
spicatum.

IV. GRAMEN caninum maritimum spicatum: ex radicibus tenuibus, lignosis, leuissime capillatis, viticelli plures repentes, rotundi, laues, pedales, cubito etiam longiores, frequenter geniculati, unde ramuli plures, foliis arundinaceis brevibus & angustis cincti, prodeunt; quorum superioribus spica triuicinalis, ex cinereo nigricans insidet. Ad litus maris, non longe Monspelio, D. Saltzmanus legit & communicauit.

V. GRAMEN murorum radice repente, ex radice nigricante repente & capillacea, culmi plures, pedales, incurui, teretes, geniculati, folijs paucis, brevibus & angustis cincti, prodeunt: quorum summis panicula albicans, sesquiuncialis, ex minimis glumis contexta, insidet. Hoc in muris fossarum interiorum urbis nostrae prouenit.

VI. GRA-



Gramen nodosum spica parua.



Gramen nodosum auenacea panicula.



VI. GRAMEN NODOSUM spica parua: radice est parua, nodosa, albicante, fibris paucis & breuibus donata, cui ceu alter nodulus oblongus insidet, qui in calamus cubito altiore, lauem, internodijs aliquot distinctum abit, folio ad quem lit et nodum vno, angusto, vncias quatuor vel sex longo: in summitate spica vnica vix vncialis, mollis, typhini graminis forma. In dumetis vdis circa Bedfordiam (vrbe diei itinere Basilea distante) prouenit, vbi D. Ioannes Bauhinus frater meus p.m. collegit & transmisit.

GRAMINIS nodosi auenacea panicula descriptionem hic praeterimus, cum ab alijs propo-  
ta fuerit; solum figuram nouam cum a nullo  
perfecte fuerit delineata, adde-  
re placuit.



A 2

VII. GRA-

spicatum:  
capillatis,  
pedales,  
culati, vn-  
reibus &  
erioribus  
et. Ad lit-  
zmannus

re, extra-  
ni plures,  
js paucis,  
quorum  
ialis, ex  
e in mu-  
enit.

I. GRA-



Gramen bulbosum aquaticum.



VII. GRAMEN bulbosum aquaticum: Bulbum vnicum habet, elegantem, cum recens est, maculis luteis striatum, carne alba, nullius odoris nec saporis, in ima parte quasi caudulam habens, ex quo pediculus duarum vnciarum exurgit: cuius summo radix manifeste fibrosa ad foliorum exitum conspicitur: folia aliquot habet latiuscula, palmaria, striata: an calamum ac florem proferat ignoramus, cum tale à D. Vasmaro anno 1592. Lubeca acceperimus: scribit se in ripa fluminis Trauæ inuenisse fluctibus forte proiectum, quod absque dubio sub aquis nascatur, foliorum contemplatione id docente: imbecilliora enim esse, quam vt sine fulcimente aqua sese sustinere possit: quod in Phytopijn: etiam monuimus.

VIII. GRAMEN bulbosum ex Alepo: Radice est bulbosa, cortice reticulato obuoluta, cui fibræ paruæ capillares subiiciuntur: culmos duos tresve striatos, sesquipedalem altitudinis habet,

Gramen tremulum minus panicula parua.



folijs plurimis, oblongis, gramineis cinctos: spica, hordeo marino similis, culmo insidet, quam folijs, vesicæ instar parte inferna cingit eamque superat. Hoc sicum apud Iohan. Bauhinum fratrem vidimus.

IX. GRAMEN tremulum minus panicula parua. Radicibus rasescentibus huc illuc repentibus, nititur, vnde culmi palmares duo vel tres, geniculo vno vel altero distincti, folijs gramineis virentibus & glabris, angustis, acuminatis, quorum vnus iubam vesicæ in modum obuoluit, & suo acumine vel superat, vel saltem adæquat, quæ multis laminulis squamatis, lenticulæ similibus, rotundis, spadicisæpe coloris, filo tenuissimo adpensis, constat: ex quibus stilosulitentes, ex flauo pallentes, in vere emicant. In pratis nostris montosis & ericetis prouenit, & vulgo Hasenbrod id est, leporius panis, dicitur.

GRA-



LIBER PRIMVS.

Gramen tremulum maximum.



GRAMINIS tremuli maximi, cuius Cæsalpi-  
nus sub Phalaride altera, & Clusius in Cu. post. sub  
gramine Amourettes maiore meminit. Figuram à  
nemine propositam adponere placuit.

GRAMEN pratense paniculatum molle, cum  
nomine graminis lanati in historia Lugdunensi  
propositum sit; solum figuram veram spectantiam  
exhibemus.

X. GRAMEN pratense paniculatum maius an-  
gustiore folio: ex radice capillacea, rufescente, fo-  
lia capillacea, quædam breuia, quædam palmum-

Gramen pratense paniculatum molle.



superantia. prodeunt: inter quæ culmi tenues, ge-  
niculati, cubitum superantes; vno alterove folio  
breui eincti, in quorum summo panicula leuiter  
expansa, vnciarum quatuor longa, quæ ratione lo-  
ci, strigolior vel lætior: In pratis & dumetis ad ri-  
pam Wiese fluminis apud nos reperitur.

Huic simile ad ripam prædictam inuenitur, po-  
tissimum radicem capillariam, vt & caulium nu-  
mero, paniculis & in ijs glumis longioribus,

varians.



Gramen panicula mul-  
tiplici.

XI. GRAMEN panicula multiplici: ex radice multis cirthis villosis albicantribus composita, culmi plurimi, palmates, laeues, geniculati & recurui, folijs gramineis, oblongis, angustis vestiti, exurgunt, quibus panicula triuncialis angusta varie diuisa, per maturitatem rigida & spadicea, insidet. Monspeffuli prouenit; maius & minus reperitur, & gramen minus duriusculum vocatur.

GRAMEN aruense panicula crispa, cuius figura apposita, pro gramine à Matthiolo, gramine Xerampelino à Lobelio, gramine bulbofo Dalechampij in historia Lugd. describitur, figura non faeliciter expressa.

Gramen aruense panicula  
crispa.

XII. GRAMEN montanum panicula spadicea delicatiore: Radice est alba, breui capillacea, culmis ternis, quaternis, geniculatis, pedalis, vno alteroue folio cinctis, quae etiam ad radicem breuia & pauca sunt: in culmorum summo panicula triunciales, spadicei coloris, ex locustis minimis composita.

Hoc gramen variat magnitudine, cum & caulo sesquicubitali & spica semipalmari inueniatur: prouenit locis saxosis, maius quidem in monte Crenzacho: minus vero in monte Wasserfall dicto.

XIII. GRA-



Gramen paniculatum odoratum.



XIII. GRAMEN paniculatum odoratum: Radicibus candidis, geniculatis serpit: culmo est bicubitali geniculis paucis distincto folijs angustis, longissimis, paniculam superantibus, in acumem fastigiatis, suauem odorem spirantibus: cuius culmo panicula parua, leuiterque sparsa, à pictore non rite expressa, insidet. Apud Borussos provenit, & à Regiomontanis gramen Mariæ dicitur,

quod in fasciculos collectum, propter odoris fragrantiam vestibus adiungunt, vt D. Vasmarus, qui plantam transmissit, perscripsit.

XIV. GRAMEN syluaticum paniculatum altissimum: ex radice repente fibrosa, calami duorum triumve cubitorum exurgunt, qui paniculas paruas sustinent; folijs est latis, cyperi amulis. Hoc in syluis circa montem Belgardum provenit, ex quo rustici chlamides pastorales, & torques equis aratra trahentibus, conficiunt.

XV. GRAMEN palustre panicula speciosa. Hoc ad bicubitalem altitudinem exurgit, calamo satis crasso: folijs est paucis pedibus latiusculis, per marginem asperiusculis, quorum aliqua tubuli instar, calamum media ex parte ambiunt: panicula est subata sesquipalmari, ex elegantissimis, paruis & subrotundis laminellis composita. In humidis circa Patavium legimus: & in Hassia stagnis reperiri intelleximus.

XVI. GRAMEN palustre paniculatum minus. Ex radice crassa, fibris albicantibus, durioribus donata, calamus rotundus, striatus, cubitum superans exurgit, quem folia pallide virentia, latiuscula pedalia, subaspera, inuestiunt: panicula palmaris est, rara, ex locustis albicantibus; aristis oblongis armatis, composita. Hoc in dumetis humidis circa montem Crenzacensem provenit: at in vdis Michelfeldensibus, altius exurgit.

XVII. GRAMEN maritimum fluitans cornutum. Ex radice exili capillata, culmus tenuissimus, geniculatus, cubito longior producitur: ex quolibet geniculo, folia tuncea, communiter bina, culmum basilata, instar vesicæ, ambientia; in latus sparguntur, indeque cauliculus vnus aut alter educitur, & tandem in capitulum membraneum finit, quod in foliola bina, terna, rarius quaterna, angustissima, in latus reflexa, & cornuta definit. Tota planta, stagnis Monspelienfibus mari finitimis, innatat.

XVIII. GRA-



Gramen cristatum.



XVIII. GRAMEN spica cristata læui, vel gramen cristatum. Radicum capillamentis plurimis oblongis albicantibus abundat, quæ in vnum veluri cespitem coeuntia deorsum repunt: culmis est

pluribus sequicubitalibus, geniculis paucis donatis: folijs breuibus angustis, & circa caulem paucis, vncias quatuor vel quinque longis: spicam habet tenuem oblongam, pallide virentem, quæ galli cristas plurimas, vel semen capitis gallinacei dictæ plantæ refert, cuius nomine cristatum in Phytopinace appellare placuit: quod nomen & D. Lobelius in Aduer. parte alt. probauit, gramen cristatum Caf. Bauhini nominans. Prouenit in prato infra patibulum, aliquando ad mœnia Basiliensia.

Idem, sed spica elegantiore & densiore, in monte Wasserfall & Montepessuli obseruauimus: simile ei ex Anglia D. Lobelius, multis annis post, misit.

XIX. GRAMEN spica cristata subhirsutum. Hoc à priore differt, radicum capillamentis rufescentibus, culmis tenuioribus, parte inferiore leui lanugine aspersis & humilioribus: folijs longioribus: spica candicante, minus compacta, nec ita eleganter cristam exprimente: quod in dumetis circa Cliben copiose prouenit.

XX. GRAMEN spicatum angustifolium montanum. Hoc à gramine caryophyllato pratensi differt folijs, quæ angustissima; cauliculis, qui in hoc tenuissimi, plures & longiores: & loco, cum hoc solum in montosis, Maio mense florens, proueniat.

XXI. GRAMEN syluaticum angustifolium spica alba. Ex radice rufa, transversa, fibræ capillares descendunt, & folia plura, capillacea, palmaria, etiam breuiora, rarius longiora exurgunt, vna cum culmis tenuissimis, ipsis folijs plerumque breuioribus, quibus spica vt plurimum simplex, candida, exiguis aristis donata, vnciam vix superans, insidet: quod in syluis humidis Hunningensium reperitur.

GRAMEN



# LIBER PRIMVS.

Gramen spicatum folio aspero.



**GRAMEN** spicatum folio aspero, in historia Lugdunensi, nomine graminis spicati Dalecham-pij proponitur, cuius figuram perfectam adpone-re placuit.

**XXII. GRAMEN** caryophyllatum nemoro-sum spica multiplici. Radice est ex fibris capillaceis rufescentibus composita, ex qua, tanquam ex ces-pite, folia semipalmaria, etiam breuiora, Vetonice caryophyllata similia, prodeunt: inter quæ culmi quam plurimi capillacei, nudi, folia aliquando su-perantes, spicas multas breuissimas & rufescentes sustinentes, exurgunt. Hoc in vmbrosis & humidis ad Birsam & Wiefam reperitur. Huic non mul-tum dissimile, sed radice magis geniculata, in via Richana ad sepes ad sinistram reperitur.

**XXIII. GRAMEN** caryophyllatum monta-num spica varia: Radicibus est paruis, fibrosis, ob-longis, nigricantibus, ex quibus instar cespitis fo-

Gramen caryophyllatum montanum spica varia.



lia, aliquando palmum longa, angusta, vt in gra-mine spicato caryophyllata folijs, prodeunt: inter quæ culmi plures, tenues, folijs nudi, in summitate spicam modo diuulsam, modo compactam susti-nentes. In nostræ vibi vicinis collibus reperitur.

**XXIV. GRAMEN** spicatum folijs & spicis hir-sutis mollib. Radice est arundinacea transuersim repente, paucis fibris capillata; ex qua culmi mol-les cubitum superantes, folijs oblongis, angustis, spicas superantibus, & molli lanugine aspersis, quasi per tubulos transeuntes, exurgunt: quorum summo spica angusta, vncias duas longa, mollis, modo simplex, modo gemina, rarius triplex, alter-natim disposita, insidet. Hoc in arenosis ad Birsam reperitur.

☞:☞

B

XXV. GRA-



Gramen typhoides maximum spica longissima.



XXV. GRAMEN typhoides maximum spica longissima. Ex radice parua, nodosa, cui fibrae exiguae & plurimae adnatae, culmus exurgit rectus, sesquicubitalis, internodijs rariotibus distinctus, qui in spicam rectam, teretem, palmarem, virecentem in maturitate albicantem, tactu mollem, desinit, utriculis aristas oblongiusculas & copiosas exhibentibus. Inter fruteta circa Gappingam Ducatus Wirtembergici primum, dein non longe Basilea, in sepibus agrorum inter Michelsfelden & Huringen, & in salycetis Michelsfeldae legimus.

XXVI. GRAMEN phalaroides minus, siue Hispanicum: hoc folijs est oblongis, angustis, viridibus, quorum vnum vel alterum, culmos cubitales, tenuis, tubi instar cingit: in culmorum summo spica Phalaridis similis, sed angustior, uncias tres longa, in hoc nec radicem, nec cimen vidimus: & no-

Gramen alopecuroides, spica aspera.



mine Phalaroidis alterius Hispaniae, D. Gillenius, transmisit.

XXVII. GRAMEN phalaroides spica mollis, siue Germanicum: culmo est cubitali, prioris crassiore, vno alterove geniculo distincto: folio vno vel altero, eoque breui, culmum ambiente, cuius summo, spica biuncialis, prioris angustior, cinericei coloris, splendens & mollis infidet. Hoc Vlmenses, apud quod provenit, à colore, Onocorda appellare, intelleximus.

GRAMEN alopecuroides, spica aspera, nomine Graminis echinati apud Lugdunensem describitur, quare solum figuram meliorem addere volumus.

XXVIII. GRAMEN tomentosum alpinum: & minus. Ex radice parua inutili, calamus raro drantem superans, folijs duobus tribusve vestitus exurgit.



# LIBER PRIMVS.

exurgit, cuius summitati pappus subrotundus infidet. Prouenit in Helmetia, in D. Bernhadi monte minore ad lacum: ex Rhoetia D. Burserus attulit.

XXIX. GRAMEN sparteum Basiliense, siue capillaceo folio maius. Ex radice fibrosa, culmi plures exurgunt, qui statim in folia capilli instar angustissima, in acumen molle fastigiata, palmum, saepe pedem altiora, absumuntur: nec paniculam, nec spicam obseruauimus. Tota planta insigniter vi-  
ret, & ex multis plantis simul iunctis cespes constituitur: in paludibus Michelfeldae prouenit: vti mihi anno praeterito M. Hagenbachius, vna cum alijs Graminibus plurimis, ostendit.

XXX. GRAMEN sparteum Hollandicum, siue capillaceo folio minus. Hoc pro radice fibellae tenuissimas albas habet: folia copiosa, capillacea, pallida trium quatuorve uncularum, inter quae culmi tenuissimi, palmo altiores, vno alterove internodio donati & pene nudi: efferuntur, qui paniculam pallidam diuisam sustinent: & communiter plures cespitem constituunt. Nomine Sparti Hollandici ex sylua Hagana D. Weckerlinus misit.

XXXI. GRAMEN sparteum Monspeliacum capillaceo folio minimum: Radicem habet ex fibris albis, oblongis, capillaceis compositam: folia capillacea, vncialia: culmos tenuissimos, nudos, trium quatuorve uncularum: paniculas paruas ex locustis minimis compositas & per maturitatem rufescentes: quod Monspeffuli in agris aestiuo tempore reperitur.

XXXII. GRAMEN sparteum setas equinas referens. Hoc album est, & ex radice alba setarum instar, folia cubitorum quatuor longa producit, quae forma, & tenuitate, & robore, caudam equinam,

eiusque setas referunt: ex quibus Iava in thebaeis, tapetia texunt. Cuius forte mentio fit in C. Clusij curis posterioribus, sub Heiba, Sparto Hispanico non absimili.

Sic ex Insula Virginea, arboris cuiusdam cortex candidissimus, in pilu tenuitatem diuisus adfertur, e quo incolae pannos texunt: hunc corticem a D. Gillenio, Gramen vero a D. Saltzmanno accepimus.

XXXIII. GRAMEN sparteum variegatum: hoc folijs est quatuor vel quinque uncularum, rotundis, variegatis, quorum alternatim pars vna vi-  
ret, altera rubet: quod primo vere in Franckenhulsijs montibus copiose reperiri, D. Iungermannus anno 1602. scripsit, & colorem cultura mutare monuit, spartique nomine, solum folia, misit.

XXXIV. GRAMEN foliolis iunceis breuibus maius, radice nigra. Ex radice capillata, nigra, folia iunceae, rarius duas tresve uncias superantia, prodeunt: inter quae culmus tenuissimus, pedalis, laeuis, cuius summo glumi minimi, quemadmodum in gramine exili duriore alternatim dispositi sunt: ad mœnia urbis nostrae legimus.

XXXV. GRAMEN palustre iunceum racemoso semine: folijs est paucis iunceis, culmo cubitali, ex cuius summitate, inter bina foliola, veluti racemus paruus propendet: in aquis circa Francofurtum ad Oderam D. Fleislerus collegit, & anno 1605. communicauit.

55

B 1

GRAMIN



Gramen iuncum folio articulato  
aquaticum.

GRAMEN iuncum folio articulato aquati-  
cum: etsi pro aquatico altero à Lobelio; aquatico  
à Tabernamontano pingatur; verum cum folio-  
rum articuli non exprimantur, nouam pro Thea-  
tro nostro sculptam, addere visum fuit: & cum post

Gramen iuncum folio articulato cum  
vtriculis.

fœniscium, caulis palmatis exurgat; cui raro capi-  
tula corymbacea insident; sed vtriculi vnciales pa-  
leacei; in capillamenta filici, modo virides, modo  
purpurascens; idcirco figura exprimi  
curauimus.

XXXVI. GRA-

cap  
qua  
iunc  
cuiu  
sum  
infic  
quo  
git  
Bale  
X  
squa  
pillu  
claru  
fere  
mof  
aque



Gramen montanum iuncum capite  
squamoso.

XXXVI. GRAMEN montanum iuncum capite squamoso: Radice est parua, fibrosa, circa quam folia bina, ternave semipalmaria: calmus iuncus, laevis, enodis & nudus, pedem superans: cuius summo capitulum instar Phalaridis squamosum in apicem desinens; ex albo leuiter rufescens, insidet, cui utrinque foliolum rigidum subiecitur, quorum longius, vnciam superans, deorsum vergit, alterum quod triplo breuius, recta effertur. In Baldi montis summitatibus legimus.

XXXVII. GRAMEN iuncum minimū capitulo squamoso: Radice capillares sunt, folia pauca capillacea, vnciarum fere duarum, inter quae culmi vnciarum quatuor vel quinque exurgunt, in quorum fere summo capitulum vnicum minutissimū squamosum rufescens, circuli apex supereminet. In aquosis circa Altorffium Noricorum, vnde D.

Doldius misit: & Francofurti ad Oderam, prouenit.

XXXVIII. GRAMEN iuncum minimum alterum: a priore differt potissimum capitulis, quae & summo cauculo insident, & squamosa non sunt: in fossis Patauinis, aqua defluxa, reperitur.

XXXIX. GRAMEN iuncum minimum maritimum. Totā planta dodrantem non superat, cespiti similis, ex cuius singulis radiculis, singuli cauliculi exurgunt: foliolis capillaceis paucis cincti, qui exiguis utriculis donantur: hoc in Zelandia maritimis ad oppidum Gous, D. Gillenius collegit & transmisit.

XL. GRAMEN cyperoides latifolium spica spadiceo-viridi maius: Radice est oblonga multiplici, rufa mire capillata, caulibus triangulis, cubito minoribus: folijs arundinaceis, pedalibus, & quam in vulgari angustioribus: spicis ternis, quaternis, rarius quinis, alternatim succedentibus, angustis, trium quatuorve vnciarum longis, coloris spadiceo-viridis, quarum primae semper folium oblongum angustissimum subiicitur. Hoc in humidis ad Sellam nouam Monspessuli primum vidimus: dein ex Lutetia, a D. Franco Graminis Sprawaldensis nomine accepimus.

XLI. GRAMEN cyperoides angustifolium spica spadiceo-viridi minus: Radice est breuiore, lignosiore, parum fibrosa, & rufa: caule triangulo, pedali: folijs angustis, duris, semipalmaribus, in acutē desinentibus: spicis aliquot angustissimis, oblongis, spadiceo-viridibus, alternatim dispositis, & pediculis longis capillaceis insidentibus, quod Aprilimense circa Birsam reperitur. Aliquando tamen altius exurgit.

XLII. GRAMEN cyperoides spica pendula longiore & angustiore. Caule est cubitali, anguloso, striato; folijs oblongis, angustis, basi oblonga, caulem instar tubi vestientibus, ex quo veluti tubo, spicae singulae, vncias quatuor vel sex longae, angustae, prodeunt & propendent; ipsum vero folium cuiuslibet spicae subiectum, oblongum est. Hoc locis humidis circa Thermas Apponenses Patauinorum crescit.

XLIII. GRAMEN cyperoides spicis minoribus minusque compactis. Ex radice fibrosa, lignosa tamen, folia prodeunt angusta; graminea palmarum longa, inter quae caulis sesquicubitalis, triquetrus, subasper, & magna ex parte nudus exar-




gitin cuius summo, spica parua diuisa, & quasi aculeata consistit, quæ semina oblonga, subnigra, in aculeatum cuspidem definentia, continet.

Huius tres differentias notauimus: 1. est latioribus & longioribus folijs, spicis maioribus, & ad ritulum molendinarium vrbis nostræ trans Rhenum reperitur. 2. a priore rarioribus & minoribus spicis differt, & in via Riehana ad sepes crescit. 3. folijs est angustioribus, breuioribus, spicis inter duas priores medijs, quod Patauij locis humidis anno 1578. collegimus, & cum D. Guilandino ostendissemus, Ischæmon Plinij censuit, quod non probamus: idem sed per omnia minus anno 1579. Monspeffuli in humidis inuenimus, quod gramen cyperoides nominabant.

XLIV. GRAMEN arundinaceum plumosum album. Radice & folijs est arundinaceis, & in arundinis altitudinem excrescit: caule anguloso albo, paniculam arundinaceam, ramosam, palmatam, albam, mollem, splendentem, instar serici albi sustinet. Non longe Monspelio, circa Perault & Magolanam reperitur.

XLV. GRAMEN nemorosum paniculis albis capillaceo folio: cespitis instar gramen hoc existit, quod ex radicibus capillaceis, folia copiosa, viridia, pilis tenuissimis similia, pedem longa, emittit: inter quæ culmi tenues, geniculati, cubitales, aliquando sesquicubitales, pene nudi, in paniculam rariorem albicantem, palmo minorem, ex glumis paruis aristis donatis compositam, abeunt: in Querceto non longe Michelfelda copiose prouenit.

XLVI. GRAMEN holosteum alpinum minimum: Tota plantula uncias tres non superat, folijs capillaceis vncialibus, cuius culmis capitula paleacea insident, copiose in Heluetia, in S. Bernhardi monte minore, prouenit.



GRAMINIS

est l.  
iunc  
redi  
psyll



Gramen hirsutum latifolium minus iuncea  
panicula.Gramen hirsutum capitulis  
psyllij.

GRAMINIS hirsuti differentia sunt plures:  
est latifolium maius ab alijs descriptum: est minus  
iuncea panicula, magnitudine potissimum à prio-  
re differens, cuius figura adposita: est & capitulis  
psyllij, quod exile hirsutum cyperoides Lobelia

dicitur, cuius hic exactior figura exhibetur, est de-  
nique hirsutum angustifolium maius hic descri-  
ptum, & minus, quod gramen Leucanthe-  
mon in histor. Lugdun.  
dicitur.



Gramen hirsutum angustifolium  
maius.

XLVII. GRAMEN hirsutum angustifolium maius. Ex radice exigua fibrosa, rufescente, culmus vnicus, cubito altior, vt plurimum læuis, exurgit, in cuius summitate panicula alba, mollis, leuiter sparsa, ex multis laminulis composita, in quarum qualibet semina minuta, subnigra & subrotunda: folijs est paucis, angustis, palmaribus & villosis (seulptor in pilis exprimendis lapsus est) aliquot culmum cingentibus: ipsi vero panicula, vtrinque folium tenuissimum subiicitur, quorum alterum panniculam superat, alterum non adæquat. Prouenit in nostris paludosis pratis Michel-feldensibus.

Gramen spica subrotunda  
echinata.

XLVIII. GRAMEN spica subrotunda echinata, vel gramen echinato capitulo. Radice est capillacea, alba, folijs paucis angustis, tactu subasperis, duarum, triumve vnciarum, inter quæ culmi festucarum instar læues, vno alterove folio cincti, prodeunt: & quidem terni, vel quaterni, sed altitudine inæquales, alter enim duarum, alter trium quatuorve: alter sex vnciarum: quibus singulis capitulum vnicum, instar tribuli echinatum & spinosum, insidet: flores & semina non obseruauimus.

Hoc locis sterilibus circa Monspelium crescit idem sed maius ex Hispania D. Albinus attulit, quod videtur clariss. Columnæ, gramē echinatum tribuloides appellasse.

XLIX. GRAMEN spica plana echinata. Plantula palmaris est radícula ex fibellis albis composita,



sita ex qua foliola capillacea, pauca, vnciam longa, & festuca tenuissima, prodeunt: spicam habet vnciale, planam, quæ ex vtriculis minutissimis aristas acutas emittit: ex Hispania D. Albinus attulit.

L. GRAMEN montanum panicula miliacea sparsa. Ex radice fibrosa rufescente, folia pauca, angusta, vncias quatuor vel quinque longa, vna cum culmo tenuissimo cubitali, vno alterove folio vestito, exurgunt, in cuius summo panicula sparsa, ex locustis minutissimis composita: in monte Cretzensensi provenit.

L.I. GRAMEN arundinaceum panicula miliacea: Ex radicibus fibrosis albis, vnus & alter culmus cubitalis exurgit, quem parte inferiore folia arundinacea vnciarum trium cingunt ad partem su-

pernam duobus nodis distinctam, folia duo angustiora, longiora que vestiunt: in cuius summo panicula trium vnciarum, milij paniculae similis: in agris Patauinis reperitur, & à gramine miliaceo à Lobelio proposito, plane diuersum est.

L.II. GRAMEN arundinaceum Sorghi panicula sparsa. Hoc culmis est cauis, magna ex parte reclinatis, ita vt capillaribus radicibus terræ affigantur, qui folia (quæ longiora & angustiora quam in priore) veluti per tubum transeunt, & in summo paniculam fere palmarem, sparsam, paruis vtriculis donatam, sustinent. Locus natalis memoria excidit.

Gramen latifolium spica triticea compacta.



Gramen angustifolium spica tritici mutica simili.



C

L.III. GRA-

da echi-  
est ca-  
baspe-  
almi fe-  
cincti,  
altitu-  
trium  
pulis ca-  
& spi-  
cruaui-

grefcit  
attulit,  
natum

Plan-  
ompo-  
lita,



LIII. GRAMEN latifolium spica triticea compacta: Culmo est sesquicubitali, vno alterove geniculo distincto, folijs frumentaceis, pedalibus, spica triticea, palmari, lata, glumis acutis carente: Basileæ, ad agrorum margines.

LIV. GRAMEN latifolium spica triticea diuulsa. Hoc à priore, spica potissimum differt, quæ in spicas distinctas & angustas diuulsa est, & sibi inuicem alternatim in culmo subsequuntur, quarum vtriculi brevissimis aristis armantur: in Italia ad agrorum margines.

LV. GRAMEN angustifolium spica triticea compacta: Hoc folijs est angustioribus, sesquipalmariibus rigidis, acuminatis & albicantibus: culmo læui rotundo, striato, sesquicubitali: spicis palmariibus, compactis: vtriculis rigidis & acuminatis. Basileæ, ad sepes locis aridioribus extra portam Blasianam.

Gramen spica brizæ maius.



Gramen maritimum panicula lobiacea.



LVIII. GRAMEN



LXVIII. GRAMEN spica brizæ maius. Radicibus & culmis est frumentaceis, folijs angustis, spicis palmaribus, multiplicibus, vtriculis aristis breuibus armatis, flosculis, vt in tritico, luteolis: Tota planta ad viri altitudinem assurgit, & apud nos locis accliuibus ad Rheni ripam, & ad montis Crentzacenſis ascensum prouenit.

LIX. GRAMEN spica brizæ minus: Tota planta palma minor est, radice exili, fibrosa, foliolis ad radicem breuibus, mollibus, canescentibus, spica vnciali, q̃ modo simplex, modo gemina & terra, vtriculis aristis armatis: in agris Monspelienſi. D. Saltzmannus legit.

LX. GRAMEN loliaceum latifolium spica angustiore: Ex radice alba, arundinacea, fibrosa, culmi aliquot bicubitalis exurgunt, folijs paucis, latiusculis, oblongis cincti, quorum summo spica angusta, vncias quatuor vel quinque longa. Phœnici vel Hordeo marino similis. Basileæ circa Cliben, longioribus & breuioribus folijs varians, reperitur.

LXI. GRAMEN loliaceum minus, spica simplici: Ex radice capillacea, cauliculi plures, rotundi, duriduarum vnciarum, & et semipalmares, folijs paucis, angustis & breuibus cincti, exurgunt, quibus spica duarum vnciarum, angusta, lolio similis, insidet: in agris Monspelienſibus frequens est.

LXII. GRAMEN loliaceum minus supinum spica multiplici. Hoc maiori ex parte reperit, & cauliculis est multis, vnciarum quatuor, folijs paucis, & spica multiplici, cuius vtriculis semen paruum oblongiusculum includitur, & hoc apud Mōspelienſi. pruenit.

LXIII. GRAMEN maritimum panicula loliacea. Ex radicibus capillaceis, cauliculi plures, rotundi, recurui, altitudine impares, palmo inferiores geniculati, folijs paucis, angustis, oblongis cincti, exurgunt, panicula loliaceam, triū quatuorve vnciarū, sed ramosam, sustinentes: locis maritimis circa Mōspelim, vnde D. Saltzmannus attulit, prouenit.

LXIV. FESTUCA graminea glumis vacuis. Ex radicibus fibrosis simul iunctis, culmi aliquot geniculati, pedales, ad radicē lanugine pubescentes, folijs angustis, paucis donati exurgunt, qui glumos plurimos, laues & vacuos, filamentis tenuissimis adpendentes, partim virides, partim spadiceos, aristis oblongis donatos, sustinent: hæc apud nos in tectis & muris crescit: & cum glumi longis filamentis adpenſi sint, facile à quouis vëto agitati, tremunt, hinc Monspelienſibus gramen tremulum dicitur.

Hæc aliquādo, apud eosdem, glumis paucioribus

& aristis longioribus & recuruis in agris reperitur, & festuca graminea aristis incuruis, nominari potest.

LXV. FESTUCA graminea effusa iuba. Hæc altius exurgit, caule viridi & rotundo, qui in iubam pedalis longitudinis effunditur, cuius glumi angustiores & longiores, breuibus aristis cincti, pediculis capillaceis, oblongis insident, qui per maturitatem albicant: inter segetes reperitur.

LXVI. FESTUCA iuncea folio. Ex radice parua, fibrosa alba, folia pauca, iuncea, semicubitum longa, vt & culmus rotundus, cubitalis exurgit, qui in paniculam auenaceam, sed angustiorē, albam, angustam, definit, quæ ex oblongo folliculo (à folio constituto) paniculam longe superante, prodit: cuius glumi rari, aristis longissimis & argenteis donantur. In Valesia ad paludem vrbis Sedunenſi. copiose prouenit, vnde D. Burſerus nobis attulit.

LXVII. FESTUCA iuncea folio spica gemina. Hæc culmo est sesquicubitali, rotundo, geniculato & ramolo, cuius summitati spica, vix vnciam longa, molles, rufescentes, aristis oblongis armata, sic hemogramini villosi similes, insident, & semper due simul, vni oblongo pediculo insidentes, iunguntur: folia habet iuncea, longa, inordinate disposita: locus natalis excidit.

LXVIII. FESTUCA pratensis lanuginosa: ex radice capillacea, rufescente, folia multa, angusta, pedalia, vna cum culmis tenuibus, bipedalibus, foliaceis, molli & pauca lanugine (culmi potissimum) aspersit, exurgunt: spica est oblonga, angusta, ex glumis oblongis, aristis donatis composita, & quasi in paniculam paruam expansa. Basileæ passim in pratis.

LXIX. FESTUCA dumerorum. Ex radice capillacea nigricante, culmi plures geniculis distincti, paucissimis pilis aspersis, duorum triumve cubitorum, folijs oblongis, angustis cincti, exurgunt, in quorum summo spica oblonga, locustis raris, oblongis, cauliproximis, & aristis armatis constans: Iulio mense, in dumeris circa Birsam, verum etiam in voptibus, locis siccioribus, prouenit.

LXX. FESTUCA dumerorum angustissimis & pilosis folijs: Radix est albica, ex durioribus fibris composita: ex qua calami aliquot tenues, vno alterove geniculo distincti & pene nudi, exurgunt: folia sunt breuia angustissima, læui molliq; lanugine hirsuta: calamorum summitati veluti panicula, ex spicis pluribus composita, quarum quilibet capillaceo pediculo insidet, multis glumis aristatis & candidantibus constas: prouenit in dumeris circa Cliben.



Gramen montanum auenaceum locustis rubris.



LXXI. GRAMEN montanum auenaceum locustis rubris: Ex radice tenui, repente, alba, fibrillis capillaribus vtrinque donata, culmus simplex, tenuis, pene cubitalis (rarius ex vna radice plures exurgunt) circa radicem purpurascens, qui quasi inspicam tenuem desinit, cuius glumi ut plurimum ab vna parte siti sunt, & foris ex nigro purpurascunt, intusque albi sunt, in quorum medio vtriculus parvus, candidus, pedicello donatus, semen minutum continet: folijs donatus paucis, angustis, acuminatis, circa radicem breuibus, at circa culmum, quem duo triaue cingunt, longioribus, communiter spicam superantibus. Iulio & Augusto; hinc inde in montosis & umbrosis, ut circa arcem Richenstein, in monte Mureto Basileensium, & monte Crenzacensi reperitur.

Gramen auenaceum lanuginosum glumis rarioribus.



LXXII. GRAMEN auenaceum lanuginosum glumis rarioribus. Ex radice fibrosa, folia iuncea oblonga, & culmi plures, iuncea, cubitum superantes, paucis folijs donati, exurgunt, in quorum summo glumi rariores, albi, lanuginosi, vtriculum continentes, quibus semen nigrum, splendens, inclusum est: locis asperis circa Monspelium provenit: diuersum est a Gramine montano. auenæ semine Clusij.

LXXIII. GRA-



LIBER PRIMVS.

Gramen glumis varijs.

Iuncus acutus capitulis Sorghi.

21



LXXIII. GRAMEN glumis varijs: Ex radice  
crassa, membrana alba rugosa intacta, caules bini,  
ternive, pedales, fragiles, laeues exurgunt, quorum  
summo spicae similis panicula vncialis, ex glumis  
varij coloris, insidet: folia plura ad radicem angu-  
sta, palmaria, saturate virentia: locis montosis  
circa Montembelgardum provenit,  
vnde à fratre p.m. accepi-  
mus.



DE IUNCO.

CAPVT II.

IUNCi differentias viginti quatuor in Theatro  
proposituri, paucas hic apponemus: praemissa fi-  
gura Iunci acuti capitulis Sorghi, qui Iuncus mari-  
timus primus, aduersariorum auctoribus & Iun-  
cus rotundus alter; Caesalpino dicitur: cum  
huius figura à nullo fuerit ex-  
pressa.

C 3

L.IV.



*Juncus acutus maritimus caule triangulo.*

I. *IUNCUS* acutus maritimus caule triangulo: Radice est repente, fibrosa, à qua alia radiculæ, prioribus exiccatis, nascuntur: hinc caules, quos ad radicem breuia folia cingunt, pedales, trianguli exurgunt & in extremitatem pungentem desinunt, infra quem à latere floccus racemosus, rufescens exit. Hic in litore Veneto, & à Perault via qua Montpelio ad mare itur, prouenit: & ad Danubium Lintzij D. Burserus legit.

II. *IUNCUS* exiguus montanus mucrone carens. Radice est pusilla, nigra, capillacea, cauliculo quatuor vel quinque vnciarum, cuius summo capitulum paruum, ex fusco purpurascens, quadrifidum, in exiguum rigidiusculum filamentum abiens, infidet: foliola ad cauliculi principium tria, iuncea, vnciam longa: in Taurero Raftadiensi, D. Burserus eruit.

*Juncus acumine reflexo trifidus.*

III. *IUNCUS* inutilis, siue Chamaeschanos: hic radice est fibrosa, & pro plantæ magnitudine, cum vnciam vix superet, satis crassa, folijs est tribus quatuorve iuncea. Tiguri propolacum Felinum, Maio mense. Ioan. Bauhinus p.m. collegit, & à C. Gesnero, ipsi Chamaeschanos nominatus fuit.

IV. *IUNCUS* acumine reflexo alter: caule est sesquicubitali, rotundo, laui, aphylo, panicula umbellæ similis: atro splendens, pediculo carente, filamentis cæruleis, vt in Aphyllonthe, donata, quam caulibus duarum triumve vnciarum, acutus, sed mollis, parumque reflexus superat: in Prouincia Gallia prouenit.

V. *IUNCUS* acumine reflexo trifidus: Ex radice nigra, geniculata & fibrosa, iunci plures, tenues, palmum superantes exurgunt; qui in summo inter tres, rarius quatuor stylos, tenuissimos, trium quatuorve



tuorve vnciarum, diuiduntur, in quorum summi-  
tatibus, post iunci diuisionem, panicula parua lo-  
cata sunt. In monte Fracto Lucernatum, in Pyra-  
neis & montibus Morauia prouenit.

Iuncus alpinus capitulo lanugi-  
noso.




VI. IUNCCELLVS capitulis equiseti fluitans:  
Ex radiculis capillaceis, iuncus recuruus tenuissi-  
mus prodit, qui in plures iuncellos duarum trium-  
ve vnciarum subdiuiditur, quorum aliqui erecti,

aliqui reflexi, capitulum minimum sustinent, &  
iuncellis singulis foliolum tenue capillo ceu ad-  
ponitur. In aquis Anglia fluitat, vnde D. Gille-  
nius attulit.

VII. IUNCVS alpinus capitulo lanuginoso:  
Radice est subnigra, tenui, fibrosa, ex qua aliorum  
iuncorum more, loco foliorum, quasi styli tenues,  
recti, rotundi, & quidem plurimi, in laue acumen  
vergentes, longitudine dispari, quorum longissi-  
mi, vix palmares sunt, & ad radicem rufescunt: &  
subhirsuti sunt: inter quas caulis vnicus, strictus,  
ad spithamæ, plus minusve, altitudinem exurgit,  
cui capitulum vnicum, oblongum, molle, lanugi-  
nosum, haud multum leporum cauda dissimile,  
insidet: cuius nomine *χοινολεπρον* in Phytopinace  
appellauimus: in montosis Harcynia prouenit, ad  
acidulas, inter fontem acidum Ribelsaw & Grieß-  
bach, vbi Iulio mense Io. Bauhinus p.m. collegit,  
& nomine Iunci alpini cum cauda leporina misit.

VIII. IUNCVS alpinus bombycinus: Ex ra-  
dice aliorum iuncorum simili, folia iuncea exur-  
gunt, inter quæ culmi plures tenuissimi, palmo mi-  
nores, qui capitulum paruum, lanugine alba or-  
natum, sustinent. In montibus Morauia loco dicto  
Kessel, D. Fleisserus eruit, & communicauit.

IX. IUNCVS floridus minor: Radice est can-  
dida, geniculata, fibris plurimis adhaerentibus:  
caule palmari, folijs ternis, iuncis, oblongis, acu-  
tis, duobus caulem superantibus, cuius summo,  
singulis pediculis, qui quini sunt alternatim sibi suc-  
cedentes, flores (quos non vidimus) insident, quos  
fructus gemini rotundi Orobi Cretici magnitudi-  
ne sequuntur. In palustribus Heluetia circa cæno-  
bium Eremitanorum, & in monte Fracto ad la-  
cum Pilati Lucernatum, D. Burferus  
obseruauit.





*Cyperus rotundus inodorus Germanicus.*



DE CYPERO.

CAPVT III.

**CYPERVS** longus inodorus syluaticus: Radices habet oblongas, geniculatas, rufescentes, folia plura, palmaria, viridia, angusta, subaspera, ad principium membrana rufescente simul vestita: caulem hactenus nullum obseruauimus, in syluosis, montosis, humidis, vt in monte nostro Mutero, prouenit.

**CYPERVS** rotundus inodorus Germanicus, sub aquatico septentrionalium à Lobelio descriptus, cum non recte sculptus sit, figuram exhibere debuimus.

DE SPARGANIO.

CAPVT IV.

**SPARGANIUM** minimum: plantula est vnciarum quatuor; nam radícula ex fibellis oblongis componitur, vnde cauliculus vnciarum duarum effertur, & in capitulum exiguum subrotundum, cui aliud minus insidet, herbacei coloris & formæ, quemadmodum in sparganio maiore, definit: circa quem folia vtrinque quaterna, vel quina, angusta, caulicum superantia. Plantulam hanc D. Furerus, anno 1617. transmisit, his ascriptis: Sparganium minimum & semestrale, Northusij in lacunis quibusdam cœnosis, quarum partes superiores per æstatem exiccantur.

DE Equiseto.

CAPVT V.

**I. Equisetum** palustre linariæ scopariæ folio: Ex radice repente geniculata, caulis rotundus, calami in modum inanis, geniculis distinctus, cubitoque altior assurgit: folijs ad genicula pluribus, linariæ vulgaris folijs latioribus, & linariæ scopariæ similibus, viridibus, oblongis, fragilibus, subasperiusculis: iulos in cacumine non obseruauimus, licet quandoque velut in ramos diuidatur. Basileæ, in paludibus Michelfeldensibus, & etiam in riuulo iuxta patibulum, reperitur.

**II. Equisetum** palustre minus polystachio: Radice est repente, geniculis distincta, caule tenui, cubito minore, geniculis crassioribus articulato, folijs, aut potius geniculatis cirris, ad articulum vtrinque ternis, vel quaternis, iunceis, palmaribus, quibus pene singulis minuta spica iuli instar insidet: caulis vero iulum oblongum, minus compactum, flosculis pallidissime rubentibus donatum, sustinet: in aquosis Michelfeldensibus.


**III. Equisetum** palustre tenuissimis & longissimis setis: Culmo est inani, bipedali, geniculis pixidatim coherentibus articulato, cum cæteris conueniens, exceptis folijs, siue setis iunceis, longis, multoque tenuioribus: in palustribus Michelfeldensium.

**IV. Equisetum** nudum minus variegatum Basileense: Ex radice, parua nigra, transtuerla, nonnihil



nihil capillata, cauliculi plures, inæquales, rarissime pedales, communiter palmares, semipalmares & multo breuiiores, striati, pallide virentes, geniculis parte inferna nigris, superne albidis, articulati: folijs carentes, & caui: in quorum summitatibus capitulum breuissimum iuli instar insidet, quod à corona alba, ex octo, nouem, etiam duodecim foliolis acutis composita, sustentatur: & quando pedibus calcatur, crepitat. Prouenit ad ripam Rheni, iuxta locum *de Baar* dictum. An Gesnerus libello de stirpium collectione, hoc intellexit: dum inquit: Hipparis lacustris quædam, folijs mansuarenosis, in fine Iulij floret, uti puto: plura non habet.

*Equisetum fœtidum sub aqua  
repens.*



V. *EQUISETUM* fœtidum sub aqua repens: Radice est fibrosa, caulibus tenuissimis, rotundis, per obliquum, ut *Saccharum penidium*, striatis, geni-

culatis, fragilibus per terram sparsis, quandoq, cubitalibus, in plures cauliculos brachiatis, folijs aliquot breuibibus, in breues apices distinctis, ad genicula iunctis. Tota planta fragilis, quæ aquis cænosis dū innatat viridis est, at extracta & exiccata, incana & friabilis, ita ut non solum digitis in puluere comminui possit sed sponte in puluerem abeat. Odoris est lutosi & sulphurei. Solum in aquis cænosis demersum reperitur, quod primum Patavij in fossis Thermarum Aponitarum: dein non longe Lucerna: tum Basileæ cis pontem Birsæ, Michelsfeldæ & Hunnigæ, in fossis obseruauimus.

DE ARVNDINE SIVE CALAMO.

CAPVT VI.

I. *CALAMVS* aromaticus Syriacus: Ex radice incutiti, trium, quatuorve vnciarum longa, summo capite nonnihil extuberante & in paucas fibras desinente, caulis (modo vnus, modo plures) fere bicubitalis, rectus, rotundus, læuis, fragilis, multis geniculis distinctus, exurgit qui intus cauis, spongiosus & membranula (quasi tela alba subtensa) uti harundines præditus, qui assulatim frangitur, & in plures ramos diuiditur, hiq; in tenuissimos subdividuntur, ad modum Ligustri Ægyptiaci Alpini, vel Lentisci Perauiani siue Molle Clusij: qui flores paruos, foliaceos, plurimos, singulis tenuissimis pedicellis insidentes, sustinent, ex quorum medio apex styli instar prodit. Folia pauca, semper bina ex aduerso ad singula genicula sita, caulem amplectuntur, vnciam lata, sesquiunciam longa, nervis aliquot per longum excurrentibus. Caulis sapore est aromatico, valde amaro, quo in Theriaca pro calamo utimur. Huius caulis partem anno 1579. à D. Paludano ex Ægypto reduce, Patavij accepimus. Verum cum totam plantam à D. Doldio habeamus, breuem eius descriptionem (cum ab alijs non proponatur) ad iecere lubuit.

II. *ARVND* Anglica folijs in summitate distinctis: Hæc folijs est cubitalibus, duarum triumve vnciarum latis, nervis aliquot, per folij longitudinem excurrentibus & eleuatis: folijs in summo in duos, tres & quatuor apices diuisis: hanc D. Cargillus ex Anglia misit.

III. *ARVND* Indica latifolia flore luteo punctato: Ex radice nigricante, nodosa, & fibris crassioribus donata, alijsque nodis adnascentibus,

D

caules



caules plures sesquicubitales, crassi, arūdinis instar nodosi, prodeunt, circa quos folia pallide virentia expansa, lata, in acumen desinentia, neruosa & tenuia: quæ, cum primo ante caulium exortum nascuntur, corniculorum chartaceorum modo conuoluta existunt. Cauli, flores, gladioli floribus forma similes, coloris lutei, punctis aspersis variegati, capitello hirsuto inhaerent, quod flore delapso augetur, subasperum fit, & semen nigrum, subrotundum continet. Hæc ut omnibus sui partibus, ita & semine minor est, quam ea quæ florem minij, coloris habet. Hanc in horto habemus, in olla colimus hyberno tempore in cellam reponimus, quæ pri-

mo vere plures caules, antiquis resectis profert, & Iulio mense florere.

## DE SECALE.

## CAPVT VII.

SECALE latifolia: Culmis exurgit candicantibus, rotundis, striatis, quibus spica palmum longa, crassa, aristis longissimis, & ut in vulgari tenuissimis denticulis exasperatis armata, insidet: folia habet cubitum longa, vnciam lata & per marginem leuiter exasperata: grana non vidimus: spicam & folia ex horto Nobiliss. Contareni, Senatoris Veneri, habemus.

## LIBER SECVNDVS.

## DE GLADIOLO.

## CAPVT I.

GLADIOLVS angusto gramineo folio: pro radice bulbum geminum habet, vnum alteri insidentem, caulē læuem, teretem, pedalem: folia bina ternave, graminea, angustissima, striata, mucronata, palmaria: flores ternos, quaternos, pallide rubentes, supra se inuicem ad caulis summum vtrinque, ex sex folijs oblongis commissi: quibus ut in cæteris, folliculi semen paleaceum continentes, sed minores, succedunt. Ex Hispania D. Albinus, in Muræna collectum ar-  
rulit.

## DE HYACINTHO.

## CAPVT II.

HYACINTHVS minimus maritimus. Totā plāta vnciarum sex est: ex bulbulo paruo ob-

longo, cortice villoso tecto, cauliculi duo vel tres nudi, inter folia angustissima exurgunt, quibus capitula minuta, rotunda, sursum porrecta insident, flosculis minutis cæruleis, quibus veluti siliquæ oblongiusculæ, semen minutum continentes, succedunt: Monspeffuli in litore maris anno 1595. D. Gallus collegit: eundem & loco eodem, sed vncias tres non superantem, D. Weckerlinus anno 1615. eruit, & communicauit.



DE NAR-



Narcissus angustifolius albus  
minor.

DE NARCISSO.

## CAPVT III.

I. **NARCISSVS** angustifolius albus minor: Ex radice bulbosa, tunica subnigra tecta & paucis fibris capillata, folia bina vel terna oblonga, angusta, porracea exurgunt: inter quæ cauliculus palmaris, cuius summo bini flores, parui, albi, calice oblongo, angusto donati, insident: non longe Monspelio in saxosis & montosis reperitur.

II. **PSEVDONARCISSVS** gramineo folio, siue Leuconarcissus æstiuus: Ex radice, oblongum, angustum bulbum imitante, exiguis capillaceis fibris prædita, membrana fusca tecta, folia bina, croceis æmula, oblonga, exurgunt, quæ sæpe cauliculum superant, qui nudus, tenuis, trium, quatuor, quan-

doq; quinq; vnciarum, qui foliolis ternis, quaternis, breuissimis cinctus florem vnum stellatum, intrinsecus albicantem, extrinsecus venis purpurascens, variegatum, ex foliolis sex compositum, sustinet: in cuius medio caliculus breuissimus, in stylum abiens, quem staminula apicibus candidis donata, cingunt, cui capitulum triquetrum, semen continens succedit. In alpinis Heluetiorum & Rhetorum, vt monte Spligel & ad Thermas Fabarias, Iulio mense floret: sed & Augusti fine, in Taurero Austriæ monte, D. Burserus eruit.

## DE ALLIO.

## CAPVT IV.

I. **ALLIUM** iunci folium bicorni luteum: ex bulbo oblongo, capillaceo, tunica alba vestito, caulis rotundis, palmo altior, folijs iunceis duobus tribusve vestitus, exurgit, umbellam paruam luteam sustinens, cuius flores singuli, filamentis oblongis insident, ex sex foliolis luteis compositi, in quorum medio staminula totidem, & in medio stylus, quibus capitula trigona, semen continentia, succedunt: ipsi vero umbellæ, foliola duo angustissima quorum alterum communiter longius, in latus expansa, subieiuntur. Monspelio D. Saltzmannus attulit, & D. Burserus in Austria prope Stain & Baden, eruit.

II. **ALLIUM** montanum minus: ex radice parua, aliquantum nodosa & fibrosa, cauliculus vnus & alter tenuissimus, nudus, trium, quatuor, etiam sex vncias altus, inter folia oblonga, angusta, exurgit, qui capitulum minimum (quod apertum non vidimus) sustinet: in petra circa Oenipontem reperitur.

III. **ALLIUM** montanum radice oblonga: priori simile, sed caule altiore & folijs longioribus, capitulo rotundo pallide purpurascens, floribus ex foliolis sex, totidemque staminibus composito, non longe Monspelio, loco montoso, qui Horrus Dei dicitur, obseruauimus: quod forte Allium

montanum siue Petroscedon Gesneri in libro de Horris.



Moly moschatum capillaceo folio.



DE MOLY.

CAPVT V.

**I.** **MOLY** Affricanum umbella purpurascen-  
te: ex radice bulbosa, caulis (modo vnus, mo-  
do plures) cubito altior, nudus & cauus, vna cum  
folijs aliquot latiusculis, in acutum desinentibus,  
palmaribus & etiam sesquipalmaribus, per margi-  
nem, instar graminis hirsuti, pilosis: umbella, caulis  
summo insidet, cuius flores communiter ex quin-  
que foliolis, dilute purpurascen-  
tibus, pediculis oblongis & firmis insident: quibus vesicula, duo-  
triue semina nigra rotunda includens succedit.  
Odre est Allij graniore. Hoc Argentina à D.  
Meyero acceptum, in horto ab aliquot annis ali-  
mus.

**II.** **MOLY** moschatum capillaceo folio: bulbo  
est paruo, oblongiusculo, rufescente & veluti reti-  
culato cortice tecto, ex quo cauliculus tenuis, pal-  
maris, rarissime pedalis emergit, circa quem folia  
iuncea vel potius capillacea, sed sine ordine, quæ  
modo vnciam, modo tres quatuorve vncias longa  
(quæ nimis lata in figura exprimuntur) cauliculi  
summo pedicelli quini, seni, septeni, veluti in um-  
bella dispositi, à duobus exquisitis foliolis sustenta-  
ti, insident, quorum singuli flosculum ex sex folio-  
lis acutis compositum, obscure albentem lineis  
fuscis per medium discurrentibus dissectum & sta-  
minulis aliquot donatum sustinent: his capitula  
rotunda semina tria vel quatuor, nigra oblonga,  
triquetra, continentia, succedunt: flos Moschi vel  
Zibethi odorem spirat, & in collibus Monspelio  
vicinis prouenit, vnde D. Saltzmanus anno 1598.  
attulit, & postmodum aliquot annis in hortulo  
coluimus.

## DE ORCHIDE.

## CAPVT VI.

**I.** **CYNOSORCHIS** angustifolia hian-  
te cucullo: huic radices subsunt due globosæ, altera ma-  
ior & vegetior, altera flaccidior, quibus superne  
fibræ aliquot adherent: caulis cauus, striatus, cu-  
bito minor, folijs aliquot pallide virentibus, læui-  
bus, striatis, vncias sex longis, semunciam latis in-  
ferne, & vno alterove superne, amplexantibus:  
spicam habet oblongam, ex floribus raris, candore  
purpurascen-  
tibus, ex oblongiusculis pediculis de-  
pendentibus, hiantem cucullum referentibus:  
hanc in pratis Patauinis legimus.

**II.** **CYNOSORCHIS** militaris montana spica ru-  
bente conglomerata: ex radicibus prædictæ simili-  
bus, caulis cubitalis, rotundus, cauus, paucis folijs  
angustis, striatis, vncias sex longis cinctus, exurgit,  
cuius summo spica, ex floribus paruis, eleganter ru-  
bentibus conglomerata, insidet: quorum labrum  
in quatuor paruas barbularum diuiditur, calcare te-  
nuissimo à tergo. Nascitur in herbosis montis Mu-  
tetæ, Maïo florens: quam prius circa Patauium ob-  
seruauimus.

**III.** **CYNOSORCHIS** militaris pratensis ela-  
tior floribus variegatis: hæc priore est testiculis  
minoribus, caule breuiore, folijs latioribus vncias  
duas longis, etiam caulis summum, tubi instar cin-  
gentibus:




gentibus: spica breuiore, ex floribus priore longe minoribus, iisque ex albo & rubro eleganter variegatis. In pratis humidis Michelfeldenibus, & trans Rhenum reperitur.

III. *CAMEORCHIS* alpina folio gramineo: planta palmaris est, ex cuius radice gemina, globosa, oblonga, folia angustissima, vtrinque quaterna, cauliculum nudum, triunciale, qui inter ea fertur, superantia exurgunt: spica vnciali, cui vtrinque foliolum breuissimum subijcitur: flosculi virides galericulati sunt. In monte Heluetiorum Gothardo, copiose & acervatim, Iunio florens, reperitur.

V. *ORCHIS* montana Italica flore ferrugineo lingua oblonga: Testiculos duos habet paruos, rugulosos, quorum alter, ut in reliquis Orchidibus vegetior, hinc communiter solum vnus testiculus reperitur: quorum summo, fibræ oblongæ, varie & oblique sparæ, adpositæ. Caulis cauus, nonnunquam pede altior, quem folia angusta paucaque vncias tres vel quatuor longa, basi sua vestiunt, at cuiuslibet flori folium breue quidem, sed latius & in apicem deflexum, subijcitur. Flores quini, seni, alternatim in caulis summo dispositi, coloris ferruginei, obliqui tubuli forma, quorum lingua propen-

dens oblonga est, & ex basi latiore in apicem abit, cui legumentum pallidioris coloris, vesicæ instar impositum, etiam in apicem & communiter bifidum finit: floribus vtriculi, semine puluerulento repleti, succedunt. Hanc in Italiæ montibus Bassanensibus legimus: & Matthiolum sub Testiculi tertij specie prima, in figuris maioribus exprimere voluisse, censemus, cuius tamen figura mala & sine omni descriptione, & ut in historia Lugdunensi sub Testiculo 3. Matth. At fateor peiorem esse eam figuram, quam Matthiolo meo emaculato addidi, desumptam ex Tabernæmontani figuris: tunc enim quid sibi vellet Matthiolus, non constabat, imo etiamnum dubius sum: quare aliam figuram delineari curauimus. Huius haud dubie species, quam doctissimus Columna in sua Ecphrasi minus cognitarum stirpium, Orchidis macrophyllæ nomine & eleganter de-

scripsit, & icone expressit.



D 3 VI. *ORCHIS*




Orchis palmata pratenfis angustifolia.



VI. ORCHIS palmata pratenfis angustifolia maior: radices habet paruas, veluti palmas geminas, in binos digitos distributas, fibris paucis annexis: folia liliacea, angusta, læuia & palmaria, per quæ veluti tubum, caulis cubitalis cauus effertur, cui spica fere palmaris angusta, ex floribus dilute purpureis, breui calcare donatis composita, quibus singulis foliola oblonga acumina subiiciuntur, & capitulum oblongum, semen aliarum instar continens, succedit. Hæc in pratis vdis Michelfeldæ, ipsa æstate reperitur.

VII. ORCHIS palmata angustifolia minor flore odoratissimo. Radice est gemina, oblonga, angusta, palmæ simili, in tres quatuorve fibras crassissimas diuisa, supra quas ex imo caule fibræ aliquot ortæ expanduntur: ex radice folia quina aut sena, oblonga, graminea prodeunt, inter quæ caulis vnicus palmaris, paucissimis & exiguis foliolis do-

Orchis palmata angustifolia minor flore odoratissimo.



natus, qui velut in spicam biuncialem abit, cui flores dilute purpurei odoratissimi insident, qui galea recti, labro prominulo, in quatuor barbula diuisi sunt, & paruo calcari, à tergo prominente, donati. In pratis humidis Michelfeldæ prouenit & autumno floret (quamuis etiam Monspeßuli reperiatur) & sub Satyrio octauo in Phytopinace descripsimus.

VIII. ORCHIS palmata flore viridi: ex radice gemina, palmata & parua, caulis palma altior, folijs paucis, neruosis, vncias tres longis, vnam latis, vestibus exurgit, spicam habens triuncialem, flosculos paucos, subvirides, galea tectos, & labro prominulo in duas barbula diuiso, quibus singulis foliolum oblongum, angustum, subiicitur. In montibus Bohemiæ, Silesiæ finitimis in Saxo Mommelgrund, copiosam Iunio florentem, D. Fleissnerus obseruauit, & attulit.

IX. ORCHIS



Orchis palmata montana maxima.



IX. ORCHIS palmata montana maxima: Radices habet geminas instar palmarum duarū sibi invicem iunctarum, & velut in plures digitos diuisarum, quarum altera alba, vegetior ac solida, supra quas fibræ paucae conspiciuntur. Caulis est bicubitalis, striatus, vacuus, quem folia pedalia primum, mox palmaria, sesquiunciam lata, nervis distincta, complectuntur: in cuius summo flores in spica palmari digesti, coloris dilute purpurei, qui parui sunt galeola recti, labro exiguo propendente, in angustissimas barbula diuiso, & à tergo oblongo, capillaceo calcari donati, ad quorum exortum foliola singula, quasi in filamentum abeuntia, observantur: his capitulum oblongum, striatum, semen exiguum scobis instar continens, succedit. Hæc in montibus vicinis, potissimum Muleto, copiose Maio mense florens, prouenit.

DE OPHRIS.  
CAPVT VII.

OPHRIS minima: è radice subflauescente fibrosa & Orchides redolente, cauliculus simplex, trium, quatuorve unciarum, sub foliolis prodest, cui foliola duo Ophrios vulgaris modo apponuntur, quæ parua sunt, glabra, splendens, coloris vni folij & non nihil in cordatam effigiem, è rotundiuscula figura discedentia, quibus cauliculi altera pars, similiter trium, quatuorve unciarum supereminet, cuius summo flosculi parui herbacei insident, in Ophris vulgaris floribus, exilitate sola recedentes, quibus vascula exigua succedunt. Florentijs in locis ubi sponte prouenit, Iulio potissimum mense: at in hortos, cū gleba soli natalitij translata, citius. Nascitur plurimum, ut D. Furerus monuit, à quo eā (sed prius à D. Sigfrido) accepimus, Ophridij seu Bifolij Broccenbergici minoris nomine, in opacis muscosisq; syluis Broccio & Offmannino vertici dicto, interuenientibus.

DE OROBANCHE.  
CAPVT VIII.

I. OROBANCHE flore maiore ex ceruleo purpurascens: Radice est crassa, longa, fibrosa: caule semipalmari, foliolis paucis, breuissimis, crassis & acutis cincto, qui in quinque, sex, etiam plures pediculos triunciales, nudos, absumitur, quamuis etiam ex foliorum alis pediculi prodeant, quorū summo calyx, vncialis sinuatus insidet, & ex quolibet flos vnicus, ceruleo purpurascens, longo pediculo donatus, exit, qui magnus, uncias duas longus, forma galericulatus, & veluti rostratus, ut in Alektorolopho, ex quo filamentum oblongū, reflexum, prodest: quod flori succedat, non constat. Hanc, in Pyrenæis montibus D. Burserus legit & communicauit.

II. Monere lubet de vulgari Orobanche eā recte à Theophrasto Limodoron, quasi famem adferēs, vocari; eo qd plantæ cui adnascitur, alimentū subtrahat. Hanc n. semper alterius plantæ radici adnatam obseruauimus, ut Genistæ vulgaris & Hispanicæ, Hieracio Sabauda, Trifolio, Astragalo syluatico & alijs.

III. OROBANCHE quæ Hypopytis dici potest: hæc Orobanche vulgari similis, sed humilior & nigricans, caule unciarum quatuor, quasi squamis cōtectis: flores in summo, veluti in paruam spicam congesti, Nido auis similes, albidiores tñ, rariore ac duriores. Sub piceis, abietibus & pinastris (hinc hypopitis) prouenit. Sapore est aliquantū astringente.

LIBER



## LIBER TERTIVS.

DE RAPUNCULO, SIVE CAPANULA  
GLABRA.

## CAPVT I.

Rapunculus spicatus cæ-  
ruleus.Rapunculus alpinus siue Pyramidalis  
minor.

RAPVN-



**R**APVNCVLVS spicat<sup>r</sup> datur spica alba, vel cinerea, vel coloris violacei saturi, hic solum figura Rapunculi spicati cærulei adposita, cum iam descriptus sit.

**I. RAPVNCVLVS** alpinus siue Pyramidalis minor: Radix Rapunculi forma: carlis vnus, sesquipedalis, folijs pallide virentibus, per ambitum crenatis, acuminatis, vnciam latis, tres longis, alternatim cingitur: in summo flores pauci, cærulei, campanulæ forma, pedicellis annexi & filamentis oblongo ex eorum medio prodeunte, donati propendent: quibus singulis capitulum oblongum, pertusum vt in campanula perfici folia, succedit, cui semen minutum includitur: in

Italia provenit, sed locus excidit.

Rapunculus alpinus corniculatus.



**II. RAPVNCVLVS** alpinus corniculatus, quem nomine rapunculi alpini spicato simili, ante annos viginti duos in Phytopinace, dein in Matthiolo emaculato, descripsimus, nunc vero diligentius, cum eam ex Baldi rupium fissuris, absque radice euerimus, vt figura nostra in Matthiolo exprimit, postmodum à D. Neudorffero cum radice, & perfectiorem à D. Pona ante annos decem acceperimus.

Radice est tuberosa inæquali quasi ex pluribus grumis compacta, alba, digiti crassities, aliquando lignosa, pallida, rugosa & palmari: ex qua cauliculus (modo vnus, modo plures) tenuis ac striatus, vnciarum quatuor exurgit: folia, quæ saturate virentia, tenuia, ad radicem aliquando ex rotunditate oblongata: Bellidis cærulea forma, communiter subrotunda, crenata, Alliariæ forma, sed minora, pediculis vncias quinque vel sex longis prædita, ex radice vna cum cauliculis exurgunt: quæ vero cauliculis & quidem pediculis brevioribus adherent, longiora sunt & angustiora; profundius, sed rarius, incisa, quorum quina vel sena, stellæ in modum umbellæ subijciuntur, quæ cauliculi summo insidet, & ex floribus viginti, etiam pluribus, aride iunctis & ex cæruleo purpurascens. constat, qui, ex calicibus pediculis latis brevibus & striatis donatis prodeunt: ex singulo calice flos vnus, ad exortum tumidus, oblongus, sensimque angustatus, & in extremitate crenatus, formam cucurbitæ vitree referens, in medio tumore, incisuræ superficiariæ quinque conspiciuntur: apertus, ex foliolis quinque compositus, filamenta aliquot exhibet, inter quæ vnum longe producit, in summo bipartitum, aliquando instar capreoli vitium contortum: semen non fuit obseruatum. In Baldi montis iugis, inter præcipitia propendit, vbi Augusto mense florentem anno 1578. collectum, quod cum Patauio D. Guilandino ostenderemus, Rapunculum montanum, at D. Cortusius, Catabiscam alteram Anguillare nominabat. Io. Pona in suo Baldo ante annos quindecim excuso, Trachelij petraei minoris nomine proposuit.

**III. CAMPANULA** alpina latifolia flore pullo: hæc cauliculo est tenuissimo palmo minore, qui ad partem vsque mediam, folijs vncialibus, subrotundis, alternatim dispositis, leuiter crenatis, pallideque virentibus, cingitur: at pars superior nuda est, cui fere semper vnus flos, mediæ magnitudinis, pulli coloris insidet. In alpibus Austriacis, vt Sneeberg

E

& alijs



& alijs D. Burserus reperit, & Rapunculi alpini latifolij nomine, misit.

IV. CAMPANULA alpina linifolia cærulea. Ex radice tenui, alba, cauliculi quaterni, quini, plures paucioresq; palmares, & sesquipalmares, graciles, rotundi, simplices, emergunt: folijs oblongis angustissimis, confuso ordine septi: flores in summitate cærulei ut in Rapunculo vulgari, quibus capitula, exiguum semen continentia, succedunt. Hæc rupes & summa iuga montis Waserfall, Iulio mente florens, exornat.

Campanula alpina rotundifolia minor.




CAMPANULA alpina rotundifolia minor à Clusio sub Campanula alpina minore describitur: verum figura quam addit est Campanulæ rotundifoliæ vulgaris minoris, quare veram figuram adposuimus.

V. CAMPANULA rotundifolia minima: plantula est vnciarum trium, ex cuius radícula alba, capillari, oblonga, exurgunt cauliculi (sæpe vnus, plerumque terni, quaterni) tenuissimi; subrubentes & ad radicem subhirsuti, maiori ex parte nudi, singuli vnicum flosculum subcæruleum deorsum nutantē, calathi forma, ex vnico folio sexangulo compositum, sustinent, quibus capitula foraminibus pertusa, ut in reliquis campanulis, succedunt: foliola habet potissimum ad radicem, exigua, subrotunda, serrata, rigidiuscula, quandoq; rubentia. Hanc in Rhætorum alpidibus cum Italiam peteremus, anno 1577. Septembri mense adhuc florentem inter saxa copiosissime obseruauimus, nec altiore inuenire licuit: quam cum D. Cortuso ostendissemus Cantabricam Plinij nominauit. Plinius l. 25. cap. 8. suæ Cantabricæ, quæ per Diui Augusti tempora à Cantabris reperta fuit, caulem iuncum, pedalem tribuit, in quo sint flosculi oblongi veluti calathi: in quibus semen perquam minutum, & quæ ubiq; nascatur.

VI. CAMPANULA Cymbalaria folijs: ex radice exigua capillacea & albicante, cauliculi tenuissimi, virides, nonnunquā palmum superantes, & mox in alios brachiati, prodeunt: quibus folia rara, subrotunda, hederacea, vel potius Cymbalaria folijs similia, angulosa, viridia, tenuia, longis pediculis donata, sine ordine adhærent: flores cærulei, oblongi campanulæ forma, aliquando summis cauliculis, aliquando pedicellis biuncialibus, ex eorundem lateribus exurgentibus, insident. Hæc non longe Tolosa in Ericetis prouenit, & quia vix sola sustinetur, Ericis incumbens exurgit: eandem

etiam circa Lutetiam D. Cherlerus legit.



VII. CAM-



Campanula serpillifolia.



Campanula folijs subrotundis.



VII. CAMPANVLA serpillifolia: Tota planta floribus exceptis serpillum refert: nam radice est tenui, obliqua, tenuissimis fibris capillata, & hinc inde repente: cauliculis plurimis rubentibus in terram reflexis, cui novis libellis adherent, qui in ramulos plures tenuiores diuiduntur: quos foliola Serpilli, vel potius Nummularæ, quæ flo. e. est purpurascens, forma subrotunda, duo semper opposita, quædam maiora, quædam Serpillo minora, crenata, subtus pallide virentia, pediculis brevissimis, & leuissime pubescentibus, ambiunt: cauliculi aliquando in pediculos nudos, flores sustinentes desinunt: aliquando ex cauliculorum lateribus pediculi triunciales in summo nud, floribus ornati exurgunt: flores bini vel terni campanulæ forma, ex cæruleo rubentes, deorsum nutantes, singuli singulis pedicellis donantur. Huius ramulum à D.

Bauhino fratre primum habuimus, dein in Baldo cum floribus legimus: tum à D. Paschali Gallo, qui eam in Rhætia ex rupibus dependentem collegit.

Similem, sed folijs inferne albidioribus & superne pallide virentibus, in Insula Toupinambault Brasil. anorum natam, D. Butserus communicauit.

DE TRACHELIO SIVE CAMPANVLA  
HIRSVTA.

CAPVT II.

I. CAMPANVLA folijs subrotundis: ex radice tenui, repente, caulis sesquipalmaris leui lanugine pubescens exurgit, quæ folia pauca, subrotunda, vncias duas pene longa, lataque, pediculo oblongo donata, tenuia, subaspera, per ambitum crenata, cingunt: in caulis summo flores pauci, dilute cærulei Campanulæ forma, deorsum,

E 2

penden-




pendentes, ex quorum medio stylus exurgens, extra florem fertur. Hanc ceruicariae minoris rotundifoliae nomine D. Sigfridus, Helmstadio misit.

Hæc à campanula hortensi Rapunculi radice differre videtur altitudine, foliorum longitudine, florum magnitudine & numero, quæ pro radicibus multas, tenues, transversas & oblique repentes fibras, habet, ita ut ex hortorum areolis vix extirpari possit, à quibus radices oblongæ, candidæ, Rapunculi radicibus similes, demittuntur.

II. CAMPANULA Drabæ minoris folijs: ex radice Rapunculi minoris forma, caules sesquipalmes, lanugine leuissima aspersi prodeunt, quos

folia, Drabæ minoris folijs similia, subrotunda, viridia, unciam longa, semunciam lata, per ambitum crenata, & in acum fastigiata, subaspera, pediculis carentia, alternatim vestiunt, flores pauci, subcerulei, sexanguli, calathi forma, mediocris magnitudinis, & pediculis oblongis donati, summo cauli insident. In pratis, circa Valesianorum Thermas copiose provenit, unde D. Burserus attulit.



Campanula folijs Echij floribus villosis.



Campanula folijs Echij.



III. Cam



III. CAMPANULA folijs Echij floribus villosis: ex radice oblongiuscula, folia angusta quatuor & quinque vncias longa, subaspera prodeunt, inter quæ caulis palmaris, rarius pedalis, rotundus, subasper, paucis breuibibus & angustis folijs vestitus, exurgit, ex cuius summitate flores vnciales, lati, Campanulæ forma, quini, seni, cærulei, alternatim dispositi, breuibibus pediculis dependent: quorum extremitates, quemadmodum & calices, pili oblongi, pappi instar, ambiunt. Hæc in Baldo reperitur & Helueticorum alpibus Gorthardo & monte Fracto: diuersa plane à Trachalio montano historia Lugdunensis.

Huius & minor species, quæ minus hirsuta, semipalmaris, folijs breuibibus, cauliculo gemino, ex quorum quolibet reflexo, flos vnicus, illo tamen minor, dependet: quam ex Helueticorum alpibus D. Burserus attulit.

Campanula adhuc alia datur folijs Echij, quam cum Clusius nomine Trachelij *Θυσ. εις ε* descripserit, nullam vero figuram adposuerit, eam præcedenti iungere volumus.

## DE RAPISTRO.

## CAPVT III.

I. RAPISTRVM floribus Leucoij marini: plantula semipalmaris est, radice oblongiuscula, alba, fibellis donata, cauliculistrium quatuorve vnciarum: folijs vulgari Rapistro luteo similibus, paruis, vncialibus, crenatis, & subasperis: flosculis paruis subcæruleis, Leucoij marini similibus, quibus siliquæ paruæ, angustæ, semen minutum continent, succedunt. Circa Massiliam in rupibus D. Burserus legit.

II. RAPISTRVM monospermum: ex radice longiuscula albicante, parum fibrosa, caules pedales, quandoque altiores, rotundi, tenues, ramosi, eleganter virentes, leuiterque hirsuti exurgunt: folia humi sparsa, crassa sunt, Rapi folijs similia, ad principium laciniata, dein subrotunda, leuiter sinuata & subhirsuta: flores secundum cauliculos palmares & tenues, velut in spica dispositi: quadrifolij eleganter lutei aureive, quibus siliquæ succedunt rotundæ (eleganter propter strias, per eas quemadmodum in semine Coriandri discurrentes) in filamentum oblongum abeuntes: quæ quasi geminæ sibi insident, parte tamen superiore maiore,


Rapistrum monospermum.



cum in ea semen paruum oblongiusculum, sed vnicum (vnde ei nomen) contineatur. Huius semen, nomine Lampsanæ monospermi, D. Doldius misit, & hic Basileæ in horto D. Zuingeri, Maio mense floruit.

Hoc ipsum postmodum, sed multo strigosius (illud enim cultura elegantius) in agris qua Augustam Rauracorum itur, ad rubram domum obseruauimus: idem sed humilior & valde ramosum, folijs paruis, eleganter virentibus, in agris circa Huringen ad syluam, inuenimus: & simile

Monspelio, vbi quoque sponte creuit, habemus.





## DE NAPO.

## CAPVT IV.

**N**APVS syluestris Cretica: folijs est ad palmi longitudinem accedentibus, instar foliorum Rapiſtri albi, vel Irionis vulgaris, in lacinias octo vel decem diuisis, per margines crenatis, asperis: caule albido, rotundo, ramoſo, ſub ſpero, ſummitate, cui flores non inſident, aculeata, florib. (quos non vidimus, vt nec radicem) ſiliquæ anguſtiſſimæ biunciales ſuccedunt, quæ ſemen exiguum nigricans continent. Buniadis agreſtis nomine; ex Creta ab Honorio Belli accepimus: & à Cretenſibus *σκιλοβρεές* vocatur.

Raphanus aquaticus alter.



## DE RAPHANO.

## CAPVT V.

**R**APHANVS Creticus: ex ſemine Cretico ab Honorio Belli, Ramolo nomine miſſo, Raphanus in hortis noſtris creuit, cuius planta tota, toto habitu à vulgari nō diſſidebat; radice oblonga, alba & guſtus acerrimi; caule non adeo alto: folijs minus hirsutis & asperis, flore modo purpureo, modo albo: ſiliquis & ſeminibus minoribus.

Raphani aquatici duas figuras, tanquam optimas, adpoſuimus, ſed ſine deſcriptione: cum is, qui folijs eſt in profundas lacinias diuiſis ſub Radicula ſylueſtri, à Dodonæo: ſub Raphano ſyl. aquatico, à Lobelio in editione Belgica: Raphano aquatiko à Tabernæmontano, ſive ſylueſtri & paluſtri in hiſtoria Lugdun. deſcribatur: alter vero, nomine Rapiſtri aquatici à Tabernæmontano exhibetur.

Raphanus aquaticus folijs in profundas lacinias diuiſis.



DE



## DE DRACVNCVLO.

## CAPVT VI.

**D**RAEVNCVLVS alpinus folio scabioſæ: radici-  
bus eſt fibroſis, cauliculis rotundis, pedalibus,  
in ſummo in alas brachiatis: folijs inſtar ſcabiſcæ  
laciniatis, alte incifis & crenatis, alternatim diſpo-  
ſitis & pallide virentibus: ſoſculis, in ſummis vir-  
gulis, quoad diſcum medium ſubluteis, quem ſo-  
liola albida vt in Chamæmelo vulgari ambiunt. In  
Heluetiorum prætis alpinis prope Fabrias & in  
Gotthardo provenit, Iulioq; floret.

Eruca latifolia.



DE ERVCA ET SINAPI.

## CAPVT VII.

**I.**ERVCA latifolia: hæc caule eſt cubitum exce-  
dente, albo, craſſo, ſtriato, ramoſo: folijs glabris

pallide virentibus, ad radicem pedalibus, profun-  
dis incifuris laciniatis, per quorum medium neru-  
latus excurrit, quem vtrinq; foliorū laciniæ biun-  
ciales, alarum inſtar, triangulares, corroſæ, figuræ  
diuerſæ, inferne & ſuperne continuæ, cingunt: quæ  
vero in caule breuiora ſunt, & horum quædam E-  
rucæ vulgaris folijs ſimilia, ſuprema vero anguſta  
& parum ſinuata: in caulis ſummo flores ſatis ma-  
gni, aurei, quadrifolij, ſtaminibus plurimis donati,  
quibus ſiliquæ oblongæ ſtriſtiſſimæ ſuccedunt. E-  
rucæ nomine in horto ſata: an forte Eruca tertia  
Anglica, in horto Camerarij?

**II.**ERVCA ſylueſtris minor Burſæ paſtoris folio:  
ex radice craſſiuscula, cauliculus palmo altior, ſub-  
aſper; breuib; alis brachiatus exurgit: folia ad ra-  
dicem ſparſa, ſequiunciam longa, Burſæ paſtoris  
mediæ modo laciniata, ſubæſpera, in caule nulla,  
niſi quæ alis, & quidem vix laciniata, ſubijciuntur:  
flores ſubærei, ſatis magni, longis pediculis inſi-  
dentes, quibus ſiliquæ breues ſuccedunt. Mon-  
ſpelſuli collecta.

**III.**ERVCA ſylueſtris minor incana: ex radice  
cauliculi læues, virentes, quatuor, ſex & octo vn-  
ciarum, in plures alas vnciales diuifi prodeunt: fo-  
lia ad radicem plura, biuncialia, tenuiſſime lacinia-  
ta, quæ etiam cauliculos alternatim cingunt, om-  
nia incana ſunt: ſoſculi plurimi, pallide lutei, qui-  
bus ſtriſtiſſimæ & breues ſiliquæ ſuccedunt: Mon-  
ſpelio D. Rumbaum attulit.

**IV.**ERVCA lutea ſive Barbarea flore pleno: hæc  
à vulgari magnitudine differt: caule eſt craſſiore &  
ſtriato, ſed breuiore: folijs vncialibus: floribus  
nonnihil quam in vulgari maioribus, aureis &  
plenis. Inter ſegetes Paterniacenſes, & iuxta

Arburgarcem Bernatum, Iunio  
floret.

V.ERVCA



Eruca cærulea in arenosis crescens.

Eruca maritima Italica.



V. *ERVCA* cærulea in arenosis crescens: Ex radice rufescente, oblonga, tenui, leuiter fibrosa, caules plures palmares, rari<sup>9</sup> sesquipalmares striatos, hirsutos, ramulis aliquot brachiatos, emittit: folia ad radicem per terram sparguntur, eruca vulgaris instar sinuata, & quasi circumrota, hirsuta, aspera, sesquiuncialia, sed etiam breuiora & angustiora, quæ in caule rariora sunt, minus sinuata & aliquando integra: flosculi eleganter cærulei, vel purpureo-cærulei, quadrifolij, filamentis breuibus donati, ramulorum extremis insident, quibus siliquæ oblongæ, tennes & laues, semen minutum subrufum & acre includentes, succedunt. Prouenit apud nos locis arenosis, vtijs quæ Birsæ alluit: sic quibusdam in locis in muris reperitur: imo etiam altissimis iugis & petris circa Delspergam & Lauffen Rauracorum: in Phytopinace, & Matthiolo, addita figura, quoq; descripsimus.

VI. *ERVCA* maritima Cretica siliqua articulata: tota planta albicat, folia habens ad radicem breuius, angusta, in minores lacinias diuisa & subaspera: cauliculis est palmaribus, reflexis, striatis (flores non conspecti) siliquis plurimis, incuruis, articulatis, trium quatuorve vnciarum, asperis semine minutum subrufum continentibus, quam ex Creta Honorius Belli misit.

*ERVCA* maritimæ Italicæ siliqua hastæ cuspidi simili, figuram perfectam adposuimus, cuius tres diuersæ vna cum descriptione (inter quas vna ex Lobelio desumpta, qui nomine Cakile Serapionis

*Eruca* folio, napi flore exhibuit) in Lugdunensi historia proponuntur.

VII. *ERV-*



*Eruca Monspeliaca* siliqua quadrangula echinata.



VII. *ERVCA* Monspeliaca siliqua quadrangula echinata. Hanc Monspessuli anni 1579. vbi col-

legissemus, sic descripsimus, quemadmodum in Phytopinace videre est: ex radice semipalmari, crassiuscula, leuiter fibrata, albicante, caules ad exortum purpurascens, terni quaternive, pedales, aliquando cubitales, rotundi, striati, subasperi, in ramos brachiati exurgunt: folia ad radicem humi sparsa, pauca, oblonga, angusta, sinuata, hirsutie aspera, bina ternave simul iuncta, in caulibus, praesertim siliquis onustis, pene nulla, oblonga, leuiter sinuata: flosculis est luteis quinquefolijs, quibus siliquae succedunt quadrangulae, in apicem acutum rigidumque desinentes, laeues, oblongo pediculo infidentes, per maturitatem durissimae: quarum quaelibet latera quatuor obtinet, quae ad formam alarum percae piscis eleuata, in medio sinum ostendunt: his per longum dissectis, vtrinque duae capsulae distinctae conspiciuntur, in quarum qualibet, semen vnicum rufum, cochleae instar conuolutum acuminatum & acre continetur. Iunio mense florentem & siliquas ferentem, legimus. Hanc videtur Herbarij Lugdunensis auctor, sub Sinapi echinato voluisse proponere, verum figura vitiosa & descriptio non sufficiens.

I. *SINAPI* paruum siliqua aspera: radice est oblonga, crassiuscula & capillata, ad quam folia plura, *Erucae* sylvestris minoris forma, sed minora, in lacinias tenuissimas diuisa, & acra: cauliculi plures, recurui, laeues, duarum triumve vnciarum (rarissime cauliculus palmaris erigitur) in alas vnciales brachiati: flores parui, pallide lutei, quibus siliquae multae strictae, vnciales & asperae, in latera diuaticatae, semen minutissimum continentes, succedunt: circa Monspelim prouenit.

F DE RE-



Reseda affinis Phyteuma.

Erysimo similis hirsuta alba.



DE RESEDA.

## CAPVT. VIII.

**R**ESEDA linariae folijs: ex radice candida, longiuscula, caulis cubitalis rotundus, in ramos palmares diuisus, folijs linariae strictissimis, oblongis, viridibus vestitus exurgit: rami singuli, in florū oblongam, veluti spicam abeunt, quam flosculi parui, muscosi, tenuibus capillamentis ornati, vt in Reseda minore alba (quam Sesamoidem paruum Salmanticensem Clusius nominat) pallide flauescens constituunt: quibus capitula vel vascula angulosa, bifida, exili semine pallido plena, succedunt. Hæc in solo arenoso conuallium montium Pyrenæorum, à D. Bursero collecta.

RESEDA affinem facimus eam quam Phyteuma Monspeliensium, Lobelius & Lugdunens. vocant,



describunt & depingunt: verum cum folijs nunc oblongis, nunc in aliquot lacinias diuisis repertiatur, vna figura exprimere volumus.

DE ERYSIMO.

## CAPVT. IX.

**E**RYSIMO similis hirsuta: ex radice oblonga, alba, lignosa & fibrosa, caulis modo vnus, modo plures cubitales, aliquando subrubentes, striati, hirsuti, aliquando in ramulos brachiati, exurgunt: folia plura, ad radicem humi strata, aliquando pediculis carentia, sesquiunciam longa, aspera, hirsuta, subalbicantia, per ambitum crenata, rarius laciniata, & quæ in caule minora sunt, eumque basilatiore cingunt: secundum ramulorum longitudinem, veluti in spica, flosculi albi, quadrifolij, pedicellis



dicellis insident, qui in siliquis oblongas, strictas, semen minutum continentes, abeunt. Provenit locis saxosis, ruderibus, muris, ut hic Basilea ad mœnia, ad arcem Mönchenstein, primoque vere florere: Monspeuli quoque in ruderibus umbrosis, sed per omnia minor: rarius in arenosis, ut apud nos ad Wiesam fluviū Parauj similiter collegimus, & hanc D. Guilandinus Dryophanon Plinij lib. 27. cap. 9. Drabam alteram & Thlaspi speciem: at D. Cortulus Erysimum tertium, nobis nominabat: post modum Barbare in muralem Ioan. Bauhinus fraterappe lauit. Huius descriptionem & iconem, in Matthiolo emaculato, exhibuimus.

## DE PERSICARIA.

## CAPVT X.

**PERSICARIA** angustifolia: ex radice nigricante, fibris oblongis capitata, caules plures cubito altiores, rubentes, laeues, geniculis distincti exurgunt: quos folia, Persicaria vulgaris folijs triplo, quaduplo angustiora, duas, rarius tres, uncias longa, ambiunt, & in summo in ramulos brachiantur, quibus spicae oblongae, floribus pallide purpurascensibus ornatae, ut in vulgari insident.

In humidis circa Michelsfeldam, aestate florens, reperitur.

Nasturtium hortense latifolium.



Nasturtium hortense crispum angustifolium.



F 2 DE



Nasturtium hort. crispum latifolium.



DE NASTURTIO.

CAPVT XI.

NASTURTIVM hortense duplex est, plano & crispo folio: illud latifolium, cuius solum fi-

gura adposita, & angustifolium vulgatius: hoc, quod crispum similiter duplex est.

I. NASTURTIVM hortense crispum: hoc, folijs exceptis, cum vulgari conuenit: huius enim folia crispa sunt: estque duplex, latifolium & angustifolium, quemadmodum binis figuris in Matthiolo exhibuimus (cum saepius in hortulo nostro creuerit) & hic repetere placuit.

II. NASTURTIVM pratense paruo flore: ex radice tenui, fibrosa, caulis cubitalis, viridis, varie incuruatus exurgit, folijs attrouirentibus, oblongis, Erucae syluestris minoris, aut Sij forma, vtrinque longis petiolis in lobos subrotundos; aliquando oblongos diuisis, & per ora dentatis, cincti in caulis summo, flosculi parui, albi, velut in umbella dispositi, quibus filiquae paruae semine minutissimo refertae, succedunt. Circa Montembelgardum locis humidioribus prouenit. Suspiciamus Matthiolum, quem Tabernæmontanus secutus est, sua figura Sisymbrij aquatici alterius, duas plantas miscuisse: ita ut florum umbella, huic iam descriptae, folia vero, Nasturtio pratensi vulgato magno flore conueniant.



NASTUR-



Nasturtium aquaticum maius &amp; amarum.



Nasturtium alpinum minus Reseda folijs.



NASTVRTIVM aquaticum maius & amarum, quod Thalius nomine Sifymbrij alterius specie secunda descripsit, & sæpe inter Nasturtium aquaticum supinum reperitur, à quo sapore amaro potissimum distinguitur, hic describere nolimus, at figuram adponere, cum nullus eam exhibuerit, voluimus.

III. NASTVRTIVM sylvestre minus: ex radice tenui capillacea, cauliculi plures (& quantum ex sicca colligere licet reclinati) trium quatuorve uncularum emergunt: folijs Nasturtij vulgaris formæ, sed minoribus, per terram sparsis & etiam cauliculos cingentibus: in quorum summo flosculi parui albicantes, valvulae exiguae, ut in Iberide, vel Bursa pastoris minima. Hoc primo vere, ad alueos aquarum salugine imbutarum Franckenhusij Thuringiorum, copiosissime erumpit, unde D. Eurerus

cum alijs elegantissimis, Iberidis pusillæ, seu Nasturtij sylvestris Franckenhusiani nomine, misit.

IV. NASTVRTIVM alpinum minus Reseda folijs: ex radice alba tenui & oblonga, cauliculi laxes, tenues, recurvi, communiter indivisi, palmoque minores prodeunt: folijs longis pediculis, instar Reseda vulgaris, præditis, in lobos tres, vel quatuor subrotundos, divisis: flores, in cauliculis summis albi, mediocri magnitudinis, quibus siliquæ strictissimæ, sesquiunciales succedunt. In Rhætorum alpinis Iulio florens, reperitur. Verum ex Helvetiorum alpinis & Pyrenæis, longe minus habemus, ita ut tota planta absque radice, uncias tres non superet.

V. NASTVRTIVM alpinum capsula Nasturtij hortensis: radice est lignosa, parum fibrosa, cauliculis uncias duas non excedentibus: foliolis parvis,

F 3 uis,




uis, angustis, crassis, vngue breuioribus: flosculis paruis albis, capsulis satis magnis, Nasturtio hortensi similibus. In Rhætiae monte Nombre prope Balneum Worms, estate florens, Io. Bauhin. frater collegit.

VI. *NASTURTIVM* alpinum Bellidis folio maius: Ex radice caulis cubitalis rotundus, lævis, ad exortum statim diuisus, prodit: folia habet tenuissima, bellidis forma, vncias quatuor longa, quæ vero in caule sunt, pediculis carent, & instar Thlaspi vulgaris lato semine, leuiter sinuata, cum ambiunt: flores albi, in caulis summo, quasi in spica vncias sex longa, quibus siliquæ triunciales, angustæ, semine rufescente, rotundo, plano, refertæ, succedunt. Circa Fabarias Thermas, ad aquæ defluxum, D. Burferus legit.

VII. *NASTURTIVM* folijs Barbareæ: Radice est parua, capillacea, albicante: cauliculis

pluribus tenuissimis, fragilibus, reflexis, nonnihil villosis, nonnunquam in alas diuisis, semipalmatis, palmaribus & nonnullis cubitalibus: folijs ad radicem pluribus, paruis, tenuissimis, viridibus, foliorum Barbareæ modo, sed minus frequenter sinuatis, quæ in cauliculis rariora sunt, & quædam minime sinuata: flosculis est minimis albis: siliquis oblongiusculis & strictissimis. Hoc Cardaminæ aut Eruce peculiaris nomine,

D. Burferus ex Austria, sed in finibus Bohemæ collectum, transmissit.



DE THLAS-



Thlaspi villosum capsulis hirsutis.



DE THLASPI.


CAPVT XII.

I. THLASPI vaccariæ folio, Bursa pastoris lili-  
quis: caule est cubitali, rotundo striato, laui,

viridi, ramoso, quem folia vaccariæ similia, atrou-  
rentia, glabra, pediculis carentia, cingunt: flores  
parui, albi: siliquæ Bursa pastoris forma, sed maio-  
res: Non longe Monspelio, in horto Dei dicto, D.  
Burserus collegit.

II. THLASPI vaccariæ incano folio minus:  
Totaplanta villosa, & incana est: ex radice crassi-  
uscula, rufescente, cauliculi semipalmares, etiam  
minores, recurui & quasi repentes, villosi & incani  
prodeunt, folijs paruis incanis, vaccariæ similibus,  
pediculis carentibus & alternatim dispositis, vesti-  
ti: in quorum summitate, flosculi plures, albi, quasi  
in subrotunda spica vniti, quibus thecæ paræ suc-  
cedunt. Hoc in agris Monspelensibus repens, &  
in Prouincia prope Massiliam, paulo maius & ere-  
ctius reperitur.

III. THLASPI villosum capsulis hirsutis: ex  
radice tenui, oblonga, albicante, caulis pedalis v-  
nicus rotundus, villosus exit: ad cuius exortum fo-  
lia aliquot humistrata, longis pediculis donata, or-  
biculato cuspide, hirsuta: quæ vero in caule, longe  
breuiora, pediculis carentia, latiore basi ipsum am-  
plectuntur, quorum quædam leuiter crenata sunt:  
flores albi quadrifolij: siliquæ magnæ, hirsutæ,  
compressæ, longo pediculo donatæ, superiore  
parte fissæ, vtriculis duobus præditæ, in quibus se-  
men rufescens, acrisaporem præditum, continetur.  
Hoc anno 1577. in horto Patauino (postmodum  
Monspessuli sponte natum) collegimus: cuius se-  
mine, in Italia pro vero Thlaspios semine, olim v-  
sos fuisse, ex D. Cortuso cognouimus: hoc in Phy-  
topinace primum sub 19. Thlaspi, dein  
in Matthiolo, figura addita,  
exhibuimus.



IV. THLAS-



Thlaspi Creticum flore albo.



IV. THLASPI Creticum flore albo radice est oblonga, paucis fibris donata, cauliculis palmum superantibus, rotundis: folijs paucis, oblongis, angustis, laevibus, alternatim caulem vestientibus: in cauliculorum summo, flores candidi magni, quib. thecæ magnæ, apice medio donatæ succedunt. Hoc Thlaspi, Cappadocici fruticantis flore albo perennis nomine, D. Doldius Norinbergæ misit.

V. THLASPI saxatile rotundifolium: Ex radice alba, longa, fibris carente, sublignola, cauliculi plures, tenues, pedales, reflexi, & fibris capillaceis, deorsum missis, terræ affixi, prodeunt, folijs est parvis, subrotundis, tenuibus, inter quæ cauliculi palmares, nudi exurgunt, flores paucos pallidos sustinentes, quibus siliquæ parvæ, tenuissimo filamento donatæ, semen minutum concludentes, succedunt. In locis petrosis circa oppidum Lauffen M. Hagenbachius reperit.

Thlaspi alpinum minor capitulo rotundo.



VI. THLASPI alpinum folio parvo crenato: vel Thlaspi alpinum minus capitulo rotundo: à radice crassâ, è rupium fissuris prodeunte, caules exurgunt tenues palmares & sesquipalmares in ramulos brachiatî: folia habet ad radicem plura, brevîa, acuta, leuiter crenata, longis pedicellis donata, in caule pauca & angustiores flosculi in summo albicantes, quibus folliculi copiosi, oblongis pedicellis insidentes, tenues, subrotundi, septo membranoso distincti, semen minutum flauum & acre continentes, succedunt. Prouenit in monte Wasserfall, & in Heluetiorum ac Rhætorum alpibus. Huius in nostro Matthiolo & figuram & descriptionem, sub Thlaspi saxatili minori folio exhibuimus: &

Thlaspi alpini maioris iconem addidimus: utramque & hic exhibemus.

VII. THLAS-



Thlaspi alpinum maius capitulis rotundis.



Thlaspi montanum incanum luteum.



VII. THLASPI alpinum repens: ex radice oblonga, cauliculi plures, per terram repandi, trium quatuor vel quinque vnciarum, folijs parvis subrotundis, inordinate dispositis, vestiti prodeunt, floribus copiosis magnis & albis ornati, quibus siliqua, Thlaspi bellidis folio similes, succedunt, sapore est Erucae. D. Burferus ad Thermas Fabarias Heluetiorum, dein in Austria collectum, transmissit.

Variat ratione loci: illud enim folijs est leuiter hirsutis, floribus communiter purpurascens, rarius albis: hoc vero folijs est glabris, floribus albis.

Et sic Thlaspi montani incani lutei serpillifolij maioris figura erat adponenda, cum minus recte sculptor, apud Lobelium nomine Thlaspi supini lutei, expresserit.

VIII. THLASPI bifidum villosum flore calcarati donato: caule est cubitali hirsutie aspero, summitate in alas brachiata: quem folia crassa, villosa, aspera, per marginem profundis incisuris crenata, quaedam sinuata, vncias duas longa, semunciam lata, vsq; ad summum, basilata vestiunt: flores habet luteos, magnos, calcarati vt in linaria donatos, quibus peltae duae rotundae vnita, semen continentes, & in apicem oblongum desinentes, succedunt. In saxosis Gallo prouinciæ Bormij non longe ab Insulis Stechadibus prouenit, vnde D. Burferus attulit.

IX. THLASPI fruticosum leucoij folio latifoliū: caulibus est pedalis, rotundis, lignosis, quos folia pallide virentia Leucoij forma, sed breuiora & angustiora, vestiunt: flores in summitate pallidi, magni, & vascula bifidula. Circa Massiliā D. Burf. legit.

G

Idem,



Idem, sed minus & folijs angustioribus, ex Italia, Thlaspi perpetui nomine, habemus.

X. THLASPI Alexandrinum: planta est elegantissima, dodrantalis, ex cuius radice singulari, caules plures in ramulos brachiati, prodeunt, & ad divisiones singulas, folia subrotunda perfoliata instar, ramulos ambiunt: à ramulorum extremitatibus, ex pediculis dependent filiquæ plurimæ, fere circinata, ut in Thlaspi tenui folio Fuschii, eoque ordine, sed maiores, Nasturtij vulgaris fere magnitudine, in angulum oblongum cum cuspidē desinentes, quæ in partes duas finduntur, & membranulam tenuem relinquunt. Hoc apud Iohan.

Bauhinum fratrem vidimus, quod à Cortuso accepit, ut in Phytopinace monuimus.

Bursa pastoris maior loculo oblongo.



DE BURSA PASTORIS.

CAPUT XIII.

I. BURSA pastoris maior folio non sinuato: radice est longiuscula tenui, aliquando capitata: caule palmum superante, communiter uno (rarius pluribus) ramoso: folijs atrovirentibus, ad radicem longis pediculis donatis, quæ circa caulem alas duas habent & bali complectuntur: floribus & thecis cum vulgari convenit. Basileæ in arenosis: Italiæ sylvestribus, circa Monspelium (ubi tamen longe minor est) quoque notauimus.

II. BURSA pastoris maior loculo oblongo: radix tenuis, fibrosa, inutilis & alba, cauliculum palmarem, hirsutie asperum, ramosum: aliquando vix semipalmarem, sed alis carentem. emittit, ad cuius exortum, folia aliquot inter se viridia, humi strata, vnguis magnitudine, ovali figura, serrata, hirsutie aspera: quæ vero caulem ambiunt, pauca sunt & pediculis carent: flosculi in summo multi, parui, congesti, albi, quibus loculi parui oblongi, è petiolis oblique tendentibus, succedunt: quibus semina duo, parua, fulua, acris saporis, includuntur, quæ loculo maturo aperto, & tantum altera parte foliacea relicta, decidunt. Apud nos locis siccioribus & campestribus, Marrio florens & loculis onusta reperitur, ut in Phytopinace monuimus. Monspessuli, Thlaspi Veronicæ folio nominatur,

& hanc videtur Doctiss. Columna, sub

Draba minore murali discoide descripsisse.

III. BURSA



Bursa pastoris alpina hirsuta.

Myagrū monospermon latifolium.



DE MYAGRO.

## CAPVT XIV.

III. Bvrsa pastoris alpina hirsuta: radice est vinctali. foliis copiosis pallide virentibus, in orbem humistratis, mollibus, incanis, lenticulae magnitudine, leuiter crenatis, aliquando integris: canticulis aliquot tenuissimis, leuiter hirsutis, pene nudis, tres quatuorve vncias longis: flosculis paruis, albis: loculis flauescens oblongis, multo quam in vulgari maioribus, semen minutum rufum continentibus: in alpihus Helueticorum, vt monte Fracto & Spligel, reperitur.



I. MYAGRVM foetidum: ex radice caules cubitales, aliquando sesquicubitales, virides, crassi, rotundi & asperi exurgunt, quos folia pallide virentia, subaspera, leuissime sinuata, quatuor vel quinque vncias longa, sesquiunciam lata, alternatim cingunt, qui in summo in alas breues diuiduntur, quibus flores pallide lutei, longis petiolis donati, veluti umbellae insident, hisque ytriculi orbiculati, minutum semen continentes, succedunt. Hoc apud nos in arenosis ad pontem fluminis Wirsen repertum, quod ad differentiam vulgaris, ab odore, foetidum appellare placuit.

G 2

II. MYA-

to: ra-  
capil-  
ei vno  
bus, ad  
ca cau-  
flori-  
ae in a-  
m (vbi  
radix  
palma-  
vix se-  
cuius  
strata,  
virtutis  
sunt &  
parui,  
e pe-  
bus se-  
luntur,  
a parte  
cciori-  
culis o-  
uimus.  
inatur,

Bvr-



II. MYAGRUM monospermon latifolium: caule est cubitali, aliquando altiore, rotundo, tortuoso, varie & inæqualiter brachiato: folijs vulgari viridioribus, latoribus, linea alba diuisis, obtusis, latiore basi caulem amplexantibus, ijs quæ ad radicem sunt, Cichorij satiui modo laciniatis, reliquis aliquando sinuatis: floribus luteolis, paruis, quibus vtriculi oblongi peræ similes, superne in duas extuberantias desinentes, quorum medio apex insidet, per maturitatem, vti & totus fructus, durus: in cuius vtriculi medio, cauitas vnica, semen vnicum (vnde nomen) rufum, oblongum continens. Sapore Myagro non respondet. Hoc in horto D. Felicis Plateri primum, dein in horto Illustr. Ducis Wirtembergici, quod Montembelgardii frater coluit, (cui semen Bricourrues nomine missum fuit) legimus: ex Euganeis quoque accepimus, & Pseudoisatidem ab Alpino vocari intelleximus. In Phytopinæ primum sub g, dein in Matthiolo figura addita, descripsimus.


III. MYAGRUM monospermon minus: ex radice parua, tenui, capillata, albicante, caulis vnus vel alter tenuis, pedalis prodit, folijs paucis tenuissimis, pallide virentibus vestitus: quorum ea, quæ ad radicem per terram sparguntur, parum sinuata sunt, pediculis oblongis donantur, & vnciam lata sunt: at quæ in summo caulis, basi sua in alas abeunte, caulem amplexantur: in summo strobili albi, conglobati: quibus vtriculus paruus, semen continens, succedit. Monspeffuli, non longe à monte Calcatis, D. Burserus collegit.

IV. MYAGRO similis siliqua rotunda: radix caulem cubitale, hirsutum, fragilem, in ramos varios brachiatum, emittit: cui folia ad radicem hirsuta, aspera & succulenta, quæ masticata, cum visciditate leuem acrimoniam exhibent, sex vncias longa, sesquiunciam lata: quæ vero caulem ambiunt minora, pediculis carentia & alata: flores pallidi, minuti, quasi in spica semipalmari dispositi, quibus semen paruum, rotundum, rugosum in apicem desinens, quodlibet pedicello oblongo insidens, primum viride, per maturitatem nigrum, medulla flaua, oleagiosa plenum, succedit. An-

Myagro similis siliqua rotunda:



nua est planta, ex semine deciduo renascens, Iulio & Augusto florens. Ioan. Bauhino in horto Montembelgardiaco nomine alicuius Myagri creuit. Monspelio prope Lunellam natum, Lepidij & à D. Doldio, Thlaspi nomine Norinberga, accepimus.





## DE DRABA.

## CAPVT XV.

**I.** DRABA tenuifolia velut spicata: radice est oblonga, tenui, albicante, caulibus pedali-  
bus, aliquando cubitum superantibus, fragilibus  
brevibus brachiatis: folijs paucis, tenuibus, pallide  
virentibus, nonnihil in ambitu dentatis, triuncia-  
libus, vnciam latis, basi lata caulem cingentibus, a-  
latis, gustu feruente & acri proditis: floribus albis,  
paruis, in cauliculis palmaribus, quasi in spica na-  
tis, quibus singulis semen rotundum paruum, lon-  
go pedicello infidens, succedit. Hanc Bononiæ D.  
Agerius legit, & Drabam feruentem vernam no-  
minaria affirmavit.

**II.** DRABA flore cæruleo galeato: ex radice  
fibrosa albicante, Asclepiadi simili, gustus ferui-  
dioris aromatici, caulis vnus (aliquando dico) cu-  
bitalis, læuis, striatus, in ramos brachiatus, exurgit:  
quem folia pauca vestiunt, quorum inferiore sub-  
rotunda, læuia, per marginem crenata, vncias duas  
longa, vncia minus lata: superiora vero angusta, a-  
cuminata & dentata, floribus est cæruleis galeatis,  
vt in Orchide, vnciam longis, alternatim in caule  
dispositis. Lutetia D. Cherlerus, ex Gallia Narbo-  
nensi, D. Burserus, attulere.

## DE COCHLEARIA.

## CAPVT XVI.

**I.** COCHLEARIA minor erecta: Ex radícula  
capillacea, cauliculus tenuis, læuis, palmo  
minor, prodit: foliola habet ad radicem pauca; exi-  
gua, oblongis capillaceis pedicellis donata, & quæ  
cauliculum alternatim ambiunt, lente minora sunt  
exiguus pedicellis donata & instar Cochleariæ Bri-  
tanncæ sinuata: in cauliculo summo, floscu' i albi,  
quibus siliquæ parvæ, oblongæ, semen minutissi-  
mum nigrum continentes, succedunt. Hæc in Da-  
niæ Insula Amagria, in autumno à D. Olao Worm  
collecta, & Hassnia, Cochleariæ nomine transmi-  
ssa fuit. Similem sed palmarem, cauliculo crassiore  
in duos ramulos diuiso, ex eodem loco, D. Caspar.  
Bartolinus misit.

**II.** COCHLEARIA Danica repens: hæc vn-  
ciarum trium est, radícula & foliolis priori simili-  
bus, sed numerosioribus, inter quæ cauliculi semi-  
unciales, minutulis flosculis albis ornati: Hæc eo-  
dem quo prior loco prouenit, humi instar herbæ  
cancri serpit, omnino folijs, floribus, seminū locu-  
lis & gustu priori respondens, quemadmodum D.  
Olaus Worm perscripsit, & D. Bartolinus, Coch-  
leariæ marinæ paruulæ repentis nomine misit.



## Brassica spinosa.



DE BRASSICA.

## CAPVT XVII

**I.** **N**APOBASSICA. Radicem habet Napo, aut Carotæ pene similem, admodum fibrosam & villosam, vt barbata aut pilosa, propter multiplices & minutas fibras, dici possit: & licet frequenter fibram pollice crassiorem habeat, attamen semper prima radix tuberosior & longior, quæ Napum imitatur, conspicitur; ex hac caulis sesquicubitalis, lævis, rotundus, in ramos brachiatus exurgit: folia ad radicem, vna cum pediculis oblongis, palmaria, Brassicæ sylvestris modo & subrotunda, & in profundas lacinas diuisa; quæ vero in caule, oblonga sunt; angusta, sinuata, pediculis carentia: flores lutei, intensioris coloris, quam in vulgari, magni, qui in cauli palmum excedente, inordinate longis pediculis insident, quibus siliquæ angustæ,

vinciales succedunt. In locis frigidioribus agri Norici, montanis potissimum & versus Bohemiam colitur, & ab incolis Dorsen vel Dorschen appellatur. Radix esui apta est, quare aliqui eam vt Brassicam floridam coniungunt: pauperes minutim vt Rappas concidunt: sic per hyemem in cella in arena, vel ad cibum, vel ad semen sequentis anni, asservatur. Aliquando radix propter nimiam æstatis siccitatem & loci angustiam, lignosior euadit: quare post siccationem, in area spatiosa plantanda est.

**II.** **B**RASSICA spinosa. Huius solum binos ramulos habemus, quorum descriptionem subiungamus: caulis lignosus, crassus, in ramulos duos, alterum palmo maiorem, alterum minorem, rotundum, lævem, striatum diuiditur: circa quos folia biuncialia, & semiunciam lata, per ambitum leuiter sinuata, quibus & minora interijciuntur: ramuli in spinas acutas, vnciales & minores abeunt. Ramulum vnum Patauij in horto Bembiano natum, à D. Camerario; alterum ex horto D. Alpini priuato accepimus, cuius figuram etiam Matthiolo nostro addidimus.

**III.** **B**RASSICA sylvestris alpina: ex radice exigua, alba, caulis palmo altior, rotundus, lævis exurgit: folijs est tenuibus pallide virentibus, leuiter sinuatis, circa radicem oblongis, plerumque vncialibus, in caule paucis, pediculis carentibus: in summo flores albi quasi in umbella dispositi, longiusculis pedicellis donati: siliquas non vidimus. Hæc in Austriæ montibus natam, Turritis alpina nomine, D. Burserus, misit.

## DE ACETOSA.

## CAPVT XVIII

**I.** **A**CETOSA Americana folijs longissimis pediculis donatis: ex radice caules plures, rotundi, striati, læues, cubitales, in terram reclinati, prodeunt, qui mox in plures ramos oblongos brachiantur: folia habet pallida & veluti nitroso puluere oblita, angulosa, non tamen vt in vulgari bifurcata, aut alata, sed potius Attriplices formæ biuncialia, & pediculis triuncialibus donata, mollia, carnosa, sapore acido, ex quorum sinibus alæ surgunt, folijs minoribus, sed eadem forma: in quorum, vt & caulis summo, flores exigui, muscosi, veluti in spica dispositi, emicant: quibus fructus foliacei (ex tenuibus rufescentibus membranis elegantissi-



gantissimis venulis, veluti in Fritillaria, per eas difcurrentibus, compositi) vt in alijs, sed quadruplo, quam in vulgari maiores, ex paruis pedicellis dependentes, succedunt, quibus semina triangularia oblonga, rufescentia & splendentia inclusa continentur. Hanc aliquot annis in horto aluimus.

II. ACETOSA rotundifolia alpina: planta palma minor, ex cuius radicle, folia quina, fena, viola lutea alpina modo rotunda, vnguem lata, pediculistres, etiam quatuor, vncias longis & tenuibus donata, prodeunt, & inter hæc, cauliculus lævis & nudus sexuncialis, exurgit in cuius summo flosculimuscosi parui, veluti in spica vnciali, cui foliolum simili forma subijcitur. Hæc in muris Noldochij, quod in monte maiore Bernhardi Helvetiorum est, prouenit, vnde D. Fleissus attulit.

III. ACETOSA scutata repens: radicle est rufescentibus, cauliculis nodosis, tenellis, per terram repentibus, vncias quatuor longis: folijs vnguem latis, sed longis pediculis cauliculos æquantibus, donatis, formam scuti, vel potius Aronis folium referentibus, in medio tamen vtrinque sinu obtinentibus & in apicem desinentibus. In horto Patavino nata.


IV. ACETOSA Cretica semine aculeato: radice est parua, rufescente, fibrosa, in summa tellure hærente: cauliculis quandoque pluribus palmam superantibus, humi reclinatis, quandoque vno, sed in ramulos brachiato: folijs paruis, oblongis, pediculo donatis, auriculis carentibus: flosculis multis, exiguis, muscosis, circa ramulos semipalmares in modum spicæ alternatim dispositis, quibus semen succedit, tenuibus membranis aculeatis inclusum, cui pediculus oblongus, incuruus, tenuis, vt in Caltha additur. Iunio floruit & semen maturuit, anno 1594. in Illustr. Ducis Wirtembergici horto, qui Montembelgardii colebatur, semine Florentia à Casabona misso: Hanc in Phytopinace & Matthiolo, figura addita, Acetosæ Creticæ nomine, proposuimus.

V. ACETOSA lanceolata angustifolia repens: hæc cauliculis est pedalibus, rotundis, striatis, per terram sparsis, folijs ternis, quaternisve, alternatim in caule dispositis, vncijs quatuor à se inuicem distitis, angustissimis, crispatis, vncias quatuor longis, lanceam referentibus, cum ex pediculo in alas

Acetosa Cretica semine aculeato.



duas vtrinque bifurcatas abeant, sensimque angustiora reddantur: floribus est minutulis, rubentibus, spicæ oblongæ adherentibus. Hæc in arenosis circa Norinbergam reperitur, vnde D. Doldius anno 1694. misit.





Laphatum maritimum foetidum.



DE LAPATHO.

## CAPVT XIX.

**L**APATHVM maritimum foetidum: radice est & caule atro rubente, pedali, incuruo, quem folia atrorubentia, subrotunda, longis pediculis donata, & vncialia interdum sinuata, communiter alata, ambiunt: ex quorum sinu ramuli exurgunt, similibus folijs cincti, quorum superiora leuiter per ambitum dentata sunt: in caulis summo flosculi quadrifolij, muscosi, quasi in spica dispositi: quibus vtriculi foliacei, subrotundi, satis magni, semen continentes, succedunt. Hæc dum viret grauis odoris est, & in maritimis non longe Monspelio prouenit.

Centaurium alpinum luteum.



DE CENTAVRIO MAIORE.

## CAPVT XX.

**C**ENTAVRIVM alpinum luteum: radicem habet rectam, profunde descendentem, crassam, parumque fibrosam, substringentem & Centaurij maioris sapore fere præditam. Caulis est sesquicubitalis, etiam bicubitalis, rotundus, striatus, in alas brachiatus: folijs ludit, quæ enim ad radicem palmaria, & sesquipalmaria, vncias quatuor lata, inæqualiter laciniata & crenata, glabra, pallide virentia, neruo albo folium percurrente: at quæ in caule sunt, planta florescente, quædam cubitum superant, quædam palmaria sunt, & in partes decem, duodecim, pauciores, pluresve, vncias quatuor longas, semunciam latas, per marginem leuiter dentatas, ita secantur, vt folia peculia esse videantur.



deantur. Flores lutei, Centaurio maiori similes, ramulis insident: ex calice enim squamoso, florum stamina plura prodeunt: ex capitulo ante meridiem liquor pellucidus, & Mannæ instar dulcis, in guttis seu stillis sponte exudat, & capitulum compressum & fustum, altero tamen die hunc humorem emit. Floribus semina Centaurij similia, aliquanto tamen minora, succedunt. In monte Baldo prouenit: plantam & semina, D. Doldius Norinberga quoque misit.


Beta Cretica semine aculeato.



## DE BETA.

## CAPVT XXI.

**B**ETA Cretica semine aculeato: ex radice tereti, breui, parum fibrosa, caules plures cubitales, per terram sparsi, rotundi, striati, ad radicem leui hirsutie canescentes, in ramulos effusi, exurgunt. folia habet pauca, Betae nigrae similia, sed minora, longis pediculis donata: flores parui, ex flauo virescentes: fructus statim ad radicem multi conspiciuntur, & hinc inde per caulem, ad quodlibet ferre folium asperi, extuberantijs donati, in aculeos tres, in latera reflexos abeunt: in cuius cauitate, granum vnum continetur, forma seminis Adonidis subrotundum, in apicem abiens, duplici membrana rufa tectum, interiore, proxime medullam albam farinaceam cingente. Hanc primum in horto D. Zuingeri, Iulij mensis principio florentem & Augusti fine semine praequantem, eamque aridam legimus & nunc à multis annis in hortulo nostro, colimus: cuius descriptionem in Phytopinace primum, dein in Matthiolo, figura addita, exhibuimus,





*Atriplex sylvestris lappulas habens.*




CAPVT XXII.

I. **A**TRIPLEX sylvestris fructu compresso roseo vel stellato: à radice caulis exurgit pedalis, rotundus, incuruus, læuis & albus, qui statim in aliquot ramos inæquales, & hic in alios minores, diuiditur; folia habet alba, quasi polline aspersa, vnguem lata, sinuata vel angulosa, vt in Atriplice sylvestri, quæ Pes anserinus dicitur, pediculis carentia: his fere singulis, fructus foliaceus, pallidus, cō-

pressus, apponitur, cuius formam elegantem vix exprimere licet: is enim in medio leuiter extuberrat, quatuor alijs extuberantijs, in circumferentia adpositis; quas tamen sinus leues intercedunt, ea plane forma, qua rosæ depressæ, in quorundam nobilium insignijs pingi consueuerunt: in singulis quatuor extuberantijs, semen compressum, mediocris magnitudinis continetur. Si fructus hi mori rudimentum exprimerent, ad Atriplicem sylvestrem bacciferum Clusij referri posset: Hanc Monspeffuli circa mœnia collegimus.

II. **A**TRIPLEX sylvestris lappulas habens: ex radice parua fibrosa, cauliculi palmares, striati, emittantur, quos folia atouirentia, parua, angulosa, alternatim disposita, breuibus pediculis donata, cingunt: ad quorum exortum lappulæ duæ, Coriandri seminis magnitudine, adherent, semen nigrum, paruum, compressum continent. Hanc Atriplicis syl. insipida parua erecta nomine, D. Doldius misit; at in monte Ventoso Gallia Narbonensis, altius excreuit. Hanc in Phytopinace sub octaua descripsimus, etiam in Matthiolo, vbi figura à sculptore non satis recte expressa addita, quare aliam in nostro Theatro, si Deus volet, & etiam nunc, proponimus.

III. **A**TRIPLEX maritima angustifolia: caule est subcano, lignoso, cubitali, ramoso, in spicas alias breuiores, alias longiores, pallide flauescences; & maculis nigris punctatas abeuntes: folijs inferioribus vncias duas, absque pediculo longis, angustis, crenatis, nigricantibus, superiorib. angustioribus, & plerisque crenis carentibus: plura non licet, cum solum ramum sicum Ruppellæ collectum, D. Rumbaum attulerit.



DE HA-



## DE HALIMO.

## CAPVT XXIII.

**H**ALIMVS minor: ex radice tenui, capillata, caulis cinericeus, palmum superans, varie incuruatus exurgit, qui paulo supra radicem, in ramulos plures tenues uncias tres longos, abijt: folijs paucis cinericeis, & oblongo rotundis: sed in ramulis angustioribus nonnullis instar Attriplicis, vtrinque vna lacinia diuisis: flosculi plures, parui, herbacei, muscosi, intus luteoli, longis pedicellis, per ramulorum summitates sparguntur: quibus vascula quadruplicia, semen paruum, griseum, reniforme, continetia, succedunt. Hic infra Northusam in der gult. den. 2. prouenit, vt ex literis D. Fureri colligere est qui plantam nomine Halimi aurei arui anno 1617. transmisit.


Cynocrambe Dioscoridis.



## DE CYNOCRAMBE.

## CAPVT XXIV.

**C**YNOCRAMBE Dioscoridis: ex radice oblonga, tenui, fibrosa, viticuli plures, palmares, quandoque longiores, rotundi, striati, laues & succulentis, virides, aliquando parum rubescentes, reclinati, geniculis plurimis distincti, prodeunt: ex quorum singulis emergunt primum foliola duo, Alſines forma subrotunda, mox alternatim ex vna parte, eodemque loco folium sextuplo maius, oblongo pediculo donatum, oxalidis rotundę folio oblongius, quadam veluti aspergine oblitum, succedit: tadem ad idem geniculum, alia decuplo minora, bina, terna, etiam sena notantur: iuxta quę ad ima radice, ad viticulorum summa internodia, flosculi, bini, terni, quaterni, muscosi ex herbaceo albidis, plurimis filamentis donati: quibus succedunt fructus totidem, geniculis inter folia hærentes, Mercurialis forma, sed minores, rotundi, duriusculi, primum virides, postea ex nigro cinerei, medulla alba reſerti. Herba gustu est insipido & aquoso. Montpeſuli locis vmbrosis legimus: mox Cynocrambe nomine & plantam & semen, à D. Cortuso accepimus, quę copiose nobis prouenit. Hanc videtur doctiss. Columna in suo Phytobasano, Alſines nomine expressisse, quam in Matthiolo descripsimus, & figuram adposuimus.





Lactuca folio oblongo acuto.



DE LACTUCA.

CAPVT XXV.

**I.** LACTUCA folio oblongo acuto: hæc radice, caule floribus, alijs lactucis similis est, & solum folijs differt, quæ leuiter sinuata sunt, palmum longa, uncias duas lata, in acum fastigiata, & nervo per folium excurrente eleuato. Huic, Lactuca Gallica, apud Durantem, valde similis est, quam à Ioa. Bauhino fratre accepimus, & in horto Montembelgardiano postmodum legimus.

**II.** LACTUCA Italica laciniata: huius folium tenuissimum est, pallide virens, in plures partes semipalmares & laciniatas diuisum: per reliqua vulgari Lactucæ similis, quæ esu tenerissima:

ex semine Italico in horto copiose creuit.

Sonchus asper laciniatus Creticus.



DE SONCHO.

CAPVT XXVI.

**I.** SONCHVS asper laciniatus Creticus: ex radice, caulis cubitalis, inæqualis, striatus, asper, cauus & ramosus exurgit: folijs ad radicem palmaribus & sesquipalmaribus, primis quidem vix laciniatis, alijs vero in plures & magnas lacinias diuisis, & in circumferentia nonnihil asperis: floribus est luteis, magnis, quorum singuli singulis oblongis pediculis insident, qui aliorum more in pappum in quo semen latitat, abeunt. Hic ex semine ex Creta accepto in horto creuit.

**II.** SONCHVS asper subrotundo folio: ex radice exili, longiuscula, cauliculus rotundus, palmaris, aliquando sesquipalmaris, parte inferiore breuissimis aculeis exasperatus, exurgit: circa quem folia pauca,



pauca, subrotunda, sesquiuncialia, quorum quædam sinuata, omnia tamen per marginem, vt & neruus per folij medium excurrans, leuissimis aculeis exasperantur: in cauliculi summo duo tresve pediculi, quorum singuli vnum florem Hieracio similem, paruum, luteum, qui in pappum abit, sustinent. Monspelij sponte nascitur, & Sonchus a spera vulgi flore Hieracij, nominatur.

Est huius & minor species, capillari radícula à qua pedicelli bini, quatuor vel sex vncias longi, aliquot vero vix vnciales, vnicum florem paruum luteolum sustinentes, exurgunt: flori, semen minutum nigrum, pappo adhærens, succedit: circa radicem folia fœna, septena, parua, obtusa, per latera dentata. ibidem reperitur.

III. SONCHVS læuis in plurimas tenuissimas lacinias diuisus: caule est viridi, læui, tenui, striato & pedali. in summo in alas brachiato: folijs in plures angust. lacinias diuisis, ad caulis diuisionem maioribus: floribus luteis mediocribus & in pappum abeuntibus. Monspelluli ad muros, vt & Florentie apud quos in acetaria venit, prouenit.

IV. SONCHVS angustifolius maritimus: radice est palmaris: tenui, fibris carente, folijs ad radicem pluribus, atroviuentibus, vncias quatuor, quandoque sex longis, rarius vnciam latis, per margines spinulis exasperatis, & reliquorum Sonchorum instar lac fundentibus, inter quæ caulis vnicus, palmaris & sesquipalmaris, tenuis, læuis, duobus tribusve foliolis sua basi eum cingentibus, cuius summo flos vnus, (rarius duo) satis magnus & luteus infidet, & tandem in pappum abit. In litore Veneto ad Lio primum, dein circa Monspelium, ætatis initio collegimus.

V. SONCHVS montanus læuis laciniatus minor: ex radice crassiuscula caulis in principio crassus & lignosus, rotundus, læuis, statim in alas brachiatus, ad cubitalem altitudinem accedens, exurgit: folijs est sesquiuncialibus, in paucas lacinias, late distantes & acuminatas diuisis: flores in caulis summo, veluti in spica alternatim dispositi, parui, & palliduli. In montibus Euganeis frequens est.

VI. SONCHVS villosus luteus minor: ex radice rufa longiuscula, fibris carente, cauliculi bini, terni, rotundi, nonnihil villosi, palmum superantes, & in summo in ramulos binos, ternosve diuisi, prodeunt: folia pauca ad radicem, vncias quatuor longa, sed angustissima, lacinijs late à se distantibus & læuibibus, diuisa, quæ circa caulem strictissi-

Sonchus montanus læuis laciniatus minor.



ma & vncialia: flores in summis ramulis intense aurei, ex paruis capitulis, suauit tomento villosis prodeuntes, in pappum abeunt. Tota planta leuiter tomentosa est, & à quibusdam Hieracium tomentosum dicitur. Monspelluli in luco Gramuntio prouenit.





## Cichorium spinosum Creticum.



DE CICHORIO.

## CAPVT XXVII.

**C**ICHORIUM spinosum Creticum: ex radice oblonga, mediocriter crassa, fibris paucis donata, denso cortice albicâte tecta, caulis durus, lignosus, mox in ramos multos palmares, virides, striatos, late diffusos brachiatur, qui oēs in oblongas, communiter bifurcatas, aliquando trifurcatas quasi spinas, seu cornua finiūt: folia circa radicem plura per terram sparguntur, q̄ oblonga, angusta, acuminata & Cichorij vulgaris modo in ambitu circumrosa, vel in plures lacinias superficiarias & subrotundas diuisa, quæ in cauliculis angustiora, nec circumrosa: amara sunt, non lactescunt & cito pereunt, etiam reliquis plantæ partibus eleganter virentibus.

Flores, in ramorum maxime alis, ex calicibus imbricatis prodeunt, forma vulgaris similibus, sed longe minoribus, carulei coloris, ex quinque folijs summa parte leuiter incisiss, compositi, in quorum medio stamina aliquot flaua continentur: his semen vulgari simile, parique thecæ inclusum, succedit. Iulio & Augusto floret. Hoc primum Chondrilla spinosa, dein Cichorij spinosi, nomine & planta & semen D. Dold. misit, ex quo in horto D. Zuing. creuit: postmodum ex Creta ab Honor. Belli, Cichorij spinosi appellationes, qui monuit, vulgo *σακκουλάρη*, hoc est, hydriam spinam dici, quo Cretenses in Cichorij defectu vtantur. Huius primum in Phytopinace anno 1596. meminimus, dein in Matthiolo iconem cum descriptione anno 1598. exhibuimus: postmodum Chondrilla peregrinæ nomine Clusius, & apud eundem sub Cichorio spinoso Cretico Belli, Pona an. 1601. proposuere.

## DE DENTE LEONIS.

## CAPVT XXVIII.

**D**ENS Leonis latifolius caulescens: caule est cubitali, hirsuto, rotundo, striato, & cauo; quem folia basi alata, in lacinias aliquot diuisa, subrotunda, vncias sex longa, setequinciam lata, marginibus non nihil pilosis, cingunt, quæque in caulis summo tantum leuiter sinuata, proxime caulem vestiunt: flos magnitudine fere & colore, sed pallidior, vt in Dente Leonis vulgari. Plantam hanc absque radice ex horto nobiliss. Nicolai Contareni, nomine Hieracij Hispanici à D. Loretio accepimus.

**II.** DENS Leonis tenuissimo folio: ex radice crassa, rufa & fibrosa; folia aliquot tenuissima, virore splendentia, palmaria, vncias duas lata, primum profunde laciniata, dein quælibet lacinia, vt plurimum vtrinque duplici, vel triplici leui lacinia (vel potius apice) subdivisa prodeunt, vt & pediculi tenuissimi, nudi, duabus vncijs folijs longiores, florem paruum sustinentes. In Austria prope montem *Drawenstetn* D. Burserus reperit.


**III.** DENS Leonis minor folijs radiatis: ad radicem parvam nigricantem, folia plura per terram sparsa, vncias tres longa, semunciam lata, in plures lacinias profundas diuisa, quibus hoc peculiare, quod quodlibet folium in summo in tres profundas lacinias diuidatur, & harum quælibet apices plures, quasi radios obtinet: foliorum pediculi leuissimis



uissimis pilis pubescunt, cauliculi plures, læues & nudi, quorum vnus palmo minor erigitur, reliqui breuiiores reclinati, singuli florem vnicum, paruum, luteum, in pappum abeuntem, sustinent. D. Neudorfferus communicauit.

IV. DENS Leonis minor aspero folio: ad radicem paruum albicantem, folia plura subrotunda, duas tresve uncias longa, vnam lata, laciniata & per ambitum leuissimis spinulis, vt in Soncho, exasperata: cauliculus duarum unciarum, florem satis magnum, pallide luteum sustinet. Monspessuli prouenit.

Hieracium dentis leonis folio hirsutie asperum minus.



## DE HIERACIO.

## CAPVT XXIX.

I. HIERACIVM dentis leonis folia hirsutie asperum minus: radice est parua, oblonga, ad cauliculorum & foliorum exortum rufescente, folia ad radicem pilosa, aspera, angusta, uncias duas longa, in lacinias diuisa, inter quæ cauliculi nudi, asperi, modo vnus, modo bini, ternive, palmam non excedentes exurgunt, florem vnicum, aureum in pappum abeuntem, sustinentes. Monspessuli prouenit.

Idem, sed longe asperius, folijsque latioribus, ex Hispania D. Albinus arculit.

II. HIERACIVM minus glabrum: ex radice albicante, oblonga, tenui, cauliculi palmares, rarius pedales, tenues, læues, virentes, in alas diuisi, exurgunt, folia habet pauca, ex virore splendentia, oblonga, angusta, raris lacinijs prædita: quorum quædam basi latiore & alata, cauliculum amplexantur: floribus est minoribus, quam in vlla specie, aureis, quorum singuli singulis pedicellis, vnciam superantibus, insident & aliorum more in pappo abeunt. Apud nos circa autumnum florens, in agris reperitur.

III. HIERACIVM dentis leonis folio obtuso minus: ad radicem paruum folia senu, septenave terræ incumbunt, quæ crassa & aspera, uncias duas longa, vnciam semis lata, obtusa, nec profunde laciniata: inter quæ caulis læuis, nudus & cauus exurgit, qui florem vnum pallide luteum & magnum sustinet. Prouenit in pratis extra minorem Basilicam.

IV. HIERACIVM dentis leonis folio floribus paruis: ex radice parua, lignosa, fibrosa, capillacea & albicante, caulis pedalis, rotundus, aliquantum hirsutus exurgit, quem ad radicem folia pauca, subaspera, coriola, acuminata, uncias tres longa, semunciam lata, cingunt: in caule ad eius medietatem pauca, solum dentata, eumque basi sua complectentia: cuius summo flosculi plures, lutei, pedicellis breuissimis insident. Hoc in Gallia Narbonensi circa Massiliam reperitur.

V. HIERACIVM dentis leonis folio bulbosum: radix ex aliquot oblongis quasi Asphodeli bulbis composita, de se mittit caulem cubito altiore, nudum, leuem, striatum, circa medium

in



in ramos pedales (vnum vel alterum) diuisum, quorum quilibet florem paruum, subflauum, sustinet: folia ad radicem per terram sparsa denti leonis similiter sinuata & corrosa, inferne molli lanugine pubescentia, superne subaspera, vnciam lata, tres longa, Monspelio D. Saltzmannus attulit.

VI. *HIERACIVM* tomentosum Hispanicum: tota planta mollis est, incaua, tomentosa; radicem habens cortice rufescente tectum, caulem palmarem, rotundum, incanum: folia ad radicem oblongis pediculis donata; vncias tres quatuorve longa, semunciam lata, mollia, crassiuscula, ad formam foliorum dentis leonis vulgaris sinuata, quæ in caule angustiora, minusque profunde sinuata: cauliculi summo, flores bini, terni, lutei, breuissimis pedicellis insident, quorum singuli ex eleganti calice hirsuto in plures apices diuisi, emicant. In aridis & saxosis Aragoniæ, D. Albinus obseruauit.

*Hieracium maximum asperum Chondrillæ folio.*



VII. *HIERACIVM* maximum asperum Chondrillæ folio: caule est sesquicubitali, crasso, rotundo, inæquali, striato & aspero: in summo in ramos semipalmares brachiato: quorum singuli singulos flores luteos sustinent: folia habet pauca, alternatim caulem ambientia, Chondrillæ modo in lacinias diuisa, vncias tres longa & hirsutæ aspera. Monspelluli in asperis, quæ loca cariges vocant, prouenit.

VIII. *HIERACIVM* alpinum angustissimo oblongo; folio: ad radicem duriusculam rufescentem, folia plura graminea, palmo longiora, glabra, atrouirentia, obseruantur: inter quæ caulis cubitalis, leuis, rotundus, striatus, paucis folijs cinctus & circa medium in plures ramulos diuisus, exurgit: ramulis singulis flos vnicus, paruus, luteus insidet, cui semen paruum succedit, quod cum suo pappo à vento excutitur. In môte Baldo reperitur.

IX. *HIERACIVM* alpinum pumilū Chondrillæ folio: tota planta palmaris est, ex cuius radice alba, cortice nigricante tecta, folia aliquot prodeunt: lœuia, pallide virentia, vncias quatuor longa, pediculis longis donata, vix laciniata: inter quæ cauliculus exurgit rotundus, folijs Chondrillæ modo diuisis cinctus, qui in summo in duos, tresve ramulos vnciales diuiditur, quorum singuli florem vnum, luteum satis magnum sustinent. Crescit in Sneeburg Austriæ, vbi D. Burserus legit, & anno 1616. Hieracij aphacoidis nomine, transmisit.

X. *HIERACIVM* intubaceum flore luteo. Hoc folijs est Intubi, caulem proxime ambientibus, alijs integris, alijs in sinus profundos laciniatis, longitudine vncias quatuor, latitudine sesquiunciam superantibus, atrouirentibus & læuibus: caulem habet tenuem, pedalem, ramosum, reclinatum & læuem: cauliculo pene palmari nudo, flos vnicus, luteus, mediæ magnitudinis insidet, cui semen paruum pappo inclusum succedit. Hoc (vt & subsequens) Hieracij Aphacoidis nomine à D. Doldio, dein ex Italia, Sonchi Hieracitidis nomine, accepimus.

XI. *HIERACIVM* Intubaceum flore magno albedo: hoc folijs est priore longioribus, latioribus, magisq; laciniatis: flore etiam maiore, albedo, medio luteo, foris subrubente.

XII. *HIERACIVM* proliferum falcatum: radicem habet albicantem, oblongam, tenuem, capillatam: folia atrouirentia, dentata, aspera, vncias duas longa, semunciam lata: cauliculos læues, rotundos,



tundos, parum foliatos, palmates: capitulum paruum, ex plurimis stylis gracilibus, per maturitatem recuruis, & asperis, compositum, inter quæ flos luteus, medio fuscus: at sub floris capitulo, communiter vtrinque ramulus vnus, rarius duo, læuis, nudus, vncias quatuor, quandq; superans, exurgit, quibus vtrinque foliolum angustissimum subijcitur, & horum summo similiter flos insidet, & sæpe sub hoc quoque flore, pedicellus flosculum sustinens, emergit.

Hoc minus etiam reperitur, ita vt tota planta, palmum non excedat. Monspelluli in luco Graniuntio reperitur, & quod minus est, Hieracium medio luteum vocant.

XIII. HIERACIVM minimum falcatum: plantula est vncias sex non excedens, radícula longiuscula, tenuissima, rufescente, ex qua cauliculi aliquot capilli crassitie, in ramulos diuisi, inter folia laciniata, læuia, vncias duas longa, at angusta, exurgunt: flores singuli exigui, luteoli, pedicellis singulis insident, qui instar prioris in stylos minutissimos recuruos & pungentes, absumuntur. In arenoso litore maris non longe Monspelio inuenimus.

XIV. HIERACIVM montanum rapifolium: ex radice rufescente, oblonga, parum capillata, folia pauca, ad Rapæ vulgaris modum, in lacinias subrotundas, per margines sinuatas, & ad tactum asperas, diuisa, pediculis oblongis rubentibus & asperis donata, prodeunt: inter quæ caulis cubito altior, cauus, striatus rufescens, vno altero ve breui folio cinctus, exurgit, qui superne in ramulos plures diuiditur, quorum singulis, flos communiter vnus, rarius duo, pediculis tamen distinctis insidet, luteus, mediæ magnitudinis, qui tandem in pappum abit. In monte Wafferfall prouenit.

XV. HIERACIVM montanum folijs dentatis flore magno: hoc folijs est atrouirentibus, lanugi-

ne carentibus, ad radicem maxime dispositis, vncias quinque, longis, vnam latis, per circumferentiam & dentatis, & leuissima lanugine pubescentibus: inter quæ caulis pene nudus, pedalis, cauus, hirsutic asper, exurgit, qui florem vnum eumque magnum, saturate luteum, eleganti quasi calici inclusum, sustinet. Hoc in Heluetiorum montibus, Gottardo, & circa Thermas Fabarias, crescit.

XVI. HIERACIVM ramosum magno flore: hoc caule est bicubitali, rotundo, subaspero, in ramos diuiso, quibus singulis, flos magnus, aureus, dentis leonis formæ insidet: folia habet pallide virentia, non nihil aspera, sinuata, & per margines exiguis pilis donata, longitudine palmum superantia, tres vncias lata, per quorum longitudinem, costa insignis excurrit, à qua per transversum venæ feruntur. In montibus Belluensisibus reperitur.

XVII. HIERACIVM alpinum non laciniatum flore fusco: caule est sesquipalmari, hirsuto, parte superiore aphylo: folijs ad radicem hirsutis, obscure virentibus, acuminatis, duas treve vncias longis, vnciam latis: floribus aliquot paruis, fuscis, in pappum (cui semen paruum oblongum & nigrum includitur) abeuntibus, & caulibus summo insidentibus: quod in Rhæticiis montibus prouenit.

XVIII. HIERACIVM hortense non laciniatum floribus atropurpureis: caule est bicubitali, hirsutie aspero, & pene aphylo: folijs ad radicem paucis, palmaribus, vncias tres latis, obscure virentibus, leuiter hirsutis, & per marginem leui lanugine pubescentibus, floribus atropurpureis, in medio subflauis & mellei odoris: quod à quibusdam Pilosellæ maioris nomine (siquidem cum Auricula muris maiore Tragi, multum affinitatis habeat) in hortis colitur: & à priore cultura solum differre videtur.



*Hieracium pumilum saxatile asperum, radice præmorfa.*



**XIX. HIERACIUM** pumilum saxatile asperum: radice præmorfa: ad radicem crassiusculam nigricantem, in fibras oblongas, præmorfas abeuntem, folia plura, villosa, acuta, longis pediculis donata, vncias tres, quatuorve longa, semiunciam lata, in circuitu rarioribus denticulis donata: inter quæ cauliculus palmo minor, hispidus, tenuis & rotundus, vno alterove foliolo vestitus exurgit, florem subluteum sustinens, cui semen paruum, nigricans, pappo immersum, succedit. In alpebus provenit.

Variat: nam & altera est species, folijs subrotundis, duas tresve vncias, absque pediculis biuncialibus, longis, sesquiunciam latis, per marginem crenatis: cauliculo longiore, tres quatuorve flores sustinente, & hoc Hieracium saxatile asperum radice præmorfa folio subrotundo dici potest.

Est & tertia species, radice crassa, caulibus in


plures ramulos diuisis: quod in saxosis prope Clusam Solodurensum nascitur.

Priori plane simile Hieracij paruuli quarti nomine doctiss. Columna p. 2. proposuit, solum in eo differens, quod nostrum hirsutum sit, suum vero glabrum asserit.

**XX. HIERACIUM** montanum lanuginosum laciniatum paruo flore: ex radice oblonga, atroturbente, folia plura, pediculis vncias tres longis, donata, crassa, profunde laciniata, acuminata, molli lanugine pubescentia, superne atrouirentia, & quasi maculata, alia sesquiunciam lata, alia angustiora, inter quæ cauliculus palmaris, tenuis, mollis exurgit, cuius summo, flores aliquot lutei, parui, & quidem singuli singulis pedicellis insident. Apud Monspelienfes, in horto Dei crescit.

**XXI. HIERACIUM** capillaceo folio: radice est Scorzonera simili, crassa, oblonga, tunica fusca & rugosa vestita, ex qua cauliculi bini, palmares, laues, singuli florem vnicum, pallide luteum, mediae magnitudinis, sustinentes exurgunt: folia ad radicem plurima, pili instar tenuia, duas, rarius tres, vncias longa, rigidiuscula, atrouirentia, rarius cauliculorum partem cingentia. Monspelio D. Saltzmanus attulit. An forte Scorzonera.

Species:



**XXII. HIERACIUM**



Hieracium murorum angustifolium  
non sinuatum.



XXII. *HIERACIVM* murorum angustifolium non sinuatum: ex radice crassa, rufescente, caulis sesquicubitalis, pene nudus, rotundus & asper exurgit, in cuius summo quasi in umbella, flores plures, parui, lutei, resident: folia ad radicem sub nigra, mollia, vncias sex longa, vix semunciam lata, in caulis parte inferiore pauciora, breviora, angustiora, longe à se inuicem distantia & inordinate disposita: in muris nostris reperitur: quod circa Patavium, longe minus observauimus.


XXIII. *HIERACIVM* profunde sinuatum pubescens: radice est nigricante, lignosa, fibrosa, caule bicubitali, rotundo, fistuloso, leui lanugine, vt & tota planta, pubescente, in ramos brachiato: folijs ad radicem oblongis, acutis, profunde sinuatis, etiam laciniatis, oblongis pediculis donatis, per caulem paucis, similiter acute laciniatis: flores singuli,

singulis pediculis, aurei, in pappum abeuntes, insident: In pratis Michelfeldenlibus siccioribus ad dumeta etiam in dumetis, prouenit.

XXIV. *HIERACIVM* fruticosum latifolium glabrum: ex radice fibrosa, nigricante, caules bicubitalis, rotundi (leuissimis pilis hinc inde aspersis) exurgunt, qui in summo in ramulos breues brachiantur, quibus flores pallide lutei, vt in Hieracio Sabauda siue fruticoso, insident: hos folia ambiunt alternatim disposita, tenuia, atrouirentia, acuminata, vncias quatuor vel quinque longa, sesquiunciam lata, per marginem oblongis & raris apicibus donata: hoc in montosis circa acidulas Petrinas Iulio floret.

XXV. *HIERACIVM* fruticosum folio subrotundo: caule est cubitali, rotundo, striato, subaspero, qui in summo in ramulos, trium quatuorve vnciarum brachiatur, qui singuli, singulos flores, pallide luteos in pappum abeuntes, sustinent, quem folia subuiridia, subrotunda, acuminata & dentata, vncias duas longa, sesquiunciam lata & leuiter hirsuta, basi sua cingunt: quod Hieracij foliati nomine D. Iungerm. misit.

XXVI. *HIERACIVM* fruticosum minus: huius varietas triplex occurrit, nam licet ex radice fibrosa, & quasi præmorsa, caulis pedalis simplex exurgat, attamen folijs breuibus & læuissimis, circa Patavium: at circa Norinbergam, paucis, breuibus, subrotundis, in circumferentia crenatis & asperiusculis prouenit.





Chondrilla viscosa humilis.

Chondrilla purpurascens foetida.



## DE CHONDRILLA.

## CAPVT XXX.

**I.** CHONDRILLA viminea viscosa Monspeliaca: ex radice oblonga, pallide lutea, caulis bicubitalis, albus, rotundus, striatus, in plures ramos brachiatus, exurgit: folia, caulis partem inferiorem cingentia (prima enim humi sparsa cum cito marcescant ut in vulgari, non notata) saliginis similia, uncias sex vel octo longa, semunciam lata & laevia, rarius una, altera ve lacinia donata: at superiora ramos cingentia, instar Chondrilla in tenuissimas & acutissimas lacinias diuiduntur: flores parui, lutei, ut in vulgari dispositi, in pappum, cum semen maturuit, euolantes. In aridis aggeribus viarum, estate circa Monspelim & in monte Lupi, reperitur.

**II.** CHONDRILLA viscosa humilis: ex radice longa, tenui, alba, cauliculi plures, tenues, reflexi, pedales, prodeunt, quos utrinque ad palmam longitudinem, flores lutei, oblongi, in pappos abeuntes alternatim cingunt: folia habet ad radicem oblonga, angusta, quaedam sinuata, quaedam integra, & in caule paucissima: in agris Basileensibus autumnoflorens, inuenitur.

**III.** CHONDRILLA purpurascens foetida: ex radice oblonga, tenui, fibrosa, caules plures, ad cubiti altitudinem accedentes, ad exortum parum pilosi; ex rubore obscuro, cum foliorum pediculis splendentes, alias virides & striati, in summitate aphylli, exurgunt: folia ad radicem plura, palmum excedentia, instar foliorum Chondrilla Sefamoidis dicta, plus minusve sinuata, & acuminata, mollia, aliquando pilis exiguis cincta, nervo folium percurrente,



*Iacobaea maritima latifolia.**Iacobaea alpina folijs rotundis ferratis.*

currente, inferne (vt & foliorum pediculi) hispido: singulis caulibus, qui raro brachiantur; flos vnicus peramanus, magnitudine & forma Ptarmicæ Austriacæ, insidet, cuius discum medium, foliola sedecim & plura oblonga, diluto rubore purpurascencia, in apicibus diuisa, orbiculatim cingunt: qui, vbi semen maturuit, in pappum oblongum abit. Hanc Iulio mense florentem, primum in horto D. Zuingeri legimus, & in nostro columinus: fecit eam, quia flos antequam aperiatur, grauem odorem spirat, qui & in folijs aliquantum aduertitur.

## DE IACOBÆA.

**I.** IACOBÆA maritima, siue Cineraria latifolia: hæc ex radice caules cubitales, rotundos, candido, mollique tomento obductos, in alas bra-

chiatos, emittit: folia inferiora subrotunda, cum pediculis pedem longa, vncias quatuor lata ad modum Brassicæ vulgaris laciniata, & per marginem sinuosa, superne ex viridi nigricantia, inferne incana, quasi cineribus aspera & mollia: at superiora minora & acutiora: flores, qui in hac quam vulgari maiores, oblongis pediculis incanis & nudis insident, quorum discum aureum, folia latiuscula, pallidiora, orbiculatim cingunt, qui tandem in pappos cum semine abeunt. Hanc à D. Doldio accepimus.

**II.** IACOBÆA rotundifolia incana: radice est crassiuscula transuersa, rufescente, in fibras oblongas abeunte: caule pedali, incano: folijs subrotundis, crassis, superne virentibus, inferne incanis, vncias duas abque pediculis, longis, sesquiunciam latis, in ambitu dentatis, at in caule paucis & angustissimis: flos, qui Scorzonera flori similis, summo

I 3 cauli



cauli infidet, satis magnus & luteus: tota plantæ lanugo quædam aspera est. In prouincia Gallie D. Buserus legit.

Iacobæam alpinam folijs rotundis serratis, sub

conyza alpina siue montana, Gesnerus proposuit: at Clusius, Iacobæam 4. vel latifoliam 2. nominauit & descripsit: huius figuram à nemine, quod sciam, propositam, addere placuit.

## LIBER QVARTVS. DE TANACETO.

### CAPVT I.

**T**ANACETVM alpinum: herbula est vnciarum quatuor, vel sex, odore aromatico prædita, tota incana, & pilis molliibus vestita: radice longa, crassiuscula, folijs vncialibus, tenuissime, vt in Millesfolio alpino, à quo, odore potissimum discernitur, diuisis: in cauliculorum summo, flores in umbella dispositi, albi & parui. Hoc in altissimis montibus Helueticorum & Rhetorum crescit: & hoc forsitan Gesnerus in catalogo hortorum Germanie, Iuam Moschatam Rhetorum appellat.

### DE CHRYSANTHEMO.

#### CAPVT II.

**C**HRYSANTHEMON latifolium Brasilianum: caule est aspero, striato, cubitali, quem folia rara, lata complectuntur, quæ circa basin vncias duas lata, quatuor, etiam quinque, longa, sensimque angustiora reddita aspera sunt & per margines leuissimis dentibus exasperata, ex quorum sinu pediculi oblongi prodeunt, florem luteum sustinentes, cuius discum ex pluribus oblongis luteis apicibus, compositum, folia septem latiuscula, in binas vel ternas crenas fissâ cingunt, totusq; flos à quinque folijs viridibus inæqualibus veluti umbone sustentatur. Hæc in ramo exiccato, quem Chrysanthemi Brasiliani nomine, ex horto nobiliss. Contareni habemus, notare

potuimus.



### DE CHAMÆMELO.

#### CAPVT III.

**I.** CHAMÆMELVM leucanthemum Hispanicum magno flore: caules habet cubitales, striatos, in summo brachiatos, quos folia pediculis carentia, satis à se inuicem distita, cingunt, quæ vncialia, angusta, in lacinias tenues, obtusas, sed bifidas, diuisa: florem habet quadruplo vulgari maiorem, disco pallide luteo, quem folia circiter vicena, alta lutea, sinuata ambiunt, cui semina, vt in vulgari succedunt: annuum est & odoratum, à D. Gilkenio, vna cum sequenti & vtriusq; semine, missum.

**II.** CHAMÆMELVM luteum Hispanicum odoratum: hoc caule & folijs cum vulgari leucanthemo conuenit, sed floribus luteis & odoratis, priori quidem minoribus, sed vulgari duplo triploue maioribus, disco luteo, quem folia quatuordecim, luteo colore splendentia, cingunt: in horto meo creuit.

**III.** CHAMÆMELVM leucanthemum incanum Hispanicum minus: plantula est palma minor, radice parua, fibrosa, rufescente, ex qua cauliculus tenuis, vncias quatuor altus, nudus, exurgit, florem vnicum, satis magnum, disco pallide luteo, folijs pluribus albis cincto, sustinens: foliola ad radium parua, incana, tenuissime instar Absynthij Galatici, vel Abrotani, diuisa, quæ insipida & inodora sunt. In regno Granadæ, ad agrorum margines, D. Albinus collegit.

DE



## DE ABROTANO.

## CAPVT. IV.

**A**BROTANVM campestre incanū, Carlinē odore: huic radix est oblonga, fibrosa, rufescens, caulis pedalis, folia, eo modo quo Abrotani maris inferiora, diuisa, incana, & si terantur Carlinæ odore, vt & sapore: in reliquis, cum Abrotano campestri conuenit. In Austria, ad Lintzium urbem circa vias prouenit, vnde D. Burferus misit.

## DE ABSINTHIO.

## CAPVT V.

**I. ABSINTHIVM** ponticum Creticum grati odoris: caule est cubitum superante, rotundo, incano, in ramos plurimos, quincunciales diuiso, folijs tenuibus, multum diuisis, mollibus & incanis: floribus vulgari forma & colore similib. paulo tamen maioribus. Hoc, quemadmodum Honor. Belli ex Creta anno 1596. (addita planta) perscripsit, in Creta frequentissime prouenit, perpetuo viret, odorem gratum spirat, nihilque amarum est, aut si quam secum amaritudinem habet, ea valde obscura est, in viridi enim, nulla percipitur: ab asinis & pecoribus, omnibusque brutis valde expetitur. Vocatur, *πικρά*, & non *αβρίδι*, quemadmodum Anguillarus in Græcia vocari perperam scribit: ego legitimū Ponticum esse iudico: hæcenus Belli. Hac de re dicturi sumus plenius, si Deus volet, in Theatro nostro.

**II. ABSINTHIVM** alpinum incanum: ex radice rufescente, capillacea, cauliculi plures palmares, reclinati, rotundi & albicantes, folijs quam paucissimis vestiti prodeunt: folia, diuisura & colore, Absinthio Pontico tenuifolio incano, similia sunt: ex cauliculorum parte media sursum versus, pedicelli tenuissimi, vnciales, cum subiecto foliolo, tenuissime diuiso, recti, alternatim exurgunt, qui capitulum squamatum, flores pallidos continens, sustinent: quibus semen minutum, nigrum, Tanacetum odore succedit: tota planta odore & sapore est Absinthij, & in Valesianorum alpibus, vt in petris supra Gemme, D. Fleissnerus 1606. & D. Burferus 1614. collegit.

**III. ABSINTHIVM** alpinum candidum humile:

radice est crassiuscula, oblonga, rufescēte, in fibras abeunte, ex qua folia candida, oblongis pediculis donata, tenuissime diuisa, cum cauliculis (aliquando vnico) trium, quatuorve vnciarum longis, rotundis, albo tomento vestitis & ad exortum reclinatis, prodeunt: quorum summo capitula squamata, plura simul, vt in *Stachade* lutea, sed minora, disposita, luteos flores continentia, insident. Tota planta candida est, quatuor vel sex vncias vix superans, & valde amara: ex Gletzerberg, Heluetiorum monte, non longe ab Augusta valle, D. Burferus attulit.

**IV. ABSINTHIVM** alpinum ymbelliferum: hoc non tanquam nouum proponimus, cum à Clusio, Lobelio, Taber. Gerardo & in historia Lugdunen. descriptum & pictum fuerit, sed quia in hac varietatem obseruauimus, & de hoc litere esse scimus, quare de hoc pauca aspergere lubet. Nam Nicol. Clautena Bellunensis Pharmacopæus, Absinthij ymbelliferi historiam (addita figura) & vsum insignem proponens, nouum esse Absinthium, & à se primo in montibus Bellunensibus inuentum, libello Venetijs 1610. cuso asserit: cōtra quem Pompeius Sprechis, Pharmacopæus Venetus, tractatu peculiari, sequente anno Venetijs edito, disputas, nouum non esse, sed à C. Clusio, pridem nomine Absinthij alpini ymbelliferi, propositum fuisse, affirmat. Sane occurrit varietas, sed tantum in magnitudine: nam id quod in monte seruæ Bellunatum, folijs est latioribus & longioribus, quam sint eius quod in Heluetiorum alpibus, & Baldo monte, prouenit: quo adhuc minus est quod in Austria monte *Trattenstein* reperitur: quemadmodum ex horto Patavino habemus, ymbella ex minoribus floribus composita, instar Millefolij vulgaris, floribus, præsertim antequam aperiantur, magis conglomeratis: quare tantum ratione loci differre censemus, & quidem ex plantæ inspectione & examine diligentiore, vt qui in Baldo & Heluetiorum alpibus collegerimus: Belluni natam. Clus. Angelus Busti Medicus Venetus:

Austriacam vero, D. Burferus, transmiserit.



## DE MILLEFOLIO.

## CAPVT VI.

I. **MILLEFOLIUM** maximum umbella alba: caulibus est sesquicubitalibus crassis, rotundis, striatis: folijs circa radicem palmum longis, vncias quatuor latis, tenuissime incis, & velut è multis minutissimis alatis foliolis constantibus, sed minoribus & tenuissime incis, quæ circa caulē sunt, qui in ramos plures brachiantur, quibus singulis umbella, vt in Millefolio vulgari, sed maior, flosculis albis referta, infidet. In horto Patauino creuit.

II. **MILLEFOLIUM** purpureum maius: ex radice crassa satis, caules plures ad cubitum & sesquicubitum excrescunt: folijs vt in vulgatissimo Millefolio dispositis, umbella magna, flores elegantissimos rubri coloris & quinquefolios continens, in quorum medio apices pallide flauescences, qui gratiam addunt, emicant: flores contriti, medica-

tum odorem spirant. Hoc Gōppingæ primum in Pharmacopæi horto legimus, & nunc in horto colimus: quod Clusius nomine Millefolij rubro flore proponere viderunt: an hoc forte Matthiolo Millefolium majus?

III. **MILLEFOLIUM** incanum Creticum, siue Millefolium Dioscoridis: caulibus est lignosis, rotundis, incanis, sesquipalmaribus, folijs Chamacyparissi forma oblongis, denticulatis, incanis, vel vt Dioscorides, auicularum pennas imitantibus, caules in summitate in ramulos abeunt, qui umbellam satis compactam ex floribus ex albo flauescētibz compositam, sustinent. Hoc ex horto magni Ducis Hetruriz, primum à D. Paschali (vt in Phytopinace monuimus) dein ex Creta à D. Honorio Belli accepimus: quod legitimum Dioscoridis Millefolium esse censemus, cuius in Epistola 2. Belli ad Clusium, sub Stratiote Millefolio men-

tio fit, qui in Creta *μαριφυλλο* vocari scribit.

## IV. MILLE-



Millefolium aquaticum pennatum  
spiccatum.

Millefolium aquaticum cornutum.



IV. MILLEFOLIUM aquaticum pennatum spiccatum: ex radicibus fibrosis, tenuibus, rami prodeunt plures, cubitales, caui, striati, in alas brachiati, aquæ innatantes: ex quorum geniculo quolibet, folia terna, vel quaterna quasi stellatim circumiecta, tenuiter incisa, pennam & forma & tenuitate referentia, colore fusco prodeunt: at cauliculi summitates palmares, ex aqua recti attolluntur, spicam purpurascentem, Iunio & Iulio mensibus, sustinentes, quæ in flosculos copiosos, pallide luteos, simul iunctos, Anethi semen forma referentes, expanditur: his succedunt capitula nigra ac prædura, plerumq; quaterna, quina, etiam plura, cauliculi fastigia, quæ super aquam eminent, rotatim ambientia, quibus singulis cauitas exigua, semen continens inest. Hoc in piscinis provenit, primum in fossa arcis Weckenthal in Allatia, obseruauimus: & Tragus, Algæ tertiæ, vel Algæ Ver-

gilij nomine, exprimere voluisse videtur. Huius ut & sequentis descriptionem in Phytopinace, Matthiolo, & Tabernamontano emaculato, vna cum figura exhibuimus.

V. MILLEFOLIUM aquaticum cornutum: hoc prioris modo aquis innatat, caulibus cubitalibus, tenuibus, ramosis, fragilibus, dense geniculatis, quos folia ambiunt tenuia, capillata, quorum inferiora, cornua ceruina æmulantur & exiccata rigescunt: superiora vero, tenuiora, tenuiusq; diuisa sunt: ex ipsis geniculis, pediculi, modo trium, quatuorve unciarum prodeunt, singuli, singulos flores, paruos, albicantes, quadrifolios sustinentes: quibus capitulum paruum Ranunculi forma, ex quinque senisve granulis virentibus compositum, succedit. In riuis circa Hiltelingam, non longe Basilea primum, dein in fossis horti Montembelgardiaci obseruauimus.

K

DE



Consolidaregalis latifolia paruo flore.

Chelidonium maius folijs quernis.

DE CONSOLIDA REGALI.  
CAPVT VII.

**C**ONSOLIDAREGALIS latifolia paruo flore: ex radice fibrosa, oblonga rufescente, caulis cubitalis, rotundus, striatus, leuissima hirsutie albicans, in ramos brachiatus, exurgit: quem folia tripartito primum, dein ad formam foliorum Ranunculi aruenfis echinati, diuisa cingunt, quæ in summo caule pauciora, quædam tripartita, quædam integra: flores sunt subcæreulei, corniculo donati, Consolidaregalis segetum similes, aut minores: quibus siquæ oblongæ, paruæ, semen paruum cõtinentes, succedunt. Hanc Delphinijs Dioscoridis nomine, à D. Ferrando Imperato, Pharmacopæo Neopolitano insigni, accepimus: dein virentem in horto D. Zuingeti p. m. legimus, in Phytopinace descripsimus, in Matthiolo quoq; & Tabernæm. figura sub Consolidaregali peregrina paruo flore, posita, in qua tamen sculptor prima folia omisit.

DE CHELIDONIO.  
CAPVT VIII.

**C**HELIDONIUM maius folijs quernis, flore laciniato hoc à Chelidonio maiore vulgato, folijs & flore tantum differt: folia enim, quercus tenera folia æmulantur, cum argutius incisa sint & teneriora, superne ex virore nigricantia, inferne pallida, leuissime, vt & caulis, hirsuta: flos luteus, communiter quadrifolius, folijs eius per ora dissectis & velut fimbriatis. Ex horto Philippi Stephani Sprengeri pharmacopæi Heidelbergensis, primum habuimus: dein in horto Montembelgardensi, vbi tota æstate floruit, legimus: quod si in parietinis feratur, formam retinet, latiore vero in solo, aliquando degenerat. Huius in Phytopinace meminimus: in Matthiolo & Tabernæm. figura addita, descripsimus: postmodum & Clusius, nomine Chelidomaioris laciniato folio in sua historia, proposuit.

DE



## DE AQVILEGIA.

## CAPVT IX.

I. **AQVILEGIA** montana magno flore: hæc in **A**quilegiæ vulgaris altitudinem excrescit quidem, sed folijs primum differt, cum in lacinias tenuiores, easq; non obtusas, vt in alijs, sed acutas diuidantur, & folia pene subrotunda sint: sic & floribus est cæruleis, vulgari similibus, sed multo maioribus. In monte prope Thermas Fabarias copiose prouenit, vnde D Burserus attulit.

II. **AQVILEGIA** montana paruo flore thalictri folio: ex radice parua, folia thalictri forma, sed exigua, pallide virentia, prodeunt: inter quæ cauliculus tenuis, palmo minor, duobus tribulve foliolis breuibus, oblongis, minime diuisis, exurgit, florem vnicum cæruleum sustinens, forma quidem vulgari similem, sed quintuplo minorem. In Heluetiorum alpijs reperitur: in Moravia, prope urbem Trebis, sub arce Smilo, in pratis vernali tempore copiosissime reperiri, mihi relatum.

III. **AQVILEGIA** hortensis multiplex flore paruo: hæc ab hortensi, quæ multiplici flore est, solo flore differt, qui in hac triplo minor, & colore, qui pullus est, in horto meo prouenit.

## DE NIGELLA.

## CAPVT X.

I. **NIGELLA** latifolia flore maiore simplici cæruleo: ex radice tenui, oblonga, flauescente, caulis cubitalis, rotundus, viridis & læuis, in summo ramosus, exurgit: folijs ad radicem tenuissime lacinatis, in caule vero aliquando in latiores partes, aliquando inferiorum instar tenuissime diuisis: flores autem quam in cæteris ampliores sunt, quinquefolij, folio quolibet vnguem æquante, superne eleganter cærulei, in uersa parte pallidi, venis elatis percurrentibus: floribus succedunt capita pentagona, hexagonave dura, in totidem cornicula in latera reflexa superne diuisa, quæ membranis interne intercurrentibus, semine subnigro, inodoro, plena sunt. Hæc æstiuus mensibus in hortulo nunc ab annis aliquot floret, ex semine deci-



duo, cum annua planta sit, sese propagans: cuius semen, **Nigellæ** Hispanicæ nomine, nullum fuit.

II. **NIGELLA** Cretica: radice est oblongiuscula, tenui, parum fibrosa & flauescente: caule cubito minore, procumbente, striato, viridi, glabro, & paulo supra radicem in alas tenues & teretes brachiato: folia prima per terram sparsa, instar foliorum **Consolidæ** regalis vulgaris in lacinias diuiduntur, quæ vero in caulis summo oblonga, & vt in **Nasturtio**, diuisa, ex viridi nigricant: flos vnica, vnguis magnitudine, quinquefolius, cuiuslibet cauliculo insidet, colore ab initio ex viridi nigricante, mox vero sub cæruleo, mucronibus suam viriditatem reseruantibus forma **Nigellæ** aruensis, qua multo minor est, respondens: in cuius medio stamina plura, viridia, apicibus cæruleis donata: capitula pentagona, hexagonave succedunt, quæ in totidem

K 2

cornicu-



cornicula longa, instar cornuum hirci intorta, finiunt, quæ semen nigricans minutum continent. Huius semen ex Creta primo allatum, & à D. Doldio, cum planta, transmissum, vt in Phytopinace monuimus, & figuram cum descriptione Matthiolo addidimus, at in Tabernæmontano emaculato, figura male sub titulo nigellæ flore pleno posita. Hanc Clusius in post. histor. Melanthium simplici flore Creticum, nominare videtur.

Ab hac diuersa est, quæ in horto nobiliss. Contareni colitur, folijs fœniculi, floribus ex albo flarescentibus, semine nigro, anguloso & acro, quam cum integram non habeamus, plura de ea in præsens non licet.

## DE HIPPOMARATHRO.

## CAPVT XI.

**H**IPPOMARATHRI Cretici nomine, ex horto Clariss. Nicolai Contareni, Senatoris Veneti, habemus ramos cubitales, rotundos, læues, striatos, pallide virentes, in alios brachiatos: folia sunt fœniculi modo, in tenuissima, sed longe breuissima segmenta diuisa: caulium summitatibus umbellæ parvæ insident: gustantibus plantæ sicca folia & caulem, de sapore nihil certe pronunciare li-

cuit: quare vt totam acquiramus plantam, studebimus.

## DE ANETHO.

## CAPVT XII.

**A**NETHVM sylvestre minus: radice est albicante, uncias tres longa, tenui, quemadmodum & caulis, qui pedalis, albus, rotundus: folijs est uncias quatuor longis, tenuissime, vt in vulgari, diuisis: umbella parua, ex festucis octo vel nouem uncialibus composita, flosculis luteis, semine paruo oblongo. In hortulo meo creuit, ex semine à doctiss. Columna, nomine Anethi sylvestris ex Sicilia, misso: quod minus appellare lubuit, cum Cæsalpinus, Anethi sylvestris in Sicilia, quod fatiuius grandius sit, meminere.



DE DAV.



Daucus montanus apij folio minor.

Daucus Alsaticus.



DE DAUO.

## CAPVT XIII.

**I.** DAUCVS montanus apij folio flore luteo: caule est cubitali, anguloso, glabro, in breues alas brachiato: folijs apij forma, sed breuioribus, per ambitum minime serratis, quorum pediculus striatus est: umbellas paruas habet, flores elaphosco similes, luteos. In Callenberg & prope oppidum Baden Austria D. Burserus legit.

Huic similem sed per omnia maiorem, caule crasso canaliculato, ramofo, folijs latioribus, minimeque crenatis, umbellis maioribus ex floribus pallidis, in horto Patauino anno 1578. collegimus, quem Daucum tertium Dioscoridis Guilandinus, at ipsius successor Cortusius, Pseudopyrethrum, nominauit.



**II.** DAUCVS pratensis apij folio: radice est oblonga, pallide rufescente cortice tecta, sapore & odore pastinacæ, siue Dauci officinarum, superne hirsuta & villosa, ex qua alæ prodeunt, folijs pluribus vni costæ inhaerentibus, per ambitum incisus & serratis, forma montani maioris, sed longe minoribus, pallide virentibus: inter quæ caulis pedalis, rarius cubitalis, tenuis, striatus, paucis geniculis distinctus, in ramulos aliquot diuisus, exurgit: ramorum extremis, umbellæ candidæ, flosculorum exiguum insident, quibus semen oblongiusculum, nigricans, aromaticum succedit. Hic in pratis humidis Michelsfeldæ prouenit.

**III.** DAUCVS Alsaticus: radice crassa, oblonga, in fibras crassiores diuisa, nititur, cuius summo, multa villosa capita, vt in plerisque ferulaceis adposita: vnde magnæ foliorum alæ exeunt, folijs multis in plures partes dissectis, vni costæ inhaerentibus.

K 3. renti-



rentibus, ex aduerso nascentibus, constantes: inter  
quæ caulis (modo vnus, modo plures) ad viri alti-  
tudinem exurgens, subruher, striatus, geniculis a-  
liquot articulatus, in ramos plures, hique in alios  
diuisus, ad quorum genicula minores foliorum a-  
læ: extremos ramulos umbellæ satis magnæ, floscu-  
lorum flauescientium, exornant: quibus semina  
plana succedunt. Iunio & Iulio floret in dumetis  
Alsatia superioris: eundem copiosissime in Alsatia  
inferioris pratis humidioribus, vt inter Sclesta-

dium & Argentinam frequenter obseruauimus.  
Multum similitudinis habet cum Thysselino Pli-  
nij Lobelij siue Apio palustri Dodonæi: verum  
Thysselinum, non ita alte exurgit, & tota stirps la-  
tæo succo abundat. Hic Daucus, sapore est &  
odore pastinacæ.



Scandix Cretica maior.



Scandix semine rostrato Italica.



DE SCAN-



## DE SCANDICE.

## CAPVT XIV.

**I.** SCANDIX Cretica maior: ex radice oblongiuscula, nonnihil fibrosa, caulis cubitalis, striatus, in plures ramos diuisus, & potissimum ad alarum exortum, leuissime pilosus, exurgit: folijs ad radicem, pediculis oblongis, Pimpinellæ laxifragiæ minoris æmulis, latiusculis, subrotundis, ex opposito correspondentibus, per ora oblique dissectis, pallide virentibus, vna cum pediculis leuiter pilosis: at caulem ambientibus & superioribus, instar foliorum Scandicis vulgaris, tenuissime diuisis: umbellæ paruæ sunt, sparsæ, flores albos, & quam in vulgari maiores, sustinentes: quibus succedit semen rostratum, decem, duodecim & pluribus rostris, s. basperis, simul iunctis, quorum cuilibet apices duo quasi aculei rigidi, præfiguntur. Hæc Patavio primum Scandicis Creticæ nomine missa, dein ex semine in horto nata, cuius descriptionem in Phytopinace sub 4. dein & Matthiolo addita figura, exhibuimus.

**II.** SCANDIX Cretica minor: ex radice gracili, oblonga, recurua, alba, cauliculi perbreues, aliquando palmares, tenues, tenui lanugine pubes-

centes, in ramulos, paucos breues & graciles diuisi prodeunt: quibus umbellæ exiguæ, floribus albis, pusillis, paucis, quinquefolijs (licet aliquando flores corymborum modo densi conspiciantur) veluti stylorum cacuminibus insident: his succedunt rostra vt in priori, sed breuiora & pauciora (communiter quaterna, quinave in horto obseruauimus) in apice similiter bipartita, quæ semina sunt. Folia si terantur, non iniucundi odoris sunt & saporis aliquo modo Chærefolij vulgaris. Hanc primum ex horto magni Ducis Hetruriæ à Casabona, Anthrisci Plinij nomine, dein ex Creta ab Honorio Belli, accepimus: quam etiamnum in horto colimus, Maior florentem, & Iulio semine prægnantem. Huius in Phytopinace meminimus, & Matthiolo (vbi icon crassior est) addita figura, sub scandice Italica descripsimus, & postmodum Clusius in sua historia, Anthrisci Plinij, & doctiss. Columna, Aniso Marathri Apuli (à suauis odore & sapore, medio inter Anisum & Fœniculum) nomine proposuere.

Huius varietas à me obseruata apud Monspelienfes: nam quæ in saxosis prouenit, odore est fœniculi: altera vero, quæ in agris, inodora est.



DE CAP.



Caucalis semine aspero flosculis sub-  
rubentibus.



DE CAUCALIDE.

CAPVT XV.

I. CAUCALIS nodosa echinato semine, radix  
oblonga, tenuis, alba, caules emittit binos

ternosve rotundos, striatos, asperos; q̄ in alios bra-  
chiatur: quorū alij semipalmares, incurui, alij bipal-  
mares erecti prodeunt, quos folia pastinacæ sylue-  
stris æmula, at breuiora & pauciora, multoque te-  
nuius diuisa, aspera, ex virore nigricantia, ad sin-  
gula penē internodia, oblongis pediculis donata,  
cingunt: flosculi exigui, ex quinq; foliolis compo-  
siti, subrubentes, vel pallidi, aliquando albi, bre-  
uissimis pediculis insident: his capitula parua echi-  
nata & conglobata succedunt, in horum qualibet  
semen vnicum continetur. Hanc Iunio mense an-  
no 1578, in horto Patauino collegimus, & in Phy-  
topinacæ, Caucalidē semine ad caulium nodos e-  
chinato, nominauimus, verum & nomine Lappu-  
læ caninæ Cortusi (Lutetia quoque & ex Anglia)  
missa fuit: cuius figuram Matthiolo adposuimus.  
De qua doctiss. Fabius Columna, Scandici nulla  
melius nostro iudicio quadrare videtur, ex nobis  
obseruatis hucusq; plantis, nisi illa quam doctiss.  
Caspar. Bauhinus, pro Caucalide altera nodoso e-  
chinato semine addidit, suo Synonymijs ornato  
Matthiolo, &c.

Caucalidis semine aspero flosculis subrubenti-  
bus figuram addere visum fuit, cum à Cordo qui-  
dem & Thaliō, sub Daucidide minore describa-  
tur, sed huius icon à nemine proponatur.

II. CAUCALIS tenuifolia montana: radice est  
crassa, ex qua caulis exurgit pedalis, qui statim ad  
radicem, in cauliculos palmares, rotundos, leues,  
diuiditur, hiq; in minores subdiuiduntur, quorum  
etiam minutissimis alis ad radicem, exiguae umbel-  
læ, flosculorum alborum minutissimorum, insi-  
dent: folia ad radicem in tenuissima segmenta, &  
quæ in caule, in capillacea, diuiduntur. Semen par-  
uum est, oblongum, striatum: Iulio Mense flo-  
rens, in Sabaudia inter Tarentesiam &  
Monasterium collecta.



Apium hortense maximum.

Apium peregrinum folijs subrotundis.



DE APIO.

## CAPVT XVI.

**A**PIVM hortense maximum: ex radice oblonga albida, & pro plantæ magnitudine tenui, folia prodeunt, pediculis palmaribus, & sesquipalmari- bus, striatis, pallide virentibus, tripartito primum diuisa, quorum quodlibet rursus tripartitur, ipseque particule triplo quaduplove, quam in Petroselino vulgo dicto maiores, per ambitum incisa, pallide virentes: inter hæc caulis cubitalis & sesquicubitalis, tenuis, striatus exurgit, in cuius summitate folia oblonga, angusta, minime incisa, à pictore prætermissa. Umbellam habet paruam, albam, exiguis flosculis refertam, quibus semina Petroselini forma, sed duplo triplove maiora, gustu non nihil aromatico donata, succedunt. Nomine Apij Angli-

cani, primum apud nos satum. An forte de hoc Selino Anguillara opinione 7. intelligendus, quod in vniuersa Græcia, potissimum in Chio & Creta pro Selino habetur. Hoc in Phytopinace descripsimus & in Matthiolo figuram exhibemus.

APIVM peregrinum folijs subrotundis, Clusius sub Selino peregrino primo descripsit: at quia figuram non adposuit, eam hic proponimus.



L

DE



# THEATRI BOTANICI

## DE SMYRNIO.

### CAPVT XVI.

**S**MYRNIVM peregrinum folio oblongo: huius inferiora folia ex radice prodeuntia, Apij folijs similia sunt, in complures particulas oblongas diuisa, oblongis pediculis donata, per ambitum profundius laciniata, pallide virentia: quæ vero in caule sunt cubitali, striato, non subrotunda, nec duplicia, vt in communi Smyrnio peregrino, sed eorum primum quidem, vncias sex longum, tres latum, per ambitum profundius incisum: superiora vero per quæ caulis ad exortum transit, & simplicia sunt, vncias tres longa, duas circiter lata, & superna quæ leuiter crenata sunt, sensim minora fiunt: caulis in summo brachiatus, & cuilibet alæ, ramuli quaterni, rarius quini, biunciales insident, festucis aliquot, vmbellam exiguum flosculorum luteolorum sustinentes: quibus semen nigrum, subrotundum, succedit: radicem non vidimus. Hoc in horto D. Camerarij creuit, & D. Doldius transmisit.

## DE ANGELICA.

### CAPVT XVIII.

**A**NGELICA syluestris hirsuta inodora: radicem habet crassam & fibrosam, foris pullo cortice tectam, intus albam, rediuuiam & odore medicato: caulem cubitalem, in breues alas brachiatum, parte inferna, paucissimis pilis cinctum, nigrum: folia Angelicæ syluest. siue Podagrariæ æmula, in alas, modo binas, modo ternas, easque aliquando vncias quatuor longas, tres latas, aliquando vix vnciales, diuisa, in ambitu profunde incisa attrouirentia, hirsuta, quarum pediculi hirsutie asperisunt: vmbellam habet paruis floribus albis referatam, quibus semen oblongum nigricans succedit.

Hanc ex Lusatia, nomine herbæ Podagrariæ cognatæ, D. Francus misit, cuius in horto Lusatiæ meminit.

## DE SPHON.

IS  
vul  
tibu  
bet  
habe  
mar  
obf  
mus  
I  
caul  
mul  
gun



Sphondylium alpinum glabrum.



DE SPHONDYLIO.

## CAPVT XIX.

**I.** SPONDYLIVM hirsutum folijs angustioribus: Hoc à vulgari folijs solum differt: nam cum vulgare folijs sit amplius, plerumque ex quinque partibus latis subrotundis compositis: hoc folium habet, in lacinias oblongas, angustas, acuminatas, hasque in alias, inordinate tamen diuisas, & per marginem crenatas. Hoc in pratis alpinis Rheticis obseruauimus: dein ex Lusania à D. Franco accepimus.

**II.** SPONDYLIVM alpinum paruum: ex radice caulis exurgit pedalis, qui in summo in alterum ramulum triunciale, diuiditur: quem folia cingunt pallide virentia, longis pediculis donata, que

in partes tres, vel etiam quinque alias subrotundas, alias acutas, per marginem crenatas & hirsutas, diuiduntur umbella flosculis candidis, latis tamen, summo cauli insidet, quibus semen plenum, latum ac tenue, succedit. Tota planta leuissimis pilis pubescit. Ex Austria alpibus, D. Burserus misit.

**III.** SPONDYLIVM alpinum glabrum: radice est crassa, eaque alba, caule bieubitali, geniculato: folijs ficulneis, glabris, quæ absque pediculo, palmum longa, duas lata sunt, communiter tripartitis, sed non vsque ad pediculum diuisis, per marginem crenatis: quorum inferiora pediculis palmariibus, hispidis & subasperis donantur: caulis summo, umbella flosculorum candidorum, sed quam in reliquis speciebus minorum, insidet: semen succedit subrotundum, planum, cuius summitati apex infigitur. Hoc solum in monte Waffersfall & quidem ab anno 1595. vsque ad præsentem annum 1618. Iulio mense & florentem & femine prægnantem, obseruauimus.

## DE LIBANOTIDE.

## CAPVT XX.

**I.** LIBANOTIS latifolia, aquilegiæ folio: radice est crassa, fibrosa, cortice inæquali, quasi rugis transversis asperata, fusci que coloris, tecta, medulla candida, amara, modicum quid Aroma & Aristolochiam sapore redolens: ad cuius caput, pilæ tanquam veterum foliorum defluxorum fibræ solidiores & nigrae: etenim folia, quæ numerosa ex radice capite longis pediculis emergunt, vna parte quasi vaginato exortu (nimirum ea quæ crassiora & latiora sunt, vt & ea, quæ ex caule prodeunt) eundem, tanquam membranacea siliqua circumdant, articulo crassiore, lineæque transversa: quæ crassa sunt, rigida, glabra, viridia & splendentia, subtus candicantia, fibris maioribus subpurpureis transcurrentibus, quæ licet instar foliorum Aquilegiæ diuidantur, non tamen omnia in pares lacinias (Aquilegiæ lacinijs latiores) fissa sunt: inferiora namque in vegetiore planta, plerumque quinque folia habent, ex triplici rami diuisura, alias tria, tribus pediculis insidentia. Caulis vnus est, cubitos tres quatuorve superans, rotundus, striatus, nodis distinctus, subalbicans, puniceo colore aliquando admixto, in tria, quatuor, vel quinque

L 2 brachia



brachia distributus, quæ umbellam magnam, ex longissimis festucis & floribus albis paruis compositam, sustinent: semen succedit longum, latum, striatum, geminum, puniceum, gustu subamarum, Cumini saporem imitans, aromaticum, modice exalefaciens, & saluam ciens. Hoc D. Doldius Norinberga ex D. Camerarij horto, nomine Sefeli Æthiopici folio Aquilegiæ misit, cuius Camerarius, (sed sine descriptione) in sui horti Catalogo, sub Sefeli Æthiopico altero meminit, & semen odore & sapore aliquantulum Cinamomum representare scribit.

II. LIBANOTIS latifolia minor semine crispo: hæc à vulgata potissimum foliorum magnitudine & numero, seminisq; forma differt: cum in vulgata singulæ foliorum alæ, magna ex parte quina folia habeant, vno extremam alam occupante: at hæc in primis duabus alis, tria tantum, & in media ala, quinque obtinent, per ambitum communiter serrata, quædam tamen vnam alteramve profundam incisuram obtinent: superne atroviuentia, inferne vero subcinericei quodammodo coloris, magnitudine vnciam, vel sesquiunciam vix excedentia. Caule cubitali, glabro umbella parua flosculorum alborum insidet, quibus succedit semen breue, subrotundum, eleganter crispatum. Hanc ex Italia D. Neudorfferus, nomine Costi amari semine crispo, attulit.

## DE CARVI.

## CAPVT XXI.

CARVI alpinum: planta palmaris est & glabra. Cæx radice oblongiuscula nigricante, aromati-

ca, folia emittens oblongis pediculis donata, foliorum Carui modo, in paulo tamen maiora segmenta, diuisa, pallide viuentia: caulis modo vnus, modo duo, tenuis, ad vncias sex exurgens, supra medium nudus, in quinas senasve festucas instar umbellæ abiens, quarum singulæ flosculos aliquot, quasi in capitulum iunctos, ex flauo rubescentes, sustinent. In Pyreneis montibus D. Burferus legit.

## DE PIMPINELLA.

## CAPVT XXII.

I. PIMPINELLA saxifragia tenuifolia: ex radice oblonga, caulis pedalis viridis, læuis, striatus, geniculatus, statim ad radicem in ramos, & hi in tenues alas diuisus, exurgit: folia habet in tenues primum, dein pene capillaceas partes diuisa: flosculi exigui, pauci, albicantes, in parua umbella; semen non vidimus: copiose ad lacum Geneuensem prouenit.

II. PIMPINELLA sanguisorba inodora: hæc à sanguisorba minore vulgata, differt folijs & odore: nam in hac folia longiora sunt, quæ in illa magis rotunda, sunt in hac inodora, in illa odora.

Hanc Pimpinellæ minoris Hispanicæ nomine, D. Gillenius misit.

DE SE-



Seseli palustre lactescens.



DE SESELI.

CAPVT XXIII.

**I.** SESELI montanum Cicutæ folio subhirsutum: sex radice crassa, folia lata, Cicutariæ, vel Myrrhidis Fuchsiæ instar, in multas alas diuisa, nigricantia, leuissimis pilis, præsertim ipsis pediculis aspersis, subaspera: caule sesquicubitali & altiore; crasso, striato, cauo, nodoso, pilis paucissimis donato, in alas brachiato, folijs paucis, prioribus similibus, sed minoribus cincto: in summitate, umbella magna alba: floribus succedunt semina oblonga, gemella, tenuissimo apice donata, Carui sapore. Hoc in altissimo monte Wasserfall, æstate florens, inter saxa reperimus.

**II.** SESELI pratense tenuifolium, siue Dau-

eus pratensis tenuifolius: caule est cubitos duos superante, rotundo, striato, nodoso, superne in ramos brachiato: folijs instar Pastinacæ tenuifoliæ syluest. diuisis: umbellam habet ex paruis albis floribus compositam, quibus succedit semen paruum aromaticum, & tota planta pastinacæ odorem refert: in pratis vdis Michelsfeldæ prouenit.

SESELI palustre lactescens, cum Camerarius in suo horto sub Seseli palustri descripserit, eius figuram prætermittam, addere placuit.

## DE LIGVSTICO.

## CAPVT XXIV.

**L**IGVSTICVM siue Siler montanum angustifolium: caule est tenui, cubitali, in alas brachiato, quæ umbellam albam paruam sustinent, folijs paucis, in segmenta angusta, oblonga, peucedani instar (sed longe breuiora) diuisis, quæ in alis, fere capillacea: prope oppidum Stain Austriae, D. Burterus legit.

## DE FILIPENDVLA.

## CAPVT XXV.

**F**ILIPENDVLA minor: radicem habet rufescentem, in filamenta extenuatam, sed per extrema glandulosam: folia duas tresve uncias longa, semunciam lata, ex segmentis pluribus, tenuissime diuisis ambitu serratis composita, veluti Potentillæ, duriora tamen & saturatius virentia, inter quæ cauliculus palmo minor in medio foliolo cinctus, exurgit; aliquando simplex, aliquando in summo bifidus, oui coma flosculorum albidorum, staminulis præditorum, aliquando quasi in capitulum compactorum, insidet: succedit semen, instar racemi parui coactum. In asperis circa Montpelium legimus.

## DE CRISTA GALLI.

## CAPVT XXVI.

**I.** CRISTA Galli umbellata: radice est tenui, parua, caule palmo parum altiore, tenui & erecto: folijs paucis, unciam longis, angustis, per ambitum crenatis: caulis summo flores plures, lutei;

L 3 tri;



teſi, quaſi in umbella diſpoſiti, triplo maiores & latiores, quam in vulgari, quibus valvula late membranacea, ſemen continentes, ſuccedunt. In Caſtiliæ agris, D. Albinus legit.

II. CRISTA galti anguſtifolia montana: hæc caule eſt cubitali, anguloſo, folijs oblongis, anguſtis, acuminatis, margine crenatis, binis ſibi ex oppoſito correſpondentibus, ex quorum aliſ foliola minora prodeunt, & plerumque cauliculus, vnam alteramve vnciam longus, minutiffimis foliolis cinctus: ipſe vero caulis, in ramos ſemipalmæres, etiam longiores, diuiditur: quibus flores pallidi, eo, quo in vulgari, ordine, ſed longe minores inſident, quibus valvula, ſemen latiuſculum includentes, ſuccedunt. Hæc in montibus vrbi vicinis prouenit.

Valeriana alpina prima.



DE VALERIANA.

CAPIT. XXVII.

I. VALERIANA paluſtris maior profunde lacinata: hæc è radicibus albis, oblongis, villoſis, intricatis & odoratis, plures quam quinquaginta emiſit caules, latos, folijs Valerianæ ex vno latere caulis dependentibus. ſed multo maioribus, & incifuris profundioribus in aliquibus duplici ſerie luxuriantibus & propendentibus, veſtitos; quæ, vt & radices, odorem Valerianæ vulgaris habent: flores non vidimus. Hæc prope urbem Budiffinam in loco paluſtri, à D. Franco ſeniore inuenta & eruta.

II. VALERIANA paluſtris inodora parum lacinata: ex radice fibroſa, leuiter Valerianam redolente, folia ſubrotunda, minime lacinata, pallide virentia, longis pediculis donata, prodeunt: inter quæ caulis cubitum ſuperans, exurgit: quem rara folia, primis, forma & longis pediculis ſimilia, bina ex aduerſo reſpondentia, cingunt, quæ aliquando ad modum Valerianæ hortenſis, ad exortum in lacinias diuiſa, inodora ſunt: caulis ſummo, flores quaſi in umbella ſparſa, pallide rubentes, inſident. In paluſtribus noſtris Michelfeldenſibus frequens licet raro cum flore reperiatur, cum in ſœniſecio abſcindi conſueuerit.

III. VALERIANA alpina prima: ex radice oblonga, odorata, caulis vnus (rarius plures) cubitalis, ſtriatus, prodiſt: folia ad radicem plura, longis pediculis donata, ex rotunditate acuminata, ſinuata, aliquando lacinata & in crenas profundiores diuiſa, pallide virentia: quæ vero caulem ambiunt, pauca ſunt, bina ternæ iuncta, oblonga, incifa, binis aliſ pleraque donata: flores in ſummo caule pallide purpureſcentes, veluti umbellæ inſident, quibus ſemen exiguum ſuccedit. Iulio menſe florentem in monte Waſſerfall collegimus, vti in

Phytopinace monuimus, quam etiam ex montibus Geneuenſibus cepimus.



IV. VALE-



Valeriana alpina scrophulariæ folio.



Valeriana peregrina purpurea.



IV. VALERIANA alpina scrophulariæ folio: radice est nigricante, aliquantum torosa nodosa: ve: caule cubitali & sesquicubitali, cauo, striato, viridi (aliquando pluribus) folijs senis, septenis, longis pediculis donatis insident, quorum quædam subrotunda, quædam oblonga, quædam leuiter sinuata: at quæ caulem cingunt, pauca sunt, scrophulariæ folijs emula, vncias tres longa, sesquiunciam, vel vnciam lata, acuminata, leuiter crenata, bina semper iuncta: caulis, in summo, in longas tenues alas brachiat, quibus flores pallide rubentes, Valerianæ sylvestris similes insident: eodem loco vbi & prior prouenit: vtraque sub Valeriana montana prima & altera in Phytopinace proposita fuit. Videtur Clusius vtramque vna descriptione & figura expressisse, Valerianæ sylvest. alpinæ primæ latifoliæ nomine.

V. VALERIANA alpina minor planta palmarum minor, folijs ad radicem, primis quidem parvis, subrotundis, subsequenter sesquiuncialibus, scabiosæ parvæ instar in laciniis acutis diuisis: inter quæ cauliculus vnciarum sex exurgit, binis ternisve folijs, in ternas, vel quaternas laciniis angustas diuisis, cinctus: in summo, umbella, flosculos purpurascens sustinens: ex montibus Pyrenæis, D. Burserus attulit.

VI. VALERIANA peregrina purpurea alba: ex radice parua, fibrosa, albicante, caulis exurgit pedalis, rarius cubitalis, tenellus (vt sæpe in terram reclinet) viridis, cauus, striatus, nodosus, & vt plurimum ad singulos nodos in binos ramos diuisus, horumque aliqui, in alios breues ramulos sub di-



subdiuiduntur. Folia habet pallide uirentia, pauca, duastrefve vncias longa, vnam, rarius duas, lata, Nardi montanæ similia, ex aduerso bina sita, mollia, crassiuscula, quorum superiora interdum sinuosa, & ad exortum in crenas diuisa, & fere insipida: ramulorum summis flores inodori, elegantissime purpurei, vel albi, plures in caput congesti, longiusculi, extrema parte aperti, & in quinque lacinias diuisi, quorum duæ superiores breuiores & latiores, inferiores tanquam labra pendulæ, & media reliquis longior, quibus succedunt vascula oblonga, latiuscula, calices referentia incurua & fibrosa, in quibus semen, altero tñ vasculo inclusum, quod crassiusculum, fungosum, nigricans. Annua est planta, singulis annis ferenda, quæ pro tempore satioris, citius tardiusve in hyemem vsq; floret. Sponte quidem in Latio prouenire audio, in loco quodam Siculo dicto (vnde Valeriana Sicula) & in Sabinis ubi flore albo D. Vorstius obseruauit: vtrâq; & purpureo & albo flore in horto meo habui. Hæc ante annos viginti tres D. Paschalis Gallus, Valerianæ Indicæ Imperati nomine, Patavio misit: dein Nardi Creticæ nomine, semine à Casabona misso, in horto Montembelgardiano creuit. Verum nobiliss. Cortusius, Tripolium esse voluit, cuius opinioni fauet icon Tripolij in manuscripto Codice Dioscoridæo, quem Illust. Pinellus Patavius in sua

Bibliotheca habebat. In Phytopinace & Matthiolo descripsimus & vtrobiq; figuram adposuimus: nunc à Clusio Valerianæ Indicæ appellatione proponitur.

VII. VALERIANA rubra angustifolia: hæc à Valeriana rubra dicta, potissimum foliorum angustia differt, quæ linifolijs angustiora, breuiora, in acumen desinentia, rigidiuscula & pallida, caulem rotundum, nodosum inordinate cingit: verum tota planta, altera minor est, & in monte Baldo collecta.

NARDO CELTICÆ SIMILIS INODORA.

CAPVT XXVIII.


NARDO celticæ similis inodora: radícula est oblonga, rufescente, capillata, ex qua folia aliquot oblonga, in latitudinem paulatim sese laxantia, longis pedicellis donata, viridia primum, dein flauescencia exurgunt, inter quæ cauliculus tenuissimus, palmaris, rarius altior, effertur, circa cuius medium foliola duo oblonga, angustissima: cauliculus in pedicellos abit, qui flosculos oblongos, pallidos, vt in Celtica sustinent, qui in semina exigua abeunt. Inodora est: hanc in Baldo & Alpibus Sumano conterminis, legimus, & in monte Drauwenstein Austria D. Burserus collegit, & Valerianæ alpinæ parua latifolia nomine, misit.

LIBER.



LIBER QVINTVS.  
DE SOLANO.

## CAPVT I.

*Solanum tuberosum esculentum.*

**I.** SOLANVM tuberosum esculentum: caulem habet ad duorum triumve cubitorum, rarius in viri altitudinem exurgentem, crassum, angulosum, striatum, leuiter hirsutum, in multos ramos infirmos, in terram, nisi ad miniculo sustententur, procumbentes, brachiatum, ex quorum alis pediculi crassi, angulosi, flores sustinentes, prodeunt. Folia quæ primo nascuntur, Barbareæ similia sunt (quæ-

admodum figura nostra & Matthiolo & huic libro addita eleganter, cum omnibus plantæ partibus, exprimit) ex atro purpurascentia, subhirsuta, cæteris pallide virentibus, absque pediculo, palmum longis, in sex, octo, plures & pauciores partes, ex vna costa dependentes, diuisis, ex rotunditate oblongis, integris, quibus singulis, duo sextuplo minora interijciuntur, & semper pars vna, quæ septima

M

ptima



prima vel nona, cæteris maior, alæ summo additur. Flores elegantes, exterius ex purpura candicantes, interius purpurascences, vel ex cæruleo purpurascences (flore pleno in Austria haberi aiunt) deni, duodeni aut plures, alij clausi, pauciores aperti, q magni malorum insanorum forma, singulari folio constantes, quinquanguli, lineis vel radijs quinque subflauis, vel herbaceis per longum discurrentib<sup>9</sup>, ex quorum medio staminula rufescentia, vel etiam flaua communiter quinque, stylo subuiri di prominente, prodeunt: & flores, odorem Tilie florum quodammodo referunt. Hos fructus rotundi excipiunt, plures simul quasi ex racemo dependentes, longis pediculis, vt in Solano vulgari, donatis, quorum aliqui paruè nuncis alij auellanæ magnitudine, alij minores immaturi atrouientes: maturi atrorubentes, rarius albi & striati, humida & albicante pulpa pleni, quæ seminibus multis, paruis, planis, subrotundis, Solani somnifici secundi forma, fuscis, conferta est. Radix uberosa est, aliquando pugni magnitudine, aliquando oblonga, aliquando minima, rarius singularis membri virilis forma, inæqualis, quibusdā vestigijs donata, vnde germina anno sequenti emerfura sunt, cute fusca aut atrorubente recta, medulla siue carne firma & alba: & quandoq; tuber ex quo planta nascitur, eū eruitur, inane & flaccidum reperitur. Ad caulis exortum radices plures, fibrosæ, oblongæ, albicantes per terram sparsæ, quandoq; in profundum descendentes, cui aliaë tuberosæ radices adnascuntur, ita vt plantam hyemem versus erutam, vltra quadraginta (alij quinquaginta notant) tubera diuersæ magnitudinis notauerimus, quas pleriq; erunt, ne per hyemem putrescant, & sicco loco, calidior tamen, alij in vase terra sicca pleno, reponunt, vernatiq; tempore terræ rursus committunt: ex ramis etiam reclinatis, terraq; tectis, Burgundi propagare solent, quo plura tubera acquirant. Florent apud nos in Iunio, & sæpe ad Autumnum vsq;, & à primis pruinis offenditur. Hæc ex Insula Virginea primum in Angliam, inde in Galliam, aliasq; regiones delata est.

Huius radices in Virginea Openanck dici, eius historię autor monet. Petrus Cieca in sua Chronica (& Gomara in sua Indiarum historia generali) Papas locis Quiro vicinis vocari scribit: Benzoni, Pape, & Iosepho Acosta in hist. Indiæ, Papas: hinc Papas Ind pū vel Hispanorū dicitur, Italis Tartufoli, quo nomine & tubera nominare solent, Ger-

manis Grublingbaum / id est, tuberum arbor dicitur. ¶ Plantæ huius cum anno 1590. iconem suis coloribus delineatam, à D. Scholtzio, Papas Hispanorum nomine accepissēm, & à nemine descriptam inuenirem, in Phytopinace sub Solano tuberoso, & in Matthiolo, sub Solano tuberoso esculento, figura addita, descripsimus, eiusque iconem D. Clusio transmisimus. Solanum appellauimus, propter formam aliquam foliorum cum malis aureis: florum, cum malis insanis: fructuum, cū baccis Solani vulgaris: seminum, cum Solanis pene omnibus: denique, propter totius plantæ odorem, quem cum Solanis communem habet.

An veteribus cognita: Pycnocomon Dioscoridis, nobiliss. Cortusius censuit. motus exemplari Dioscoridis manuscripto, cui similis figura adpieta. Et sane notæ florum ac radicem Pycnocomi Dioscoridis, huic Solano conueniunt: floris & seminis non item: Clusius deniq; in sua historia, Arachidnam Theoph. suspicatur, & Papas Peruuianorum vocat.

Indi radicibus panis loco vtuntur: quem Chunno vocat: radicem euulsam, foliq; expositam siccant, siccata in partes diffingunt, ex quibus edulium Chunno nuncupatam, admodum diu durans conficiunt. Papas adhuc vero viridis, inter dum quoq; vel cocta, vel assata manducatur: hæc Acosta: qui addit, & aliud Papas genus in calidioribus fundis plantari, ex quo ferula, Locro appellata, parant. Sic in Insula Virginea, apud quos in humidis & paludosis locis nascitur, radicibus in aqua, aut aliter coctis, vtuntur. Sic nostrates, aliquando Tuberum modo sub cineribus assant, & cuticula ablata, cum pipere comedunt: alij assatas, & mundatas, in taleolās dissecant, & ius pingue cum pipere affundunt & comedunt, ad Venerem excitandam, semen augendum: alij & tabidis viles volunt, cum bonum alimentum præbeant: non minus quam castanæ & pastinacæ alunt, & flatulenæ sunt. Relatum mihi, nunc apud Burgundos harum radicum vsum interdictum, persuasi earum esum Leporam causare, & Artiscokos Indicos vocari.

II. SOLANVM racemosum cerasorum forma: vel Cerasa amoris racemosa rubra: ex radice fibrosâ, caules exurgunt bicubitales, angulosi, aliquantulum hirsuti, in multos ramos late se spargentes diuisi, qui infirmi sunt, & nisi radica sustineantur, in terram procumbunt, succi pleni: ex caulibus latere, pedi-



pediculi tres, quatuorve vncias longi, hispidi, flores sustinentes, prodeunt. Folia habet, in multas lacinias acutas, impari semper numero, Agrimonie foliorum instar diuisa & per marginem incisa, alijs folijs minoribus interiectis, pallide virentia, aspera & grauem odorem spirantia. Flores plures, quorum singuli singulis pedicellis insident, luteoli, ex quinque folijs acutis compositi, à calice viridi quinquefolio sustentati, in quorum medio capitulum paruum rufescens, apicibus donatum: quibus fructus succedunt, quasi in racemo dispositi, Ceraforum forma & magnitudine, virides primū, dein per maturitatem rubentes, in quibus, non secus quam in Pomo Amoris, copiosa humida medulla, & semen minutum albicans & planum, continetur. Planta annua est, & singulis annis ferenda, quamuis in horto meo ex deciduo semine renata sit.

III. SOLANVM tryphyllon Brasilianū: ex radice tenui, oblonga, oblique serpente, cauliculus exurgit singularis, glaber, palmum superas, circa quem folia terna, ex vno centro prodeuntia, & in latus sparsa, Solano tetraphyllo similia, latiora tamen, vncias quatuor lata, quinque longa, ex rotunditate acuminata, tenuia, læuia, venosa: supra quæ cauliculus vnciarum quatuor assurgit, cui tria alia fo-

lia, vncias tres longa, longeque angustiora insident, calicis instar sustinentia florem magnum, album, venosum, ex tribus folijs, vncias duas longis, & ferre vnciam latis, compositam. Hoc in syluosis Brasiliæ apud Tououpinambaultios copiose reperitur, referente Pharmacopæo Gallo, qui vna cum alijs D. Bursero communicauit. Ignorans quid esset, formamque considerans, Solani nomen, propter formam quam cum Solano tetraphyllo habet, imposuimus.

IV. SOLANVM Mexiocanum, Iasminum Indicū dictū flore minore. Hoc à Iasmino rubro, vel Mexiocano maiore, quod communiter in hortis colitur, potissimum magnitudine differt, omnibus plantæ partibus minoribus & folijs rotundioribus, existētibz nam licet maioris flores, ex vno folio, conuoluuli florum instar, componantur, attamen radijs discurrētibz, quasi in partes quinque diuiduntur: minoris flores, similiter quidem formati sunt, sed totus flos vnā partem maioris non adæquat: ita vt huius quini flores, maioris vnum in circumferentia non æquent: præterea staminula quaternā minutissimis apicibus donata, cum stylo paulo longiore, è medio flore emergunt, quæ longius quam in maiore, extra florem producuntur: semen similiter quadruplo minus est.



Hyoscyamus Creticus luteus maior..

Papauer spinosum.



DE HYOSCYAMO.

## CAPVT. II.

**H**YOSCYAMVS Creticus luteus maior: cauli-  
bus est cubitalibus, robustis, ramosis, rotun-  
dis, molli lanugine obsitis: folijs latis, subrotundis,  
sinuatis, & circumfosis, hirsutis, longiore pedicu-  
lo donatis: ex quorum alis pediculi lanuginosi ex-  
urgunt flores sustinentes, ex calice hirsuto in quin-  
que apices secto; prodeuntes, oblongos. Lamij meli-  
sophylli forma, quinquefariam diuisos, quorū tria  
folia superiora maiora & flaua, inferiora duo pal-  
lidiora, ex quorum medio, stamina quina, purpu-  
rascentia, apicibus flauescens, vna cum stylo  
oblongo eiusdem coloris, efferuntur: floribus de-  
lapsis, calices induratur, qui semen minutum sub-



rum continent. Ex horto Montembelgardiaco,  
à fratre Ioh. Bauhino primum accepimus, semine à  
Casabona misso, quemadmodum in Phytopinace  
monuimus, & in Matthiolo figura addita, descri-  
psimus: hanc postmodum Clusius, Hyoscyami  
Cretici alterius nomine, absq; figura proposuisse  
videtur.

## DE PAPAVERE.

## CAPVT. III.

**P**APAVER erraticum Pyrenaicum luteo flore:  
caule est tenui, pilis exiguis, hinc inde asper-  
sis: folijs tenerimis, glabris, pallide virentibus in-  
star Caulicidis, vel Apij filiorum in lacinias diuisis  
per marginem incis & serratis, quorum costæ me-  
diae



diapili paucissimi adpositi: ex folij ala, pediculus nudus, sex, etiam octo vnciarum longus, prodit, florem simplicem, magnum, quadrifolium, & colore luteum, sustinens: plura non licet, cum hoc siccum, in Pyrenæis, locis tamen vdis, natum, D. Burserus attulerit.

II. PAPAVER spinosum: ex radice tenui, oblonga, fibrosa, caulis sesquipalmaris, aliquando altior, ramosus, rotundus, striatus, minimis aculeis donatus, alba medulla plenus, exurgit: folia omnium prima ex semine prodeunt, oblonga, angusta sunt: subsequenter vero, quemadmodum & ea quæ in caule sunt, papaveris corniculati instar laciniata: non hirsuta, sed mollia & nitida medium caulem amplectentia, quæ tres, quatuorve vncias longa, duas lata; per margines aculeis flavescentibus & acutissimis armata; parte quidem superna viridia, at nervis, quasi tenui pulvere asperso, albicantibus: parte inferna canescentia & nervis ex minimis aculeis exasperatis. Flos luteus, ex quinque vel sex, aliquando quatuor folijs compositus, odorem Chelidonij maioris quodammodo referens, ramulorum summis infidet: huic succedit capitulum oblongum, pentagonum, hexagonum, & tetragonum, multis staminibus flauis id ambientibus, quod tenellum summa parte rubescit, maturum vero nigricat, spinis frequentibus & firmis horridum: hoc semine nigro, sextuplo aliorum maiore, rotundo, in apicem desinent & elegantissime striato, plenum est. Iulio & Augusto florere, & autumnò serri debet, cum planta annua sit.

Semen ex Anglia primum, nomine Figo del inferno, id est, Ficus infernalis, à D. Camerario iunior Norinberga allatum, unde D. Doldius primum anno 1593. & mox nobiliss. Cortusius, Patauio, & plantam & semen transmissere, primusque Papaveris spinosi nomine donauit, uti videre est in Phytopinace, & in Matthiolo, ubi & figura & descriptio proposita est, aliquot annis antequam Clusius, hoc, Papaveris spinosi nomine, in sua historia exhiberet. Tota planta succo flavescente, instar Chelidonij maioris abundat, quam ob causam Glaucium ne sit Dioscoridis, dubitamus: eos enim qui Chelidoniam maiorem, & eos qui Poma amoris volunt, & eos qui Papauer corniculatum phœniceum, substituunt, non probamus. Dioscorides etenim suo Glaucio, foli Papaveris corniculati tribuit, addens *λίπερώτερη φύλλα*, nitidiora interpretor, qualia sunt Papaveris spinosi, non hirsuta, ut cornicu-

lati: addit totum croceo succo madere: quem sane vel leuissimo vulnere copiosum hoc Papauer fundit. Sed de his, in Theatro, Deo volente plenius.

## DE ARGEMONE.

## CAPVT IV.

ARGEMONE alpina lutea: huic folia sunt, ad radicem parua, multa, in multifidas tenuesque alas instar foliorum Scandicis incisa, viridia & laeua, inter quæ cauliculi bini, terni, palmares, nudi, leuissimis pilis vestiti, recta assurgunt, qui floribus vniculis mediæ magnitudinis, luteis, quadrifolium sustinent: ex floris umbilico, plurimi apices flavescentes exurgunt: flori capitulum paruum subrotundum, asperiusculum, semen continens succedit. Hanc in monte Sneeberg Austria; qua parte ex pago eiusdem nominis perpendiculariter ascenditur, inter saxa D. Burserus reperit.

## DE ANEMONE.

## CAPVT V.

I. ANEMONE tenuifolia Cretica albo magno flore: folijs est Ranunculi pratensis, vel hortensis repentis, specie trifolia, rarius quinquefolia diuisis, per marginem crenatis: caule pedali, rotundo, flores duos vel tres albos, ex sex, vel septem folijs compositos, Papaveris erratici florem magnitudine superantes, sustinente: quibus capitulum, seminibus aliorum Ranunculorum more confectum, succedit. Hanc delineatam, Patauij natam, Laurentius Rosena Germanus Pharmacopæus, una cum alijs anno 1595. transmisit: cuius iconem etiam Phytopinaci addidimus.

II. ANEMONE sylvestris alba minor: ex radice subnigricante, fibrosa, folia subrotunda, vnguem vix superantia, longis pediculis villosis donata, terna, quaterna, Ranunculi pratensis modo, tribus usque ad umbilicum incisuris, dein singulis, alijs tribus minoribus laciniata, pallide virentia, mollia & hirsuta exurgunt, inter quæ cauliculus candida lanugine pubescens, vnciarum septem altus, in medio duobus foliolis paruis laciniatis cinctus, cuius summo flos vnicus, paruus, triplo quam in vulgari minor, quinquefolius, candidus, in cuius medio capitulum exiguum, multis breuissimis sub-

M. 3. luteis

diaco.  
nine à  
pinace  
lescri-  
cyami  
suisse

flore:  
asper-  
us in-  
liuifis  
e me-  
diæ



luteis staminibus cinctum insidet. In summa, ab Anemone sylu. alba maiore, quam tertiā Matthiolum facit, sola magnitudine differre videtur. Hæc prope Herbipolim sponte nascitur.

III. ANEMONE alpina alba maior: ex radice nigricante, folia exurgunt acuta, Cicutariæ modo, multis diuisuris secta, atrouirentia, & parte prona, secundum venarū ductum, villosa, inter quæ cauliculus tenuis, leuiter hirsutus, vncias sex altus, cuius summo flos albus, maior quam in vlla Anemone syluestri, vel etiam Pulsatilla vulgari, ex septem folijs compositus, ex rotunditate in acumē desinentibus, & pluribus in medio staminulis luteis donatus, insidet: an vero tandem huius, vt & sequentis flos, in plumosi seminis congeriem transeat, non constat.

IV. ANEMONE alpina alba minor: tota planta vncias quatuor non excedit, radiculam habet parua, nigram, folia longe minora, quam prioris, magisq; villosa: cauliculo est biunciali villosa, quæ circa medium folia similia amplectuntur, cuius summo flos albus, sex folijs donatus, priore quadruplo minor, multis staminulis luteis præditus, insidet: hæc q; ad Anemonem syluestrem 2. Clusij accedit. Vtræque in Austria prouenit: illa in Blauenstein; hæc, in Taurero Raftadiensi, vbi D. Burserus collegit.

#### DE PULSATILLA.

##### CAPVT VI.

I. PULSATILLA palustris: hæc folijs est ad radicem in tenuissima & angusta segmenta diuisis eorum pediculis hirsutis, inter quæ caulis pedalis, rotundus, rufescens, leui lanugine asperus, cuius medium folia capillacea acuta cingunt, ipsiusque summo flos vnus, villoso capitulo ex capillaceis folijs composito sustentatus, insidet, qui vulgari longe minor, ex folijs sex acutis, violæ nigræ colore compositus, staminibus in medio luteis: capitulum villosa cæsarie comosum, & incanescens, cum semen succedit. Hæc apud nos in pratis vdis & paludosis Michelsfeldæ prouenit: & in hortum translata, cum vulgari, vegetior quidem sit, sed formam & colorem referuat.

II. PULSATILLA apij folio venalis flore maiore: ex radice nigra, longiuscula, folia plura, pediculis oblongis, pilosis donata, crassa, dura, rigida, Apij

foliorum instar in quinas lacinias, & hæc in alias diuisa, margine piloso, prodeunt: inter quæ cauliculus vnciarum quatuor, nudus, at hirsutæ incanus exurgit, qui florem magnum, trium vnciarum longum latumq; ex sex folijs compositum, multisque apicibus luteis, vt & duæ sequentes, donatum, sustinet; qui colore variat, aliquando ex albo & subpurpureo mixtus, aliquando intrinsecus albus, extrinsecus subpurpureo, vernali tempore florens: in syluis circa Francofurtum ad Oderam, D. Fleisserus, vt & sequentem, collegit.

III. PULSATILLA apij folio vernalis flore minore: & hæc ex radice crassa, nigra, oblonga, folia crassa, pauca, oblongis pediculis donata, Apij instar, sed in tres tantum lacinias ad vmbilicum diuisa, quarum quælibet in alias binas, ternas vel lacinias, per marginem incisas, secantur, & pilis vix conspicuis donantur: cauliculo villosissimo, vncias duas alto, flos priore media parte minor, & dilute purpureus insidet: Aprili, folijs plerumque carens, floret.

IV. PULSATILLA apij folio autumnalis: radice est longa, foris nigra, intus candida, folijs ad radicem plurimis, Apij modo in tres tantum lacinias, & has in alias diuisis, glabris, inter quæ cauliculus triuncialis, alb' pilis villosus, florem præcedenti minorem obsoleti coloris, instar vulgaris, sustinens, qui, vt & priorum flores, in capitulum hirsutum, quod semen continet, abit. Septembri mense florens, in Lusatia, vnde D. Francus misit, reperitur.

V. PULSATILLA, folio Anemonis secundæ, vel subrotundo: radix crassa, nigra, aliquot propagines quandoque fundit: ex quibus prodeunt folia, pediculis oblongis hirsutis donata, instar Anemonis bulbocastani radice subrotunda, inferne & per marginem leui lanugine candicante, semper in lacinias tres latas, & hæc in alias bifidas, vel trifidas, minus profundas secta: inter quæ caulis emergit pedalis, subhirsutus, infra medium angustis oblongis folijs (qualia & flori subiiciuntur) cinctus, florem subcæruleum, septem folijs donatum, & reliquorum more in pappum abeuntem, sustinens: ex

Lusatia à D. Franco, Pulsatillæ latifoliæ nomine, accepimus.



## DE RANVNCULO.

## CAPVT VII.

**I.** RANVNCVLVS nemorosus Anemones flore minor: tota planta vncias sex non superat: radícula est tenui, obliqua, cauliculo tenuissimo, triunciali, quem folia, vt in Ranunculo nemoroso albo, in tres lacinias, & hæc in alias, diuisa, sed vix vnguem lata, cingunt, ita vt tota planta cum flore, vnam vulgaris Ranunculi nemorosi albi laciniam, latitudine non superet: hæc, cauliculus vncialis superat, florem paruum album sex foliorum sustinens. A vulgato nemoroso non distinguere, nisi hic paruos copiosissime in editissimo monte ad Curiam Rhetorum, & circa Monspelium fuisset obseruatus.

**II.** RANVNCVLVS rotundifolius repense echinatus: ad radicem nigricantem, capillatam, folia sunt rotunda, crenata, vncialia, pediculis longissimis donata, quæ vero in caule, maiora, pleraque rotunda, etiam in lacinias, sed non vsque ad umbilicum, diuisa: caulem habet pedalem, in terram reclinatum & quasi repentem, ac in alios diuisum, circa quem folia pediculis palmatis donata: flores pallide lutei, paucis ad umbilicum staminibus: flore deciduo, capitulum ex pluribus seminibus rufescentibus subasperis echinatis simulq; congestis compositum, succedit. Tota planta ob pilos asperos mollis est, atrouirens, & circa Bononiam in agris prouenit.

**III.** RANVNCVLVS palustris echinatus: è radice in multas fibras longas capillatas diuisa prodeunt folia glabra, atrouirentia, longis pediculis donata, communiter vnguem pollicis lata, pampini fere diuisura & in ambitu incisa, in caule tamen latiora & profundius laciniosa: ramis est recuruis, aliquando pedibus, & in alios breuioribus, hi que adhuc in minores diuisi: aliquando tamen tota planta vncias quatuor non excedit, & tunc ramuli plures à radice, duas, tresve vncias non superantes exurgunt, quorum extremitatibus flores pallide lutei, quinque folij insident: singulis succedit capitulum ex seminibus compressis, echinatis tuberculis obfritis, in apicem recuruum acutum desinentibus, plucibus, paucioribus, aliquando duodecim simul iunctis, compositum.


Locis humidis & aquosis Monspeffuli gaudet.

Huius licet aduersaria sub Ranunculo palustri rotundiore folio semine echinato obiter meminerint, attamen quia cum Ranunculo palustri rotundifolio læui confundunt, vt in Phytopinace monuimus, integram veramque descriptionem proponere volumus: hunc videtur Clusius in postrema sua historia nomine Ranunculi Apuleii, figura minus fideliter expressum, exhibere.

**IV.** RANVNCVLVS grumosa radice folio ranunculi bulbosi: ex radice alba, grumosa, veluti ex paruis bulbis sed firmiter compactis, composita, fibris oblongis intermixtis folia: Ranunculi vulgaris radice verticelli folijs similia, subrotunda, sed profundius dissecta, oblongis pediculis donata, leuissime pilosa, prodeunt: inter quæ caulis pedalis, hirsutus, rarius in ramos diuisus effertur, quem folia in angustos lobos secta bis cingunt, cuius summo flos luteus, aliorum forma insidet: cui capitulum, breuissimis aculeis armatum succedit. Hic Ranunculus agris Bononiensibus familiaris est, & à D. Agerio collectus. Huius etiam meminimus in Phytopinace, sub Ranunculo racemosa radice Joh. Bauhini: qui in montibus Bononiensibus reperit. An hunc intelligit Anguillara opinari, dum meminit Ranunculi circa Sebenicum Dalmatiæ oppidum, radicibus. Chelidoniæ minoris, qui polyanthus sit: de quo & Camerarius in suo horto, sub Ranunculo pleno flore luteo repente maiore?

**V.** RANVNCVLVS geranij tuberosi folio: radice est fibrosa, caulibus multis cubitalibus, viridibus, leuibus, striatis & ramosis: folijs à radice absq; pediculis palmaribus, vncias sex longis latiq; superne atrouirentibus, foliorum Geranij tuberosi instar in multas lacinias, sed longiores & latiores ad pediculum diuisi, & rursum in alias scissis: at in caulis summitate, in segmenta graminea partitis: flores in ramulorum summis plures, parui, lutei, multis in medio staminibus, quibus: capitulum paruum rotundum cum seminio succedit. Non longe Patanio in Arqua, vbi Petrarchæ sepultura, anno 1578. legimus, quem nobiliss. Cortusius.

Butrachium verum nominavit.



VI. RA-



*Ranunculus montanus subhirsutus*  
latifolius.



**VI. RANUNCULUS** montanus subhirsutus latifolius: ex radice oblonga, fibrosa, folia prima Geranio columbino similia, subnigricantia, mollia, in tres primum lacinias ad pediculum diuisa, & hæc in alias tres, hæc in alias secta, pediculis palmaribus, subhirsutis donata prodeunt, quorum tamen superiora latiora & acutiora: inter quæ caulis sesquicubitalis, cauus, striatus, pene glaber, in ramos brachiatus, effertur: quibus flores parui, pallide lutei, quinquefolij insident; his semina, in capitulum congesta, succedunt. Hic in humidis montis Muretæ prouenit.

**VII. RANUNCULUS** montanus lanuginosus folijs ranunculi pratensis repentis: radicem habet fibrosam, rufescentem, à qua, cum caule tenui, cubitali, lanuginoso, superne in alas diuiso, prodeunt folia pallide virentia, tactu mollia, pediculis pal-

maribus, lanuginosis, donata, instar Ranunculi pratensis repentis, in tres primum lacinias, oblongis pedicellis donatas, & hæc in alias acutas, per marginem crenatas, diuisa, flos aureus, quinquefolius, priore maior est. In altissimis montibus, vti in Belken Marchionatus, reperitur.

**VIII. RANUNCULUS** saxatilis magno flore: radix ex oblongis fibris capillaribus composita est: folia habet ad radicem plura, oblongis pedicellis nonnihil lanuginosis donata, vnguè vix lata, in tres paruas lacinias, & hæc in binas, vel ternas acutas diuisa, inter quæ cauliculus palmo minor, tenuis, lanuginosus, cuius summo flos magnus, aureus, splendens, quinquefolius, multis in medio staminibus rufescentibus, insidet. Circa Monspelium in saxosis creuit.

**IX. RANUNCULUS** saxatilis folijs subrotundis: radix in fibras oblongas, capillaceas abit: folia per terram sparsa, subhirsuta, crassa, pedicellis vncialibus donata, vix vnguè lata, in petiolo parua, subrotunda, & hæc in alia diuiduntur: cauliculus tenuis, lanuginosus, sex vnciarum, ad exortum statim diuiditur: flos luteus, quinquefolius, multis staminibus donatus. Eodem quo prior loco reperitur.

**X. RANUNCULUS** minimus saxatilis hirsutus: radice est pusilla, capillari, circa quam foliola plurima, in tres lacinias subrotundas, & per marginem incisas, diuisa, longis pedicellis hirsutis donata quæ cauliculus, duarum triumve vnciarum, hirsutus exurgit, florem luteum, aliorum Ranunculorum similem, multis in medio croceis staminibus, sustinet: cui capitulum paruum, vt in alijs succedit. Non longe Monspelio, ad Latres, prouenit.

**XI. RANUNCULUS** villosissimus Monspeliacus: radice est fibrosa, rufescente, folijs ex ea prodeuntibus crassis, villosis, paruis, in lacinias primum ternas, alias subrotundas, alias acutas, & hæc in alias incisas & per marginem crenatis: quæ vero in caule sunt, in oblongas & acutas, & quasi aculeo armatas lacinias, sed longitudine impares, diuiduntur: inter quæ caulis palmaris, in breues alas brachiatus, quibus singulis, folium in plures lacinias diuisum, subiicitur: flos aliorum Ranunculorum forma, mediæ magnitudinis, lutei coloris est. Totâ planta ob pilos rufescentes, molles, villosa & rufescens est, & Monspessuli in saxosis reperitur.

DE



## DE DORONICO.

## CAPVT VIII.

**I.** DORONICVM Helueticum incanum: ex radice geniculata, & quasi squamata, caulis emergit pedalis, rotundus, incanus, cui flos magnus luteus, folijs aureis longiusculis non crenatis, discucingentibus, qui tandem in pappum abit cum semine aliorum simili: folijs est crassis, ad radicem aliquibus subrotundis, alijs ex rotunditate oblongatis, in ambitu dentatis & serratis, parte inferiore vna cum pediculis ob incanam lanuginem mollioribus, superne vero pallide virentibus & neruo albicante: quæ vero caulem ambiunt, longa sunt, angusta & acuminata, acris & amari saporis: ex Helueticis alpinis D. Burserus attulit.

**II.** DORONICVM Helueticum humile crassis folijs: planta palmaris est, folijs crassis & densis, superne atrovirentibus, inferne pallidis, nonnihil hirsutis, primis quidem ex rotunditate oblongis, per ambitum crenatis, pediculi basi caulem ambientibus, subsequenter vero, vncias sex longis, sesquiunciam latis, quorum superiora pediculis carent: caule est breui, hirsuto, in ramulos biunciales diuiso, quorum singuli florem luteum, mediæ magnitudinis, sustinent. Iulio mense in Valesianorum iugis (ouff der Gemme vocant) floret, vbi D. Fleisserus eruit.

## DE ELLEBORO.

## CAPVT IX.

**E** LLEBORVS niger Saniculæ folio minor: radices nigrae sub sunt & ab vno exiguo capitulo fibræ quamplures tenues descendunt: folia, quæ oblongis pediculis donata, subrotunda sunt, vnguem pollicis lata, in septem lacinias breues & angustas, ad vmbilicum vsque diuisa, per margines crenata, in caule vero, breuissimis pedicellis tenuissime fissis: inter quæ cauliculi bini, terni, tenuissimi, palmares, & glabri exurgunt, vno alterove folio vestiti: aliquando in summo, pedicelli ad latera prodeunt, qui flosculos complures simul factos, candidos, quasi in muscario in ætos, sustinent. In summa, veratrum nigrum Dodonæi, siue Astrantiam nigram Lobelij, per omnia refert, solaq; magnitudine dif-

fert. Hic in Alpinis solum reperitur, vt in monte Fracto, Spligel Rhætorum & in Pyrenæis.

## DE GENTIANELLA.

## CAPVT X.

**I.** GENTIANELLA alpina latifolia magno flore: ad radicem nigricantem, fibrosam, folia humi sparsa, quaterna, quinave subrotunda, crassa, plantaginis, vel Calthæ alpinæ forma, vnciam lata, duas longa: inter quæ cauliculus vncias quatuor altus, vno alterove folio donatus, cui vtriculus infidet, vnicum florem oblongum, cæruleum, calathio similem sustinens: cuius calici vtrinque folium oblongum adponitur: ex Helueticæ alpinis habemus.

**II.** GENTIANELLA omnium minima: ex radice oblonga, tenui, albicante, foliola oblonga angusta, viridia, plurima simul instar cespitis coniuncta, prodeunt, inter quæ pedicelli breuissimi (tota enim planta, radice excepta, ad vnciam non excedit) quibus singulis flosculus, pro plantulæ ratione magnus, pallide cæruleis, staminulis donatus, caliculo inclusus, infidet: hæc nisi summe amara esset, Muscus aliquis floridus censeretur: in summis Alpium Helueticarum iugis reperitur.

## DE PLANTAGINE.

## CAPVT XI.

**I.** PLANTAGO maxima tota glabra: ex radice nigricante, fibrosa, folia sex, septem, octo, glabra, carnosæ, & nervosa vncias sex longa, quatuor lata, pediculis pene palmaribus, initio rubetibus, donata, prodeunt: inter quæ pediculi nudiores, quatuor, quinque, bicubitales, atrovirentes, rotundi, striati, spicam pedalem sustinentes, exurgunt: circa Montpelium reperitur.

Reperitur quoque folijs laciniatis, tenuibus, glabris, pedibus, vncias sex latis, caule etiam superante, & ad spicæ exortum, folia habente.

**II.** PLANTAGO quinqueneruia caulium summitate foliosa: hæc à vulgari in eo differt, quod cauliculi spicam florum sustinentes, in caulem palmarem excrefcunt, in cuius summitate, folia plura, eo modo quo ad radicem disposita: spicis, non ob-

N

longis,



longis, sed rotundis, breuissimis pediculis lanuginosis insidentibus.

Reperitur etiam quinqueneruia vulgaris, spicis bifidis: vel loco spicarum, sunt capita mire variantia, à pediculis nudis sustentata, quorum quædam ex infima spicæ parte, vtrinque; vnum capitulum obtinent, alia pluribus capitulis, vtrinque; spicæ circumiectis, donantur.

III. *PLANTAGO* trineruia angustissimo folio: radice est tenui, fibrosa, albicante; folijs aliquando palmaribus, aliquando vncias quinq; longis, stric-  
tissimis, atrouirentibus, tribus nervis distinctis, per marginem potissimum pediculis, pilosis: inter quæ cauliculi plures exurgunt, alij cubitales, alij pedales, alij palmares, aliquando triunciales, ad exortum aliquando villosi, glabri nonnunquam, quibus spicæ breues, oblongæ & subrotundæ insident. Hanc sæpius ad vias, maxime ad rudera, notauimus.

IV. *PLANTAGO* angustifolia paniculis lagopi: ex radice oblonga, fibris oblongis capillata & rufescēte, cauliculi plurimi, aliquando supra viginti, nudi, leuiter hirsuti, rotundi, recurui, altitudine impares, alij palmam excedentes, semipalmares, alij duas tresve vncias non superantes, prodeunt, qui capitulum lagopi forma, modo longum, modo breue, molle, rufescens sustinent: ad latera flosculi parui, rufescentes, tenuissimis pedicellis insidentes conspiciuntur, quibus semen minutissimū succedit: folia habet plura, nervosa, vncias quatuor longa, vncia angustiora, hispida, & in exquisitissimum apicem definentia. Hæc copiose in agris Nemausensibus prouenit.

Hæc aliquando ita parua, vt vncias tres non superet, magis villosa, & capitalis minimis rotundis donata.

DE HOLOSTIO SIVE LEONTOPODIO CRETICO.

CAPVT XII.

**H**OLOSTIVM siue Leontopodium Creticum: ex radice rufescente & quasi squamata, paulatim gracilescēte, & in fibras diuisa, folia viginti, etiam plura, palmaria, angusta, nervis tribus per longitudinem discurrentibus distincta, & hirsutie subaspera, prodeunt: inter quæ pedicelli plures, molli rufescente lanugine pubescentes, duarum triumve vnciarum conspiciuntur, quibus singulis capitulum crassiusculum, rufescens insidet: flosculi albicantes, umbilico nigricante præditi, quandam foraminum speciem præbent: at in senescente, & arefcente planta, pediculi crassiores & rigidi facti, vna cum capitulo terram versus, ad radicis caput adeo curuantur, vt pedem leoninum quodam modo referant. Hoc in Creta prouenit, & Patavio à Laurentio Rosena Pharmacopæo, Leontopodij Cretici & Catanæces Cortusi nomine: dein pro Holostio minore, ab Imperato Neapoli accepi, & ante viginti & aliquot annos descriptionem, figura addita, in Phytopinace proposuimus: postmodum & Clusius Leontopodij Cretici nomine, exhibuit.

DE CORONOPO.

CAPVT XIII.

**C**ORONOPVS maritimus minimus: radícula est longa, capillari, foliolis multis per terrā sparsis, in lacinias tenues instar foliorum Scabiosæ minoris siue Stæbes diuisis: inter quæ plures pedicelli recurui, vnciales, thyrsulos paruos spicatos & hirsutos sustinentes, flosculis minutissimis donatos: tota planta hirsuta est: hanc  
D. Gillenius misit.

DE PSTL-



Pſyllium minus.



DE PſYLLIO.

CAPVT XIV.

**I.** PſYLLIVM Indicum folijs crenatus: radice est oblonga, tenui, fibris capillata: caule circa radicem lignoso & rufescente, rotundo, subaspero, pedali, in frequentes ac foliosos ramulos diuiso, qui capitula plura, singula singulis pedicellis insidentia, sæpius dena, duodena, squamata sustinent, è quibus flosculi pusilli, pallide lutei, lanuginosi relucunt: semen nigricans, paruum, splendens, succedit: folia habet oblonga angusta, acuta, crenata, instar foliorum Coronopi, nonnihil laciniata, hirsuta: ex semine Pſyllij Indici nomine sato, in horto aliquoties Iulio florens, enatum. Et hoc Dioscoridis Pſyllium censemus.

**II.** PſYLLIVM minus: huic radix est tenuis, ob-

longa, subalbida, fibris paucis capillata: ramuli semipalmares, rotundi, tenues, rufescentes, in terram reclinari, in summo in minores diuisi: folijs breuib. angustis, binis sibi ex opposito respondentibus, quæ alis subijciuntur, aliquando ternis, nonnunquam quouis simul iunctis: ramulorum fastigijs, capitula squamata insident, quibus vtrinq; foliolum vnum (aliquando plura & impari longitudine) paruum recuruum & per maturitatem rigidum subijcitur: flosculos habet pusillos, albos, pedicellis inhaerentes, quibus semen longe vulgari minus, subnigrum relucens, succedit, Augusto florens in horto collegimus, semen Parauio ex nobiliss. Bembi horto, Gottne rubri & albi nomine misso: sic & Alpinus, Gottne rubrum nominauit, differentiam inter Gottne rubrum & Gottne album (hoc enim Holostij species est) faciens. Idem & Botrio rubro nomine, à Sprengero Heidelbergæ accepimus.

## DE LIMONIO.

## CAPVT XV.

**I.** LIMONIVM maritimum minus foliis cordatis: ad radicem crassam, lignosam, rufescentem, parumq; fibrosam, folia plurima, densa, carnosæ, læuia, subrotunda, per terram instar cespitis sparguntur, in quibusdam plantis obtusa, nullog; mucrone prædita: in alijs, in summo sinum habentia, & cordis formam referentia: inter quæ cauliculi plures, inæquales, trium, quatuor, etiam sex vnciarum teretes, nudi, prodeunt, in plurimos breues & recuruos ramulos diuisi, flosculis frequentibus paruis, pallide rubentibus onusti. Hoc in litore maritimo, vt circa Massiliam & Louornum, reperitur.

**II.** LIMONIVM maritimum minimum: tota plantula vncias quatuor vix excedit: nam ad radiculam oblongam, rufescentem, in summo diuisam, foliola minima, subrotunda, crassæ, instar Sedi compacta, inter quæ cauliculi vnciales, paucos flosculos pallide rubentes, vel subcæruleos sustinentes, exurgunt. Hoc in insula quadam non longe

Massilia, prouenit. De alijs Limonij differentijs, in Theatro agetur.



## DE BISTORTA.

## CAPVT XVI.

**B**ISTORTA alpina maxima: ex radice quadruplo quam in vulgari maiore, contorta, geniculata, fibris capillata, foris nigricante, intus alba, caules bicubitales, nodosi, striati, maiori ex parte nudi exurgunt, quorum qualibet spicam florum sub-purpureorum, vnciarum quatuor sustinet: folia

habet oblonga, in acumen definentia, venosa superne virentia, inferne caesia, vel etiam incana: quorum quedam ad cubiti altitudinem accedunt, sed angusta, vncias tres lata. In altissimis Silesiorum montibus reperitur, vt in Sudetorum iugis, velut ad Gigantæum, Albis fontes

*Schnee-gruben.*



## DE PYROLA.

## CAPVT XVII.

*Pyrola alpine flore maior.*



**P**YROLA Alpines flore duplex est. Europæa & Americana, ytraque maior & minor est: nullius

*Pyrola alpines flore minor.*

hactenus figura posita fuit: Europæam tamen, primus Val. Cordus in obser. sylua sub herba trientali proposuit, dein Iohannes Thalius, in sua Hircynia Saxothuringica, sub Alimæthemo descripsit: & Iohann. Francus in horto Lusatiæ, nomine herbæ pusillæ trientalis, & tandem Casp. Schwenckfeldus, in suo Catalogo plantarum Silesiæ, Alsinem alpinam nominauit: nulla differentia ostensa. Alsinanthemi maioris & minoris nomine, à D. Sigfrido Helmstadio: Pyrolæ Bohemicæ maioris & minoris, à D. Doldio: minorem vero, nomine Anonymi Belulæ folio, in betuletis Scotiæ natam, D. Cargillus, ex Scotia misit. Huius descriptionem, à prædictis propositam, præterire, & Brasilianam maiorem describere, in præsens lubet.

**P**YROLA Alpines flore Brasiliæ: ex radícula alba, tenui, capillata, cauliculus effertur singularis, tenuis, læuis, sex, septemve vnciarum, inferiore parte nudus, circa medium duobus foliis paruis sibi oppositis donatus, superius vero folijs sex vel septem per ambitum cinctus: quæ magnitudine imparia sunt, aliquibus vncias duas, alijs vnam longis, vnciam vel semunciam latis, Plantaginis quinqueneruæ forma (cū & per huius folia quinque nerui discurrant) sed glabra, tenera & viridia, in acumen fastigiata, ex quorum medio pedicellus tenuis, vncialis exurgit, florem singularem, pallide luteum, vngui pollicis æqualem, quadrifolium, striatum, cuius folia (stellæ modo disposita) lateralia, alijs duobus latiora sunt: ad floris umbilicum, staminula plura exigua, rufescentia occurrunt.

Hæc in Brasilia apud Tououpinambaulios reperta



reperita est, & ab Europæa, potissimum folijs quinqueruijs differt, cum per Europææ, tam maioris, quam minoris folium medium, vnicus nervus feratur, à quo fibræ per latera sparguntur: dein flore, quintuplo maiore: At minor Brassiliana, ab Europæa minore, solum foliorum magnitudine, quæ in Brassiliana longiora, angustiora que sunt, differt.

## DE POTAMOGETO.

## CAPVT XVIII.

**I.** POTAMOGETON racemosum angustifolium: radice est capillacea, rufescente, cauliculis tenuissimis, palmaribus, in aqua fluitantibus, folijs angustis, longis, binis ex opposito respondentibus: aliquibus in ambitu leuiter sinuatis, aliquibus minime sinuosis: petiolo tenui, breuique, flosculi pusilli, vix in morem congesti, insident, quibus granula aculeata, simul iuncta succedunt. Hoc prope Monspelium, ad molendinum in aqua fluitans reperitur: idem tribuli aquatici minoris nomine, D. Francus ex Lusaria misit.

**II.** POTAMOGETON gramineum ramosum: ex cauliculo pedali, etiam cubitali tenuissimo, rotundo, albicante, in plures alas brachiato, folia graminea, oblonga, atrouirentia, non alternatim, sed multum ab inuicem distita, prodeunt, quæ in alia folia, fere capillacea, abeunt, nihilominus tamen ex primi folij ala, cauliculus in similia folia abiens, exurgit: in extremo caulis, pediculus triuncialis, flosculos minutos, & granula subsequencia minuta & subaspera, non racemi modo, sed magis, & velut in spica, dispersa, sustinet. Hoc in paludibus Austriæ fluitans, Fontilapathi graminei nomine, D. Burserus misit.

**III.** POTAMOGETON minimum capillaceo folio: hoc paruum est capillaceo & caule & foliolis oblongis, inordinate dispositis, pallide virentibus: in summo, pedicello paruo, modo vno, modo duobus, capitulum minimum & acuminatum, prioris tamen forma, quod: minutissimo flosculo pallidulo successit, sustinet, quorum aliud expansum, aliud quasi vesiculæ foliaceæ in acumen desinentis, inclusum est. Hoc cum sequenti, Monspelio D. Burserus attulit.

**IV.** POTAMOGETON capillaceum, capitulis ad alas trifidis: hoc cauliculo est palmari, pilo non crassiore, ramofo, articulado, ad quemlibet articu-

lum, folia bina, oblonga, quouis pilo tenuiora, ex aduerso respondentia: quorum alis, minutissimi flosculi palliduli insident, qui iuncti, nodulum quasi referunt, quo maturato, nodulus siue capitulum, ex tribus portiunculis semicircularibus in apicem abeuntibus & rufescentibus compositum, conspicitur nihilominus tamen, ex priorum foliorum alis, pedicellus exurgit, qui in tria, etiam plura foliola absumitur, similisq; in medio nodulus adponitur; in summitate namque capitulum nullum est.

## DE SERPENTARIA.

## CAPVT XIX.

**S**ERPENTARIA triphylla Brassiliana: hanc integram describere non licet, siquidè solum caulis portio cū folio & flore ad manus sit: quare ex caule rufescente, striato, exurgit, folij pediculus palmaris, & læuis, in cuius summo folium tenue, albide virens, fibrosum, subrotundum, trifidum, in exquisitum apicem desinens, duabus partibus inferioribus, & quidem inferne sinum obtinens, quorum quodlibet, vncias binas cum dimidia latum, longitudine vero vncias quatuor superat: flos serpentariæ maioris forma, similiter pediculo triunciali donatus, longitudine vnciarum quinque, latitudine sesquiuncialis, atrorubens, striatus, venis albicantibus per medium, maxime extrinsecus, excurrentibus: pistillo nigricante, oblongo, in summo bifido. Ex Tououpinambault Brassiliæ anno 1614. allata.

## DE TVSSILAGINE.

## CAPVT XX.

**T**VSSILAGO alpina folio oblongo: ex radice nigricante, minimi digiti crassitie, plurimis fibris donata, caulis exurgit cubitalis, hirsutus, rufescens, striatus & asper: folijs ad radicem quinis, senis, longis pediculis donatis, oblongis, nigricantibus, duris, hirsutis asperis, per marginem crenatis, & imparis longitudinis: at in caule binis, ternisve angustioribus: cuius summo, aliquando in ramos diuiso, flos muscosus, luteus, satis magnus insidet, qui tandem in pappum euanescit. In Helvetiorum alpibus & Baldo (sed angustioribus folijs) prouenit.



## DE CACALIA ET LAPP.

## CAPVT XXI.

**C**ACALIA tomentosa: folia habet Tussilaginis folijs maiora, figura instar Personatæ oblonga, in ambitu ferrata, nonnunquam sinuata, superne ex virore nigricantia, venis tamen, in cana lanugine albicantibus, percurrentibus: inferne, propter densam & molliſſimam lanuginem qua pubescit, candidissimis: quorum pedicelli oblongi, striati,

non secus ac folia, lanuginosi: de floribus nil constat, cum solum folia aliquot D. Paschalis ad nos miserit, in Sumano monte prope Vincentiam collecta: eandem circa Thermas Fabarias, sed floribus, cauleq; carentem, postea obseruauimus.

**L**APP A rosea: hæc à vulgata differt capite: nam circa floris capitulum, folia plura, veluti in Plantagine rosea, dense stipata, iunguntur, quæ singula in mollem aculeum desinunt: hæc apud Lipenses frequenter reperitur: vnde à D. Iungermanno accepimus.

## LIBER SEXTVS.

## DE LEVCOIO.

## CAPVT I.

**I.** **L**EVCOIUM luteum magno flore: hoc à vulgari Leucoio luteo Keiri dicto, differt magnitudine & colore, quia paruum fruticem, valde ramosum & totum virentem refert: folijs est maioribus, viridibus, splendentibus: floribus quadrifolijs magnis, ita vt huius folium, vulgaris totum florem pene adæquet, odoratissimis, intensiorisque lutei coloris: siliquis copiosis, semen minutum, planum rufum continentibus. Hoc Maio mente & maiore ætate parte floret, pertenuis est, & frigoris patiens, cuius semen, Leucoij lutei Hispanici nomine misum est.

**II.** **L**EVCOIUM luteum serrato folio: hoc à præcedente folijs potissimum discrepat, quæ duplo pene longiora, angusta, per latera crenis asperis ferrata, & in aculeum finientia, quæ similiter crassa, sed pallide viridia, mollia, quia parte inferna quasi lanugo aspersa est: flores lutei sunt & magni. Hoc D. Doldius Notinberga misit.

**III.** **L**EVCOIUM luteum sylvestre hieracifolium: hoc circa radicem crassiusculam, albicantem, in oblongas fibras capillatas abeuntem, folia plura habet per terram sparsa, eaque oblonga, angusta, subaspera, sinuosa & per æstatem in planta luxuriant Hieracii instar sinuata, quæ circa caulem pedalem, striatum, nonnihil in canum alternatim disposita, oblonga, latiuscula, vt in Keiri vulgari pal-

lide virentia, ob raras crenas inæqualia, ra&uq; ob leuissimam hirsutiem aspera: caulis maior pars floridus est flores lutei sunt, quadrifolij, Keiri floribus minores, oblongis pediculis donati, quibus siliquæ triuiciales striatissimæ, in summo vtrinq; parum reflexæ, succedunt: hoc in sylvis prope Neustadium Hærcyniæ reperitur, vnde D. Furerus misit.

**IV.** **L**EVCOIUM album odoratissimum folio viridi: radice est multifida, caule viridi, ramoso, aliquando minimi digiti crassitie: folijs viridibus, splendentibus, crassis, Keiri folijs forma respondentibus: floribus albis, quadrifolijs, suauiter a dmodum & quidem vespere Hesperidum modo, olentibus, cuius nomine nostrates, *Bis m. Nagest* id est, moscū redoientes garyophyllos vocant: quibus siliquæ longæ, crassiusculæ, virides, duplicem planorum seminum ordinem, membrana intercurrente, continentes, quod Leucoii albi Cretici nomine primo accepimus. Hoc per aliquot annos durat, si hyeme in cella asseruetur.

**V.** **L**EVCOIUM minimū Creticum: cauliculo est palma minore, viridi, striato, leuissimis tamen pilis aspersis: foliolis subrotundis, pallide virentibus, longis pediculis donatis, aliquando binis ex opposito, aliis alternatim sitis: cauliculi summū in duos pedicellos abit, qui flosculum oblongum, cæruleum, quadrifolium, modo vnum, modo duos, sustinent.



stinent. Hoc ex horto nobiliss. Contareni, D. Lerrizius attulit.

VI. *LEVCOIVM* maritimum minimum: radiculam habet tenuissimam, oblongam, albam, ad quam foliola minima quina, senave, subrotunda & pallida: cauliculus sesquiuncialis, rufescens, quinis, senis, foliolis oblongis, obtusis, hirsutis subcanis, alternatim dispositis, cingitur: flosculum vnum vel alterum subcauleum, cauliculus & pedicellus hirsutus sustinet. Hoc in litore maris prope Terracinum reperitur.

## DE HESPERIDE.

## CAPVT II.

I. *HESPERIS* sylvestris flore paruo: caule est cubitali, viridi, striato, nodofo, multis alis fere palmaribus, donato & concavo: folijs quam in vulgari acutioribus, in ambitu profundius serratis, viridibus, subhirsutis & minus vulgari asperis: floribus plurimis, subcauleis, quadrifolijs paruis, ita ut huius flos integer, vix vulgari foliolum adæquet, quibus siliquæ strictissimæ succedunt. Hæc, circa Monspelium in horto Dei, ad aggeres aquarum, à D. Bursero collecta fuit.

II. *HESPERIS* sylvestris Hieracij folijs hirsuta: tota planta hirsuta est, caulem habens pedalem, angulosum, hirsutum, pallide virentem, in summo in ramos aliquot alternatim dispositos diuisum, folia Hieracinis instar laciniata & sinuata, oblonga angusta, acuminata, crassa, hirsutis aspera, quorum superiora pediculis carent: flores in calicibus hirsutis rubri, magnitudine Hesperidis vulgaris flores æquantes: quibus similes siliquæ, semen continentes succedunt. In saxosis humidis Prouinciæ, D. Burserus legit.

## DE SAPONARIA.

## CAPVT III.

*SAPONARIA* concava Anglicæ: planta est elegans, radicibus fuscis, crassis, longis, lentis, repentibus fibellis paucissimis adhaerentibus: vnde caules exurgunt cubitales, rotundi, striati, glabri & albi, geniculis distincti, in terram reclinari, & concavi: circa quos folia viridia, glabra, subrotunda, nervosa, vncias duas lata, paulo longiora, rarius ex singulis geniculis bina, sed ex quolibet geniculo vnum tantum, nullo certo ordine vel numero enascitur, quod antequam expandatur, fistulæ instar caulem complectitur: flores in summo caulicorum, ex su-

periorum foliorum sinu, tenerrimis pedicellis subniti, ex caliculis oblongis, nonnihil hispidis prodeunt, Saponariæ vulgaris forma, ex quinque folijs per oras crenatis, commissi, qui colore albi sunt, leui carneo colore asperso, in quorum medio staminula quædam exigua: semen non vidimus.

Hæc ætate media floret in Angliæ, quæ in Comitatu Northampton, in nemore quodam Spianie dicto, à D. Gerardo Chirurgo Londinensi reperta, Gentiana concava nominata, & Londino à D. Listero, vna cum figura suis coloribus illustrata, missa fuit.

## DE LYCHNIDE.

## CAPVT IV.

I. *LYCHNIS* auriculæ vrsi facie: hanc in Phytopinace sub Lychnide viscosa Cretica exhibuimus, cuius hæc perfecta descriptio est: radice est alba, longa, & fibrosa, folijs ad radicem pluribus, etiam viginti numero, per terram sparsis, incanis, lanuginosis, Auriculæ vrsi folijs forma & crassitie similibus, vncias tres, etiam quatuor longis: quæ ex longissimo & latiusculo pediculo sensum rotundam figuram acquirunt, & rarius vaguem latitudine superant: caulem habet sesquicubitalem, ramosum, rotundum, hirsutum, firmum, in summo læto succo glutinosum: flores ex viridi flauescences, plures, quasi in umbella congesti, quinquefolij & bifidi: quibus caliculi parui, semen minutum nigricans continentes, succedunt. Hanc à Joh. Bauhino, Viscaginis auriculæ vrsi facie Candia, quo nomine semen à Calabona Florentia acceperat, primum habui: dein Lychnidis auriculæ vrsi facie: & hanc postmodum Clusius, Lychnidis sylu. latifoliæ nomine, exhibuit.

II. *LYCHNIS* syl. minima exiguæ flore: ex radice oblonga, tenui, cauliculus rotundus, rufescens geniculatus, trium quatuorve vnciarum, in alas minimas brachiatus exurgit, foliolis binis exiguis, acutis, ad quemlibet geniculum & alam, & ex quolibet ala, pedicelli oblongi, angustissimi, rigidi, quibus flosculus purpurascens, ex quinque foliolis, singulis cordis formam referentibus, compositus infidet. Hæc circa Monspelium, in pede montis qui est prope Boutonet copiose reperitur, quam Centaurium minimum appellabant. Verum ante quadriennium eandem, sed palmum superantem, &

Florentiæ ad agrorum margines natam, Tunicæ peculiaris nomine, à D. Burf.

accepimus.

DE



## DE CARYOPHYLLO.

## CAPVT V.

I. **CARYOPHYLLVS** arborefcens Creticus: ex radice craffa, alba, dura, & lignofa, caules cubitum fuperantes exurgunt, albi, rotundi, læues, geniculati, lignofi, in alas brachiati: folia habet ad radicem plura, longa: angufta, in acutum mucronem definentia, pallide virentia, in caule pauciffima: flores, è calicibus viridibus, tenuiffimis & acutiffimis foliolis cinctis quinquefolijs, eleganter, fed non profunde, fimbriati, ex diluta purpura rubentes, prodeunt: ex quorum medio ftaminula plura breuiusque prominent: femen vero paleaceum in caliculis continetur. Ex femine Cretico, in horto Montembelgardiano velur in arbufculam excreuit.

II. **CARYOPHYLLVS** fylueftris repēs multiflorus: ex radice craffa, lignofa, fubfulca, cauliculi plurimi, etiam quandoque fupra triginta, trium quatuorve vnciarum, tenues, partim in terram reflexi, partim erecti, paucis foliolis cincti, quæ circa radicem plura, breuiffima, anguftiffima, dura, mucronata, viridia: quibus fingulis flos, modo vnus, fæpe duo fimul caliculis ad exortum iunctis, quinquefolij aliorum forma, pallide rubentes infident. In faxofis circa Monfpelium prouenit.

III. **CARYOPHYLLVS** fylueftris biflorus: ex radice parua, folia pauca anguftiffima, vt prioris, fed multo longiora, exurgunt, & inter hæc cauliculus tenuis, plus minus palmum altus, in fummitate in duos pediculos femp̄ diftinctus, quorum finguli florem magnum, Caryophylleo fyl. vulgatiffimo multo maiorem, quinquefolium, leuiter laciniatū colore pallide rubentem fufinet. Circa Geneuam D. Cherlerus collegit.

IV. **CARYOPHYLLVS** pumilus latifolius: à radice cauliculus, ftatim in duos ramulos fex vncias altos, tenues, rotundos diuifus prodit, cui ad radicem folia breuia, latiuscula, in ramulis longiora, mollia & pallida, binis fibi inuicem ad geniculos respondentibus: cuilibet ramulo, flos vnus, priore multo minor, pallide purpurafcens, magisq; albès, ex breui calice prodiens, infidet: ex Austria D. Burferus mifit.

V. **CARYOPHYLLVS** holoftius alpin<sup>9</sup> latifolius: ad radicem tenuem, albicantem, fibrofam & re-

pentem, cauliculi aliquot in terram reclinati, hirsuti, trium, quatuorve vnciarum, folijs paruis, fubrotundis, latis, binis, fibi inuicem respondentibus, hirsutis, & craffis cinctis: ex alarum finu, pediculorum inftar ramuli exurgunt, finguli florem vnum, calici viridi primo inclufum, dein quinquefolium magnum & album fufinent, cui capitulum oblongum, femen continens fuccedit. Hic in Valesianorum alpihus, loco *Samme* dicto, & circa Fabarias reperitur.

VI. **CARYOPHYLLVS** holoftius alpinus anguftifolius purpurafcens: & hic radícula eft repente, cauliculo tenui, triunciali, leuiter hirsuto, circa quem foliola parua, oblonga, acuminata, bini fibi oppofita: flores in fummo bini, terni, prioribus minores, purpurafcentes, ftellæ in modum difpofiti, calicis foliolis viridibus alternatim velut intercedentibus: ex Pyrenæis Hifpanicis, D. Burferus attulit.

VII. **CARYOPHYLLVS** holoftius alpinus gramineus, radiculâ habet exigua, caulē palmarē, exilem, rotundum, geniculatum, pilis leuiffimis donatum, circa medium in ramulos & hi in alios brachiatum: folia ad radicem pauca, ad geniculum bina, ex oppofito respondentia, atrouientia, anguftiffima, vnciam longa; flosculi albi quinquefolij, ex calice prodeuntes, finguli, fingulis pedicellis infident: quibus exiguum capitulum, minuto femine refertum, fuccedit. In alpihus prouenit: in Austria monte Taurero, D. Burferus legit.

VIII. **CARYOPHYLLVS** holoftius montanus anguftifolius albus: & hic cauliculo eft tenui, geniculato, rufefcente, glabro, trium quatuorve vnciarum: folijs oblongis, anguftis, glabris cincto, floribus albis quinquefolijs, & prædicto quinto multo minoribus. In horto Dei, D. Burferus legit.

IX. **CARYOPHYLLVS** holoftius tomentosus latifolius: ex radice tenui & repente, caulis tenuis, rotundus, geniculatus, in terram reclinatus prodit, qui ftatim in ramulos plures palmares, femipalmares, etiam minores fubdiuiditur, quos folia oblonga, latiuscula, quædam fubrotūda, ob lanuginem afperfam mollia & alba, bina & oppofito respondentia, cingunt: flos non eft confpectus: Hunc ex horto Pilano & quidem fecundo, primum opera D. Wolfhardi Ocymoides tomentofi nomine, accepimus.

X. **CARYOPHYLLVS** holoftius tomentosus anguftifo-



guistifolius: hic cauliculis est palmominoribus, erectis tenuibus, rotundis & parte infera geniculatis, superiore parte nudis & pene glabris, qui statim in ramulos breuissimos, ex alarum sinu, ex aduerso sitos, diuiduntur: folia habet oblongiuscula, angustissima, reflexa, ob tomentum mollia & ex viridi albicantia: cauliculus in tres pedicellos, binis foliolis sustentatos, eosque oblongos, sed longitudine impares, ab it, qui singuli calicem viridem sustinent, cui flos vnus, isque albus & quinquefolius insidet: hunc in Granada, ad radicem montis copiose D. Albinus obseruauit.

Caryophyllus aruensis glaber minimus.



XI. CARYOPHYLLVS aruensis glaber minimus: ex radice capillacea rufescente, cauliculus vnus vel alter, tenuissimus, geniculatus, pedalis prodit, in summo valde ramulosus, ramulis capillo tenuiori-

bus, quorum singuli, singulos flosculos albos, minutissimos, in duos apices abeuntes sustinent: folia habet pauca, longa, angusta. Variat magnitudine, nam & semipalmaris est, paucissimis, capillaceis, breuioribusq, foliolis. Illum ex Euganeis collibus habemus: hunc vero Monspelio: & hoc adhuc minus ex syluis prope thermas Wisbadenses infra Moguntiam.

XII. CARYOPHYLLVS saxatilis ericæfolius umbellatis corymbis: ex radice tenui, contorta, lignosa & reclinata, cauliculi plures, geniculati, rufescentes, semipalmares, attolluntur: ad quorum exortum foliola breuia, angusta, ericæ similia & ad genicula singula bina breuissima & rigidiuscula: cauliculorum summitatibus, veluti umbellæ ex corymbis compositæ insident, vnde flores candidi, ex quatuor, aliquando quinq, foliolis constantes, prodeunt. Hic in Gallia prouincia locis saxosis, in monte edito prope Vigan reperitur.

XIII. CARYOPHYLLVS saxatilis ericæfolius ramosus repens: hic instar musci eleuati per terram repens, ex radice caulem lignosum emittit, in ramos plures, & hos in alios subdiuisum, quos folia exigua ericæ folijs similia cingunt: quorum summitatibus flores copiosi, niuei, magni, elegantissimi spectaculo insident: ex Pyrenæis D. Burserus attulit.

Hunc floribus rubris, sed maioribus, folijsq, ad cauliculos longioribus & latioribus, ex Hispania habemus. Vterque à Caryophyllo muscoso, siue musco florido, diuersus est.

XIV. CARYOPHYLLVS saxatilis siliquosus: è saxorum fissuris in Hæcyniæ promontorijs, planta perennis erumpit, foliolis ad radicem pluribus bellidis forma, sed multo minoribus, oblongis pediculis donatis, tenuibus pallide virentibus, inter quæ cauliculi tenues, læues, palmares, in oblongos ramulos diuisi, folijs paucis, longis, angustis cincti, prodeunt: ramulorum summis flores candidi, quadrifolij insident, quibus siliquæ strictissimæ, minutissimum semen rufescens continentes, succedunt. Gypsophyti siliquosi nomine, D. Furer. communicaui.





## DE ANTIRRHINO.

## CAPVT VI.

**A**NTIRRHINUM saxatile folio serpilli: radice est parua, ramis multis, reflexis, tenuibus, leuiter hirsutis: folijs Serpilli vulgaris forma, sed minoribus: floribus rubris, aliquando pallide cæruleis, pedicellis oblongiusculis insidentibus, forma & magnitudine vna cum capitulo succedente, Anthirrhino aruensi minoribus. Massiliæ in saxosis prouenit.

## DE LINARIA.

## CAPVT VII.

## Linaria bellidis folio.



**L**INARIA latifolia Dalmatica magnæ flore: caulibus est lignosis, rotundis, firmis, cubitis

superantibus, in ramos brachiatis, quos folia, præsertim inferiora, vnciam lata, duas longa, pediculis carentia, in apicem acutissimum desinentia, nullo ordine seruato, ambiunt: flores habet Linariæ vulgaris floribus forma similes, sed triplo imo quadruplo maiores, ex luteo rufescentes, aureolæ, quibus vascula vt in alijs, succedunt. Hanc anno 1594. in horto Montembelgardiano collegimus, enatam ex semine à Casabona Florentia misso nomine Linariæ maximæ Dalmaticæ lauri folijs: eandem quoque nomine Linariæ perennis fruticantis Creticæ accepimus.

**II. LINARIA** Americana paruo flore: ex radice caules plures sesquicubitales, rotundi, læues, rufescentes, in ramos plures diuisi, exurgunt, quos folia triplo quam in priori angustiora, in exquisitum apicem desinentia, atrouerentia, alternatim nulloque ordine disposita, cingunt: floribus est aureis, ijsque longe quam in vulgata minoribus. Hæc an. 1601. Argentina, in horto D. Saltzmanni creuit.

**III. LINARIA** latifolia tryphylla: caulibus est viridibus, rotundis, striatis, glabris, sesquipalmariibus, in summo brachiatis: folijs vt in Linaria Valentina Clusij, terno, & aduersis inter se petiolis ordine adhaerentibus, dispositis, quolibet folio vncia latiore & duabus longiore, tenui, ex glauco virescente, venis ternis, vt in plantagine per longitudinem discurrentibus: at in caulis summo, modo terna, modo bina, modo sine ordine sita sunt: extremo ramo veluti spica oblonga florum Linariæ vulgari similiorum rictu flauo, calcari vero pallide cæruleo. Hanc Linariæ latifoliæ Valentina Clusij nomine D. Doldius misit, cuius in Phitopince sub Linariæ s. meminimus. An hæc Linaria Cretica latifolia Clusij, in sua historia?

**IV. LINARIA** capillaceo folio erecta flore odorata: hæc caulibus est cubitalibus, rotundis, ramosis: folijs plurimis, capillaceis, nulloque ordine dispositis: floribus paruis ex cæruleo, alboque mixtis, cuius rictum linea flauescens distinguit, suauem & subtilem odorem spirantibus: quibus capitula Lino ferè similia, minutum semen in pericarpijs continetia succedunt. Planta perennis est, Monspefuli sponte proueniens: nonnunquam ibidem in muris reperitur: flore vario, coloribus ex albo, cæruleo & luteo mixtis.

In hortis, cultura omnibus sui partibus maior est, duos cubitos superans, & quidem duplex, alteri flo



ri flos odoratior, alteri inodorus: quæ ex radice repente & perenni mire se propagat.

V. LINARIA aruensis carulea erecta: hæc radice est exili, capillacea, cauliculis palmaribus, folijs capillaceis, sed rarioribus & breuioribus, quam in priore: floribus paruis, violaceis, lini capitalis exiguo semine refertis. Hæc in agris Lusitaniæ flore est caruleo: at Monspessuli in aruis ad montem Cetinari violaceis reperitur.

VI. LINARIÆ aureæ affinis: caule est cubitali, rotundo, lignoso, in ramulos brachiato, quorum summitatibus flores lutei, Senecionis maioris forma, & similiter in pappum abeuntes, insident: folia oblonga, angusta, Kali maioris cochleato semine, folijs & forma & modo dispositis (sed densiora) habet. In Aragoniæ locis desertis, D. Albinus collegit.

LINARIAM bellidis folio, à C. Clusio, Lobelio & alijs sub Linaria odorata, descriptam, sed non recte iconè expressam, cum calcaribus careat, figuram veram adponere visum fuit.

## DE LINO.

## CAPVT VIII.

I. LINVM frutescens subflauum: fruticosum est, caulibus cubitalibus, tenuibus, leuibus & ramosis; folijs angustis, breuibus, sine ordine dispositis: floribus in summis cauliculis multis & magnis, subflauis, quinquefolijs, totidem in medio staminibus. Hoc in Granada D. Albinus legit.

II. LINVM syluestre caruleum folio acuto: caule est pedali, rotundo, lignoso, statim ad exortum in

ramos palmares diuiso, quos folia atroviueta, basi latiore alternatim cingunt, & in exquisitissimum, & veluti aculeatum mucronem definunt: ramorum summitatibus, cauliculi multi quasi in umbella dispositi, calices aliquot apicibus donatos sustinent, quibus flores magni, carulei, quinquefolij, in medio staminibus donati, prodeunt, quibus vascula subrotunda succedunt. Hoc in saxosis Prouinciæ, non longe Massilia provenit.

III. LINVM minimum stellatum: tota plantula duarum, rarius trium vnciatum est, radícula capilli instar tenui, albicante, cauliculo vno vel altero tenuissimo, foliolis breuibus, in exquisitissimum paruumque apicem definientibus: inter quæ flosculi parui, pallide videntes, stellati, ex quinque radiolis, exiguum circulum veluti umbonem cingentibus, compositi. Hoc Monspessuli in Gramuntio & Boutonero provenit, & ab alijs lingua auis minor ab alijs Passerina minor saxatilis, dicebatur.

DE HYSSOPO, HYSSOPI FOLIA, SIVE  
Gratiola minore, & Thymo.

## CAPVT IX.

HYSSOPVS latifolius: caulibus est lignosis, rufescentibus, striatis: folijs triplo quam in vulgari latioribus, obtusis, in reliquis cum vulgato conueniens. Londino D. Cargillus misit.

2. Addidit & alium, à vulgato solum foliorum colore diuersum, qui in hoc atroviueta, in illo vero pallide luteus.

3. Sic & tertium hirsutum, cuius caules & folia molli lanugine pubescunt.



Hyssopifolia siue Gratiola minor.



**HYSSOPIFOLIA** siue **Gratiola minor**: ex radice modo crassiore, modo tenuiore, ac fibrosa albidâ, caulis exurgit cubitalis, in plures ramulos diuisus, subrotundus, rotundus, striatus, quem folia Polygoni masculæ æmulâ cingunt, pallide virentia, alternatim disposita, & pediculis carentia: ex quorû alii flores singuli, oblongis caliculis inclusi, eleganter carulei quadrifolij; hos sequuntur vasculâ oblonga, semina minuta sub fusca cõtinentia. Hæc omnis odoris expers est, & pene insipida, licet aliquin nitrosum, alij subdulcem saporem in ea notarint.

Variat folijs: altera est latioribus, quæ altius exurgit; altera angustioribus & oblongis, quæ vix palmaris, Iunio mense florent. Floribus item, nam ex Hispania habemus, quæ flores habet oblongos, firma Gratiolæ vulgaris similes, qui saturatioris coloris carulei sunt. Locis humidis & vliginosis nascitur,

quam primum in paludibus Patauinis & ad portam S. Iustinae & quidem latioribus folijs, legimus: dein circa Monspelium in riuiulis, vbi Anagallidem aquaticam vocabant: tum in Alsatia non longe Mulhusio, item locis vdis: quæ vero folijs angustioribus est, Monspeffuli, ad lucum Gramuntium prouenit. Hanc videtur notasse Cordus in obs. *Grass Polcy*. & Gesnerus libel. de coll. stirp. Gratiolæ minoris nomine. Camerarius, qui in Fræconia obseruauit, Hyssopoidem nominauit, & in Hassia, Halimum aquaticum vocari monet: in Phytopinace sub Hyssopifolia Ioh. Bauhini: & in Matthiolo emaculato sub Gratiola minore, figura addita (quâ hæcenus nullus exhibuit) proposuimus.

**THYMVM** inodorum: suffrutex est, ob læuam lanuginem, quæ pubescit, incanus, caule lignoso, cortice incano, rugoso vestito; qui in plures ramos palmo minores, recuruos, hiq; in alios & velut in orbem dispositos, diuiditur: quos per interualla folia breuissima, angustissima, plura simul iuncta, inodora & pene insipida, sed astringendi vi prædita, cingunt: cauliculorum summis flores plures purpurei, forma & dispositione Thymi vulgaris floribus similes, insident. Hoc in regno Valentia, locis arenosis in litore ad Alicanta, copiose prouenit, D. Albino referente.

## DE SERPILLO ET POLIO.

## CAPVT X.

**SERPILLVM** latifolium hirsutum: tota planta ob mollem lanuginem, quæ pubescit, præsertim caulibus, incana est: cauliculis donatur frequentibus, tenuibus, longis, recuruis: qui folijs subrotundis, pediculis oblongis, binis ex aduerso nascentibus, cinguntur: cauliculorum summis capitula flosculorum purpurascantium, vt in vulgari, insident. Hoc sæpius locis aridioribus apud nos reperitur.

**POLIVM** latifolium incanum Creticum: & hæc planta tota, tomento albo, molli, tecta est, habens caules pedales, rotundos, in ramos palmares, hosque in breuiore subdumfos, quos folia subrotunda crenata, instar Alfinæ hederulæ folio, vel Chamedrysos, crassa, rugosa, bina ex aduerso nascentia, inferne candida, superne ex viridi flauescētia, quæ masticata pene insipida (in sicca planta) & non secus ac si tomentum dentibus contereretur sensum præbent: flores non vidimus. Hoc ex Creta ab Honorio Bolli, nomine Polij latiphylli Cydoniensis, accepimus.



Ocimum latifolium maculatum.



DE PVLEGIO ET ORIGANO.

## CAPVT XI.

**P**Vlegium folijs nummulariæ: ex horto Patavino. D. Heyl ante vndecim annos attulit, huius ramum tenuem, palmarem, quasi geniculatum, quæ folia & singulis geniculis bina, tenuia, instar Nummulariæ rotunda, sed sextuplo minora, pedicellis donata, & ex aduerso sibi respondentia, cingunt, & floribus ex albo cæruleis, caulem verticillatim ambientibus, subijciuntur. Hoc odore vulgari multo est gratiore.

**O**RIGANVM syluestre humile: ex radice lignosa, rufescente, fibrosa, cauliculus communiter v-nus, rotundus, rufus & asper, vnciarum sex vel septem, exurgit: qui in summo in ramulos plures diuiduntur, hique flores, vmbellæ forma ex cæruleo purpureo que mixtos, sustinent: folia habet parua oblonga, subhirsuta, compacta & inordinate dis-

posita, potissimum cauliculi partem summam ambientia, vulgaris Origani odore. Hoc circa Aureliam Gallorum copiose reperitur.

**O**CIMVM latifolium maculatum, sub latifolio à Cæsalpino, Basilici Indici vel potius Hispanici nomine, à Camerario exhibitum: cum eius figuram hætenus apud Herbarios non viderim, non abs re fore iudicaui, si his adderetur.

## DE MENTHA ET CALAMENTHA.

## CAPVT XII.

**I.** **M**ENTHA rotundifolia minor, seu flore globoso: caule est pedali, anguloso, rufescente, hirsuto, aliquando incana lanugine cincto: quem folia ex rotunditate oblongata, mollia, hirsuta, per marginem crenata, subtus incana, superne attrourentia, bina semper sibi mutuo opposita, ambiunt: ex foliorum alis, nonnunquam ramuli prodeunt, quibus flores, veluti in capitulum globosum collecti, purpurascens insident: tota planta grauis odoris est. In scrobibus humentibus & riguis, secus fossas aquarum, reperitur.

**II.** **M**ENTHA radice geniculata: ex radice modice crassa, geniculata, fibris distincta, caulis exurgit cubitalis, quadratus, tactu aliquantum asper, quem folia oblonga, Menthae spicatae similia, pari modo disposita, mollia, nigricantia, nonnihil rugosa, in ambitu serrata, ambiunt: flores habet in spica oblonga, galericulatas, vt in Mentha Cattaria, dilute purpurascens: quibus vascula succedunt, semen rotundum, quod tritum aromatici odoris est, vt & tota planta odorata est. Hanc & Mentha rubrosæ & Nepetæ angustifoliæ odorata nomine, accepimus.





III. MENTHA Cattaria minor: caulem habet cubitalem, quadrangulum, geniculatum, in multos ramos, & hos in alios, diuisum: quos folia oblonga

Mentha Cattaria minor.



acuminata, in profundas crenas veluti lacinias diuisa, odore quam in vulgari vehementiore quidē, sed suauiore, ramulorum extremis flores pallidi, vulgaris forma insident, quibus calices exigui, semen nigrum subrotundum continentes, succedunt: quod Iunio & Iulio, in horto floruit, semine Parauio ex horto Bembiano, Nepetellæ nomine missō. Hanc à Cattaria tenuifolia Clusii, quæ folia habet angusta, leuiterq; crenata, totaq; incana est, diuersam facimus, vtriusque figuram in Theatro exhibitori.

IV. MENTHA Cattaria minor alpina: hæc caule est pedali, anguloso, rufescente & ramoso: foliis priore quadruplo minoribus, Nepetæ vulga-

ri forma respondentibus, quasi triangulis, subcænis, serratis: floribus pallidis, galericulatis, veluti in spica dispositis & prioris similibus. Hæc in montosis circa Neapolim Italiæ prouenit, vnde semen Nepetæ alpinæ nomine, ab Imperato accepimus.

CALAMENTA vulgaris flore exiguo caules habet pedales, angulosos, lanugine asperfos, & veluti geniculatos, vnde folia bina subrotunda, atroviuentia, hirsuta, sibi mutuo opposita prodeunt, ex quorum alis, maiore caulis parte, pedicelli gemini, hirsuti, efferuntur, flosculos minutos, vulgari forma similes & colore nonnihil purpurascens, sustinentes: quibus semen exiguum nigricans succedit. Hæc in Sabaudia inter monasterium & Ayme, locis accliuibus, Iulio florens, collecta.

DE MARRUBIO.

CAPVT XIII.

I. MARRUBIVM palustre hirsutum tenuius laciniatum: caulem habet cubitalem, quadrangulum, leuiter hirsutum, quem folia dura, hirsuta incana & aspera, Scabiosæ montanæ calidarum regionum modo, ad costam mediam, in plures oblongas, angustas, acuminatas, & crenatas lacinias diuisa, ambiunt: flores parui, albicantes, ex calicibus asperiusculis prodeutes, caulem verticillatim, vt in Marrubio palustri vulgari glabro, cingunt. Hoc locis humidioribus in Austria reperitur, vnde Sideritidis 2. Marthioli nomine, accepimus.

II. MARRUBIVM album villosum: cauliculos edit pedales, lignosos, rotundos, albos, villosos, in ramulos diuisos: folia sunt subrotunda, parua, crassa, per ambitum crenata, ob tomentum album inferius adpositum. Gnaphalii instar mollia superius rugosa & nigricantia: flosculi, vt in vulgari, caulem verticillatim ambiunt. Hoc in agris Lutetianis collegimus.

III. MARRUBIVM album crispum: & hoc cauliculis est lignosis, rotundis, albis, sed foliis minoribus, crispis, crenatis, vtraq; parte cinereis, ne ita tomentosis: flosculi subcandidi in pungentibus conceptaculis caulem per interualla verticillatim ambiunt. Hoc à D. Neudorffero accepimus.

DE LAMIO.

CAPVT XIV.

LAMIUM peregrinum Scutellaria dictū: radice est vtricæ simili, flauescens, obliqua & fibrosa, à qua



à qua primo vere exurgit caulis singularis, rectus, quadratus, geniculatus, hirsutus, & cubitalis, quem folia ambiunt per genicula bina, oblonga, hirsutae leui incana & mollia, profunde incisa, obscure virentia, petiolis oblongis, hirsutis, & mollibus donata: ad quorum exortum, circa caulis medium, utrinque ramuli palmares prodeunt in quorum, ut & caulis summo, folia angusta, parua, acuminata, non serrata, floribus subijciuntur: flores in oblonga spica, ut in Horminio luteo dispositi, purpurei sunt, rarius albi, oblongi, Lamij modo galericulati, erecti, longa ceruice donati, aliquando bini, aliquando et simplices, ex vno pericarpio, galeam militarem imitante, producuntur: floribus delapsis, semina quatuor rotunda, dura, verrucosa, obseruantur. Hoc in Calabria, potissimum montosis copiose provenire D. Vorstius significavit: in Campoclarensum collibus & Aequicolorum montibus syluosis, locis humentibus & saxosis D. Columna notauit. Ex horto Patauino Scutellariae nomine primo habuimus, & in Phytopinace, sub Teucrio simili Scutellaria (quia tunc summitas tamen fuerat conspecta) descripsimus: & quae vulgo in Calabria, Scutellariam dici, D. Vorstius monuerat, qui tamen ad Horminum aliquod syl. referendum putabat. At postmodum doctiss. Columna, qui medium inter Horminum & Lamium censuit, à singulari & priuata fructus, siue pericarpij forma, militaris galeae iconem exprimente, Castidam appellauit: quia huius fructus rotundi sunt & compressi, hirsutae crassa, asperginosa, viscosa & odora, manus inficiente, dum virent, obfusi: quorum pars anterior in acutum producit, fissuram habens oris specie, & desuper veluti in fronte limbum eleuatum sui proportionem magnum, elatum veluti diadema, aut crista obliqua, qua ornari videtur, ut in militum galeis.

## DE SIDERITIDE.

## CAPVT XV.

**I.** SIDERITIS folijs oblongis glabris, caules habet quadrangulos, cubitales, velut geniculatos, in quorum summitate rarissimi pili conspiciuntur: folia tenuia, pallide virentia, penitus glabra, bina semper ex aduerso nascuntur, quorum inferiora, tres vncias longa, vnam lata, minimeque serrata sunt: flores, forma quidem Sideritidis vulgarissimae floribus respondent, sed longiores & maiores, galeati & albi, è calicibus asperiusculis prodeuntes, ad foliorum exortum, ab imo fere ad summum caulem verticillatim ambiunt: quibus semen paruum, nigrum, inaequa-

le, in vasculis plantaginis, succedit. Hanc Heidelbergae Sprengerus senior, ex horto suo misit.

**II.** SIDERITIS alpine trixaginis folio: haec radice habet paruam, fibris capillatam: caulem pedalem, quadrangulum, subhirsutum, qui mox ad exortum in ramos dispergitur, huiusque in alios, in terram reclinatos, quemadmodum in Alpine trixaginis folio, quae tamem multo maior est: folia habet rata, dictae Allines forma, per ambitum serrata, sed maiora: ad foliorum exortum, flores subcaerulei, oblongi, è calicibus asperiusculis prodeunt, quibus semen paruum subrotundum succedit. Haec circa Argentinam reperitur.

## DE EUPHRASIA:

## CAPVT XVI.

**I.** EUPHRASIA lutea radice squamata: radice est velut bulbosa, alba, ex quatuor crassiusculis squamis coagmentata, caule pedali, aliquando palmari, laui, cauo, & ramofo, ramulis ex alarum cauis prodeuntibus: quae folia bina, petiolis carentia, basi sua situm aduerso cingunt, Alpine trixaginis folijs forma similia, sed acutiora, flores lutei, Euphrasiae floribus respondentes: quibus succedit semen nigrum, rotundum, in apicem exiguum desinens, quod geminum paruo petiolo insidet. Haec montosis asperis & humidis gaudet: hancque primum anno 1606. ex Bienensium Helueticorum alpibus habuimus: dein, non longe ab Einsidlen: tum, ex Pyrenaeis: tandem D. Burserus ex superiore Austria, ex Blankenstein prope oppidum Hallstadt natam, transmisit.

**II.** EUPHRASIA purpurea minor: radicem habet lignosam, paruam, nigricantem, in tenues fibras diuisam: caulem palmarem (altiores non vidimus sed minorem duarum triumve vnciarum) quadratum, rubentem, leuiter hirsutum, aliquando simplicem, aliquando statim ad exortum in duos, rarius plures, paruos ramulos diuisum, quem folia pauca, crassa, hirsuta, rotunda fere & bina, in crenas profundas, inferiora quidem quae minora, in ternas, superiora v. in quinas senasve diuisa, sua basi cingunt: flores è foliorum sinu, aliquando à medio caule, aliquando tanquam ex spica comaue, ex vtriculis, velut oblongo calice, prodeunt bini, galericulati, purpurascens (candidos aliqui notarunt) quibus semen oblongum, angulosum, candicans, in vtriculis succedit. Haec in pratis collium Italiae frequens est, ita ut quibusdam locis, tapetem purpureum humum ornare videatur: haec in via Romana, etiam Romae in monte Testaceo provenit: passim etiam in Castilia, maxime circa Escorial, reperitur. Amara est, & mone-



nente doctissimo Columna à pharmacopæis pro Euphrasia altera Matthioli usurpatur. Hanc cum primum collegissemus, Brunellam Italicam nominauimus, hocque nomine ante viginti quatuor annos in Phytopinace descripsimus: Vlysses Aldroandus, Euphrasie speciem, ostendenti nominauit: & Columna, Eufragium tertiam siue mediam vocat.

## DE MELAMPYRO.

## CAPVT XVII.

Scrophularia flore luteo.



**M**ELAMPYRVM luteum linariæ folio: radice est candida, fibrosa, caule pedali, rotundo, attrorubente, in ramos plures palmo minores, matremq; superantes, non tamen æquali & contrario situ positos, diuiso: folia sunt oblonga, linariæ fo-

lijs angustiora, ex quorum sinu folia alia breuiora & angustiora prodeunt: in caulis summo, spica oblonga, ex pinnatis cristatise & ob crenas exasperatis ac subrotundis folijs composita, vnde flores pallide lutei, oblongi, concaui, hiantes, antrorsum exporrecti, prodeunt: semen in filiquis foliaceis oblongum, nigricans continetur. In syluis nostris montosis, & in Muteto monte, Maio Iunioq; florens reperitur. Linopyron forte dici posset.

## DE SCROPHULARIA.

## CAPVT XVIII.

**I.** SCROPHULARIA flore luteo: ex radice crassa, nigra, fibrosa scrophulis carente, caules plures exurgunt cubitales & sesquicubitales, quadranguli, subrubentes, leuiter hirsuti, mollive lanugine pubescentes & cani: folia habet ad radicem per terram sparsa, uncias quinq; vel sex longa, similiterque lata, subrotunda, ob pilos breuissimos asperos, mollia, longissimis pediculis donata, & profunde crenata: at quæ caulem cingunt minora sunt, binis semper ex opposito respondentibus: ex foliorum sinibus, ab imo fere ad summum, vtrinque prodit pediculus vnus, uncias tres longus, læuis & nudus, qui in alios breuiore subdiuiditur, vno alterove breui folio diuisioni subiecto: his, quasi corymbi plures insidēt, ex quibus singulis flos orbiculatus, luteus, in breues lacinias diuisus, vna cum staminibus aliquot oblongis prodit: capicula subrotunda, Scrophulariæ vulgaris maiora acuminata succedunt. quorum acumini filamentum capreoli instar insidet, & hic semina minura nigra includuntur; Maio & Iunio floruit, semen Autumno maturuit. Hanc à D. Doldio primum accepimus, & velut indictam censentes, breuiter in Phytopinace, & Matthiolo, figura addita, descripsimus: nunc vero plenius, cum eam annis aliquot in horto coluerimus: quam postmodum doctiss. Columna Scrophulariæ montanæ maxime nomine descripsit & in valle Campoclarensum atq; etiam supra Matefium vmbrosis Septentrionalibus niuosis inuenit, & à C. Clusio in Pannonicis, pro Lamio Pannonico descriptum censet: sane, notæ aliquot à Clusio Lamio suo Pannonico 2. exotico tributæ, nostræ cōueniunt: non desunt tamen, quæ in nostra obseruare non est (vt nec figura cum nostra conuenit)

nisi



## LIBER SEXTVS.

113

nisi forte cultura, varietatem hanc causerit, quamvis & ipse solum in horto obseruauit.

II. SCROPHULARIA foliis laciniatis: hæc caule est crasso, striato, subrubente, & læui: foliis atroviuentibus, læuibus, tenuibus, longis pediculis donatis, inferioribus palmaribus, instar foliorum Raphani, in lacinas quinque oblongas crenatas diuisis, ex quorum sinibus folia minora, etiam laciniata prodeunt: at folia in caulis summitate non vidimus: flore est magno, elegantissimo, croceo inferiore parte galere, intrinsecus rubro: plura non licet, quia solum ramum, nomine Scrophulariæ Hispanicæ non scriptæ, à D. Gillenio Castellis accepimus: An forte Scrophularia Indica, cuius capitula quadruplo maiore esse, quam in vulgari, in Phytopinace monuimus.

### DE PSEVDOSTACHYDE.

#### CAPVT XIX.

I. PSEVDOSTACHYS Cretica: è radice lignosa, caules quadrati, cubitales, tomento albo vestiti exeunt: folia cinericea, molliter hirsuta, oblonga, quæ ad radicem vna cum pediculo oblongo palmarum superant, latitudine vnciam non æquantia, pene inodora, vel saltem odore alii suauiore: at quæ floribus subiiciuntur & caulem ambiunt, breuia sunt & angusta, pediculis carentia, è singulis articulis bina sibi mutuo opposita, duriuscula: flores purpurei, ex verticillis aculeatis caulem cingentibus, prodeunt: semen rotundum est & nigricans. Hæc pro Marrubio Cretico sata fuit.

II. PSEVDOSTACHYS alpina: à radice dura, rufescente, in fibras crassas & longas diuisa, folia plura, hirsuta prodeunt, Hormino similia, sed tenuiora, vncias tres lata, quatuor longa, longis pediculis, molli lanugine albicantibus, donata, per ambitum crenata, non nihil odorem grauem spirantia, inter quæ caules sesquicubitales, quadranguli, camulati, geniculis distincti & hirsuti, efferuntur, qui foliis rugosis, asperis, prioribus longioribus circumdantur: ad quorum exortum, sæpe utrinque ramulus vnus semipalmaris, etiam palmaris egreditur: flores circa summa genicula verticillati, galericulati, ex albo rubentes, ex vtriculis asperiusculis, in quibus semen rotundum nigrum continetur, prodeunt. Hanc Iulio mense florentem in altissimo monte Wasserfall dicto, aliquoties obseruauimus.

Eandem, cubitos duos superantem, foliis multo maioribus, minime graui odore molestam (quæ cultura adscribimus) Marrubii nomine, ex horto Friderici Meyeri Argentina accepimus.

### DE SALVIA.

#### CAPVT XX.

I. SALVIA folio serrato: hæc à vulgari foliis potissimum differt, quæ in hac latiora, rotundiora, tenuiora, manifestis per marginem serris donata, & suauiori odore prædita: quædam etiam vncias quatuor longa, tres vero lata: in reliquis cum vulgari conuenit: hanc D. Cargillus ex Anglia misit.

II. SALVIA folio subrotundo: hæc caule est etiam quadrato, villosa, foliis rotundis, ad Violariæ, vel Aristolochiæ rotundæ folia accedentibus, at in acumen finientibus, scabris, vulgari magis candidantibus, & tenuibus: quam Schmalcaldio à pharmacopæo accepimus.

III. SALVIA lanuginosa angustifolia: caule est rotundo, crasso, lignoso, ob candidam lanuginem, molli, cubitali, ramoso: foliis candidis, angustis, breuib, semunciam latis, duas longis, densis & scabris, odore Tanacetii: floribus in caulis summo quasi in spica, Lamii floribus similibus, purpurascens, è quorum medio stamina oblonga effertur: hanc D. Neudorfferus communicauit.

### DE SCORODOTI.

#### CAPVT XXI.

SCORODOTIS Cretica: radicem habet magnam sperennem, caulem quadrangulum, striatum, villosum: folia per terram in orbem sparsa, alba sunt, tomentosa, subrotunda, rugosa, crassa, Mentastro similia, per ambitum serrata: flores verticillati, pallidi, Stachydis forma, quibus vascula, semen nigrum, rotundum, includentia, succedunt. Hanc ab Honorio Belli ex Creta, vna cum seminibus Scorodonie Creticæ nomine accepimus, & sub Stachyde Cretica in Phytopinace descripsimus: sed cum in horto ex semine enatam diligentius perpendissemus, & in virente, vtrius Scordio, Allii odorem notassemus, ad Scordotim Plinii accedere censuimus: cuius nomine in Creta, apud quos

P



quos ubiq; inter saxa, secus vias, & ad agrorum margines prouenit, Sepalsiatij pro Scordio promiscue vtuntur, monente Bello, & Pona in suo Baldo referente.

## DE HORMINO.

## CAPVT XXII.

Horminum Syriacum.



**H**ORMINVM Syriacum: planta est Sclearæ forma, caulibus cubitū superantibus, quadrangulis, leuissime hirsutis, in alas diuisis: folijs inferioribus palmum longis, latis, subasperis, sinuosis, superioribus angustis, oblongis lauioribus: flores albi sunt, galericulati, florum Sclearæ forma: semē vasculis inclusum, paruum est & compressum, rubris costis donatum, cinereum, nigris lineis sine ordine conspersum, quod sub lingua vt Ocymi semen lentescit, & in odorem est. At planta, quæ facile ex semine nascitur, cum flores producit, odore quam Colus Iouis gratiore est, & Ocymum non-

nihil æmulatur. Huius semen Bisfamar nomine D. Bernhardus Paludanus, cum Patavium ex Syria anno 1578. rediisset, communicauit. Bisfennas Camerarius in suo horto nominauit: at sunt qui Aman quoq; vocitent.

**II.** HORMINVM angustifolium laciniatum: caule est quadrato, pedali, hirsuto, rarius ramoso: folijs paucis, nonnihil hirsutis, pollicem latis, vncias tres longis, aliquando sinuosis, aliquando, potissimum inferioribus, in profundas lacinias diuisis: floribus albis, paruis, verticillatim caulem ambiētib; spicam oblongam & inflexam efformantibus, quibus decedentibus semen nigrum succedit. Hoc Montepessuli, folijs Scolopendriæ modo diuisis, legimus: at Helmstadio, Hermini Cretici albi nomine, D. Sigfridus misit.

**III.** HORMINVM minus album Betonicæ facie: ex radice lignosa, fibrosa, nigricante, cauliculus vnus, aliquando geminus, palmo minor, rotundus, villosus oritur: folijs est paucis, ad radicem rotundis, crassis, lanuginosis, crenatis & longis pediculis donatis: in caulis medio bina, Betonicæ folijs æmula, sed crassiora & breuiora, basi caulem ambiētia, & capitulo duo minima subijciuntur: flores sunt albi, Betonicæ forma velut in spica congesti: In montibus Pyrenæis Hispaniam versus, D. Burserus legit.

## DE VERBASCO.

## CAPVT XXIII.

**V**ERBASCVM folijs rotundis flore blattariæ: caulibus est cubitalibus, viridibus, rotundis, striatis, leuiter villosis, nec ramosis: folijs inferioribus oblongis, reliquis omnibus subrotundis, paruis, caulem basi sua alternatim amplexantibus, inferne incanis, superne nigricantibus, ad quorum fere singulorum exortum, duo minora adijciuntur, ex quorum sinu pediculi, vnus, duo, tres, rarius quatuor, prodeant, quibus singulis, flos vnus, luteus, paruus, ex quinque folijs compositus insidet, cuius medio, stamina aliquot purpurea, quasi ex caliculo, vt in Blattaria, emergentia insident: huic vasculum, semen minutum, rotundum continens succedit. Hoc in horto Ioh. Haintzmanni.

Pharmacopæi nostri de fundi creuit.



## DE ÆTHIOPIDE.

## CAPVT XXIV.

**Æ**THIOPIDE laciniato folio: hæc folijs est pedem longis, vncias quinque vel sex latis, in acum. n. desinentibus, mollibus, alba lanugine pubescentibus, in multas lacinias profundas, acutas, easque crenatas diuisis, per terram sparsis: caule quadrangulo, lanuginoso, in ramulos distributo: quem folia parua basi sua complectuntur: flores candidi, per interualla ordine digesti, Lamij floribus forma & magnitudine similes: semen rotundum, nigrum, geminum, in pericarpio continetur: ante plures annos in horto coluimus.

## DE SANICVLA MONTANA.

## CAPVT XXV.

**S**ANICVLA montana minor: radice est crassiuscula, multis fibris capillaribus donata, & a lateribus propagines agente, folijs per terram sparsis ex rotunditate oblongis per ambitum incisis, aliquantum hirsutis: inter quæ cauliculi (sæpius vnus) semipalmares, etiam minores, rarius altiores, nullis, vel certe paucis pilis cincti, in summitate in exiguos ramulos diuisi: singulis ramis flosculi albi, quinque folij, punctati, staminibus in medio insident: quibus capitulum, exiguu nigroque semine plenum, succedit. Variat: nam vel folia magna, subrotunda, vel parua & oblonga existunt: in Hel-

uetiorum alpiibus prouenit. An apud Clusium, Sanicula montanæ alterius speciei secunda?

**S**ANICVLA alpina minimapilosa: plantula est diuagum circiter vnciarum, radiculam habens exiguum, ramulos vnciales per terram sparsos, foliola breuia, angusta, incana, nonnihil pilosa, plura, stellæ in modum disposita: flosculi sunt oblongi, lutei, pro ratione plantæ magni, qui singuli singulis pedicellis, minutissimis, è fimbriato obtusiore calice prodeuntes, insident. Hæc in summitate Ventosi montis & Pyrenæis reperitur.

## DE DIGITALI.

## CAPVT XXVI.

**D**IGITALIS angustifolia luteo paruo flore: huic folia sunt angusta, vnciam lata, binas ternasve longa, vtraque parte virore splendentia: caulem habet simplicem, cubitalem, rectum, rotundum, lauem, à medio sursum versus floribus compluribus ornatum, qui ab vna caulis parte supra se inuicem dispositi, deorsum pendent, lutei, oblongi, concavi, forma Campanulam, vel Dactyliothecā, referentes, ore diuiso, per margines hirsuto, staminibus intus luteis: quos vascula rotunda, in pilum desinentia, semen exiguum continentia, succedunt: hæc in monte Baldo prouenit, & an ad Ephemerum Dioscoridis referri possit, considerandum.



# LIBER SEPTIMVS.

## DE LYSIMACHIA.

## CAPVT II.

**L**YSIMACHIA hirsuta filiquosa paruo flore: hæc duplex est, maior & minor. Maior caule est bicubitali, rotundo, hirsuto, concauo, in ramos brachiato: folijs oblongis, angustis, leuiter crenatis, hirsutis, lanugine incanis & mollibus: in summis virgis, filiquæ, strictissimæ & longæ, quarum extremitatibus flores purpurei, parui & quadrifolij insident: at in ipsis filiquis, semina exigua, subrufa, candida, lanugine implicita, continentur. Apud nos in arenosis ad Wiesam, æstate floret.

II. Minor, ex radice tenui, fibrosa, caulem vnum vel alterum, pedalem, lanuginosum protrudit, foliaq; caulis, foliorum & filiquarum breuitate, à priore differt: quam & in Italia legimus.

III. LYSIMACHIA Chamænerion dicta alpina: ex radice fibrosa, cauliculi rotundi, superne albicantes, palmares, nonnunquam pedales exurgunt, folijs duplicibus cincti: alijs Rorisinarini forma, sed breuioribus & angustioribus, nullo ordine dispositis: alijs breuissimis, ijsque vel prædictis interiectis, vel ex eorum sinu prodeuntibus: cauliculorum summis, flores, longis pedicellis subcæreleis, vel candicantibus insident, elegantes, purpureocærelei, vel albo cærelei, quadrifolij, satis magni, quibus foliola quatuor breuia & viridia, subiiciuntur, & ex eorum medio stamina aliquot exurgunt: filiquæ longæ, angustæ, semen minutum cum lanugine continentes, succedunt. In alpinis Heluetiorum prouenit.

## DE VERONICA.

## CAPVT II.

**V**ERONICA alpina bellidis folio hirsuta: radice est per terram transuersim repente; fibris

oblongis nigricantibus donata: cauliculo semipalmari, vel paulo altiore, tenui, hirsuto, duro, flexili, reclinato: cuius folia ad radicem plura, Bellidis cæreleæ folijs forma respondent, parua, subrotunda, attrourentia, hirsuta & crassa, in cauliculo paucis, binis ex opposito sitis: cauliculorum summitatibus flosculi aliquot cærelei, quasi in umbella, ex paruis hirsutis caliculis prodeuntes, quaternis, quinise foliolis & staminulis binis cum stylo compositi, insident: semen vero in vasculis breuibus compressis, ex medio veluti umbone stylo prodeunte, continetur: Hanc in Heluetiorum alpinis reperimus.

Eandem, sed minorem, sine nomine, F. Greg. de Regio Capuccinus, ex montibus Tyrolensibus, vt & D. Burserus maiorem, ex Pyrenæis, misit.

## DE TEVCRIO.

## CAPVT III.

**T**EVCRIVM alpinum in odorum magno flore: radice alba, oblonga & capillacea, per terræ superficiem repit: cauliculos aliquot habet, lignosos, rufescentes, hirsutos, nonnunquam in alas diuisos, semipalmares & in terram reclinatos, folijs subrotundis, paruis; quorum maximum, ne minimi digiti vnguem adæquat, hirsutis: rugosis, & crenatis; folijs saluæ syluestris superioribus formæ respondentibus, cinctos: in cauliculorum summitatibus, flores quasi in spicam congesti, qui magni, purpureo cærelei, galericulati: semen non vidimus. Ex monte maiore S. Bernhardi, & Augusta valle Heluetiorum, D. Burserus attulit.

DE



## Chamædrys spinosa.



DE CHAMÆDRY.

## CAPVT. IV.

**I.** CHAMÆDRYS spinosa: planta est palmaris & scilicet palmaris, rarissime cubitalis; molli lanugine incana & hirsuta: cauliculis quadratis, geniculatis, virgultis hinc inde sparsis: folijs oblongis, subrotundis, aliquibus laciniatis, at plerisque leuiter serratis, summis tamen integris: flores ex caliculis lanuginosis, Chamædryos forma, ex flauo rufescentes, ex foliorum alis prodeunt, unde & aculei bini, aliquando plures, modo breuiores, modo longiores, exurgunt: aliquando ex geniculis vnum virgultum prodit, cuius summitati spina subtilissima insidet: semen rotundum, subnigrum, caliculis inclusum, floribus succedit. Parauio ex horto Bem-

biano accepimus, in Phytopinace & Matthiolo descriptimus.

**II.** CHAMÆDRYS Austriaca folijs tenuissime laciniatis: caule est lignoso, rotundo, hispido, pedali, in ramos brachiato, folijs nonnihil pilosis & rigidiusculis, in angustas lacinias diuisis: floribus subcæruleis, in spica oblonga dispositis, quos capitula subrotunda, bifida, seminum minutissimorum conceptacula, sequuntur. Ex Austria D. Agerius attulit.

**III.** CHAMÆDRYS Hispanica, folijs tenuissime diuisis: hæc caule est priore multo teneriore, rotundo, leuiter piloso, geniculis pluribus distincto: folijs breuioribus angustiusque diuisis, & ad singula cauliculi genicula, iunctis, at cauliculus in tenuissimum & paruorum foliorum quasi cespitem assumitur, & ad summum geniculum, in duos pedicellos triunciales, folijs nudos, diuiditur: quibus flosculi parui, stylo oblongo donati, insident: plura non licet ex Hispania D. Albinus attulit.

**IV.** CHAMÆDRYS alpina minima hirsuta: ex radice capillacea, ramulus tenuissimus (modo bini ternive) duarum triumve ad summum vnciarum, prodit: foliola ad radicem exigua, subrotunda, hirsuta, crenata & crassiuscula, in ramulis nulla, qui in pedicellos absumuntur, hiq; singuli flosculum cæruleum sustinent: ex cuius medio stylus muscæ proboscidi fere similis, prominere: vascula exigua plana & compressa, vt in Chamædry sylvestri, floribus succedunt. In iugis alpium Helueticarum & Tyrolensium, vt & Baldi summitatibus reperitur.

**V.** CHAMÆDRYS spuria minor angustifolia: hæc radice est nigricante, lignosa & fibrosa: ramulis plurimis in terram reflexis, palmaribus, rotundis, rufescentibus, nonnihil pilosis, rigidis, duris, & in ramulos plures subdivisis: folijs ad radicem nonnquam oblongis, latiusculis, obtusis minime crenatis: reliquis vero ad cauliculos, breuib; angustis, crenatis & in apicem desinentibus: flores habet copiosos, in spica oblonga dispositos, modo pallide cæruleos, modo carneos, quadrifolios, staminulis & stylo donatos: quibus vt sylvestri, semen minutum in paruis thecis succedit. Æstate floret in agris nostris siccioribus & incultis, copiose

circa Balneum Bruglingen  
occurrit.



## DE ALSINE.

## CAPVT V.

**II.** ALSINE palustris minor serpillifolia: radiculā habet parua, capillarem, cauliculum nodosum reflexum: à quo fibræ exiguæ vt in Serpillo prodeūtes, terre figuntur: hic in cauliculos plures, oblongos, repentes, diuisus, folijs Serpilli forma, sed multo minoribus, & quidem binis contrario situ vestiuntur: foliorum alis parui flosculi insidēt, quibus vasculum vtrinq; vnum, eo quo in Glaucemodo, semen minutum continens, succedit. Hæc locis palustribus prouenit.

**II.** ALSINE palustris minor folio oblongo: & hec radice est tenui, oblonga, capillaceis fibris prædita, cauliculis frequentibus, tenuibus, humifusis, & subinde ad internodia fibris sese firmantibus: folijs oblongis, angustis, pallidis, binis ex aduerso nascētib; flosculis paruis, racemi modo iunctis & tenuissimis pedicellis insidentibus, quibus semē minutum succedit. Hanc Portulacæ aquaticæ nomine D. Sigfridus Helmstadio misit.

**III.** ALSINE alpina glabra: ex radice albida, oblonga, fibris capillata, cauliculi plures, itq; palmares, tenues, laeues, rotundi & geniculati, in ramulos aliquot, hique in alios diuisi, prodeunt: qui folijs pallide virentibus, Lini forma, sed breuioribus & acutis, binis ex aduerso sitis, cinguntur: flores plures albi, staminibus aliquot donati, pedicellis insidentes, ex caliculis prodeunt, capitulis minuto semine refertis, succedentibus. Hæc locis saxosis humidis gaudet, q̄ copiose circa balneū Sultzbergense in Marchionatu superiore obseruauimus: verum ex Rhetorum alpinis monte Spliegel, radice lignosiore, totaq; planta omnibus partibus minore & semipalmari, habemus.

**IV.** ALSINE alpina iunceo folio: planta est ad palmi altitudinem accedens, cuius cauliculus statim à radice in duos, hique in alios ramulos breuiorē diuiduntur, inter quos vnus vel alter semipalmaris, exurgit, in summitate florum vnū sustinens, velis vno alterove pediculo donatur, & cuilibet vnus, itq; albus, quinquefolius, satis magnus, ex calice prodiens, insidet: folijs est capillaceis, viridib; rigidis & inordinate dispositis. Hæc Iulio florens, in Helueticis & Geneuensium montibus reperitur.

**V.** ALSINE minor Androsaces alterius Matthioli facie: radiculam habet oblongam, tenuem, rufescentem, circa quam foliola multa per terram sparsa, parua, oblonga, oris crenatis, inter quæ cauliculi plures, nudi, nonnihil pilosi, inæquales, duas, tres, etiam quatuor vncias alti, summo fastigio quasi umbella, ex octo, decem, duodecim pedicellis composita, insidet: quorum singuli flosculum paruum album ex pericarpio prodeuntem, sustinent. In arenosis prouenit, prope pagum Marfersen quarto ab vrbe Herbipoli miliar, D. Burserus, collegit.

**VI.** ALSINE verna Androsaces capitulis: plantula est subhirsuta vnciarum trium, ad cuius radiculam simplicem & breuem, foliola Bursa pastoris minimæ loculo oblongo, dictæ, similima, orbiculatim per terram sparsa sunt: ramulos habet tenuissimos, biunciales, nudos, reflexos, circa quorū medium quasi corolla quinque, minutissimorum foliolorū, vnde pedicelli quaterni, aut plures emergunt, & singuli caliculum exiguum, quinque, apicibus donatum, & cuius medistulio flosculus paruis albus emergit: hæc planities Northusana alumna, D. Furero monente.

**VII.** ALSINE alpina minima glabra: plantula est flosculis elegantissimis placens, ex cuius radice rufescente, in fibras oblongas abeunte cauliculi plures in terram reclinati, foliolis multis prioribus similibus, sed glabris vestiti, prodeunt, ex quibus pedicelli vnciales, rarius triunciales, nudi efferuntur, qui in summo in duos, tres, & plures petiolos diuiduntur, & singuli flosculum elegantem, stellatum, quadrifolium, punctulis insignitum, album vel etiam purpurascentem, ex caliculo emergentem, sustinent. In Helueticorum montib; vt monte Fracto & ad Thermas Fabarias, æstate florens, reperitur.

**VIII.** ALSINE nodosa Germanica: ad radicem fibrosam, albam, folia plura, oblongiuscula; pilo tenuiora & viridia, aliquando velut cespitem constituentia: cauliculi tenuissimi sunt, glabri, modo erecti, modo reclinati: aliquando palmares, nonnunquam vix duarum, triumve vnciarum, geniculati, vel nodosi: ad quemlibet nodum, foliola exigua, vnde & ramuli prodeunt, in quorum summitatibus flosculi plures, albi, quinquefolij, ab alijs quinquefolijs viridibus sustentati, singuli singulis pedicellis insident. Hæc cum in arenosis proueniat, ab aliquibus Arenaria vocatur, quo nomine etiam ex Scotia, D. Cargillus: ex Lusatia, sine nomine, D. Francus misit.

IX. AL-



**IX. ALSINE** Spergule facie, siue Spergula minor subcæreolo flosculo: radice nititur oblonga, simplici, parum capillata & albicante: cauliculis est multis, vncias tres quatuorve longis, in terram reflexis, geniculatis: geniculis singulis, bina foliola breuia, incana, lata basi vndiq; cingentia, adponuntur: ex quorum sinu folia alia oblonga, angusta, viridia, incerto numero prodeunt, vt & pedicelli, quibus singulis, singuli flores subcæreoli, vel purpureo cæreoli, aliquando striati, insident: quibus, vt in Spergula, vascula orbiculata minutum semen continentia, succedunt. Apud nos ad semitas reperitur, maxime inter nouam domum & arcem Ortingen.

## DE ANAGALLIDE.

## CAPVT VI.

**ANAGALLIS** aquatica angustifolia scutellata: radicem habet rufam, per terram repentem & fibrosam: caules cubitales, striatos, læues, geniculatos: folia ad singula genicula semper bina, pediculis carentia, sicut aduerso sita, angustissima, acuminata, duas tresve vncias lata: ex foliorum pene omnium sinu, pediculi prodeunt palmares, etiam breuiore, sursum spectantes & capreolorum modo se intorquentes, quibus vtrinq; pedicelli, alij absq; ordine adpositi, qui flosculos paruos Alsine formæ trifolios ex albo purpurascens sustinent: his thecæ siue scutellæ geminæ, ex quarum medio filamentum prodit, semen continentes, succedunt. In locis paludosis & fossilibus Heluetiæ, Lusatiæ: sic circa Francofurtum ad Oderam, Viennam quoq; reperitur.

## DE ECHIO.

## CAPVT VII.

**ECHIVM** Hispanicum flore calcarum donato: radicem habet lignosam, fibrosam, cortice ad-

rufum vergente tectam, à qua cauliculi plures, alij palmares, alij breuiore, rotundi, nonnihil villosi humum versus reclinati prodeunt, qui folijs rariore, breuib; Veronicæ alpinæ similib; crassiusculis & asperiusculis cinguntur: flores in cauliculorum summis cæreoli, oblongi, caui, calcare vt Linaria donati ex hirsuto breuiq; calice prodeutes, ex vno folio compoliti, at in summitate in lacinias quaternas diuisi, quibus delapsis in conceptaculis semen oblongiusculum, durum, rugosum, vt in Echio vulgari, succedit. Hoc in Granadæ montibus, D. Albinus collegit.

**II. ECHIVM** Scorpioides minus flosculis luteis: hoc cauliculis est tenuibus, reflexis, hirsutis & semipalmaribus, folijs paucis & quidem inferioribus oblongis, longoq; pediculo donatis, pilosis: cauliculorum fastigia, vna cum florum rudimentis, caudæ scorpionum instar recuruantur, hisq; sensim sese explicantibus flosculi exigui, lutei, aureive, quinquefolij, sese offerunt. Montspeli in muris humidis horti Dei, D. Burserus legit.

## DE CYNOGLOSSO.

## CAPVT VIII.

**CYNOGLOSSVM** semperuirens: caulem habet inæqualem, striatum, leui hirsutie asperum, cauum, cubitoq; altiore: folia, quæ non incana, sed semper atroviuentia, acuminata, palmu longa, vnciâ vel sesquiunciam lata, parte superna læuia, inferiore aspera, neruo satis crasso, per longitudinē æqualiter de lato, basi caulem ambiunt: & ex eorum alis, rami palmares, et longiores exurgunt, quorum summum fastigium Heliotropii maioris instar reflectitur & sustinet flores, forma vulgaris similes, sed minores & rubentes, staminulis donatos: quibus lappulæ vulgaris similes, semen, ex quo deciduo se propagat, continentes, succedunt. Tota planta canitie siue albedine & odore graui (quæ in vulgari) destituitur: Aprili & Maio floret: in montibus vmbrosis Allatiæ Lotharingiam versus, vt circa Rapperswilam & circa Masmunster frater p.m. Ioh. Bauhinus reperit, in hortum Montembelgardiacum ante annos 26. transtulit.

arthioli  
rusef-  
m spar-  
aulicu-  
as, tres,  
o quasi  
illis cō-  
aruum  
r. In a-  
quarto  
egit.  
plan-  
is radi-  
e pasto-  
a, orbi-  
bette-  
quorū  
um fo-  
s emer-  
apicib.  
ius al-  
ana, D.

tula est  
lice ru-  
ali plu-  
bus si-  
pus pe-  
untur,  
s diui-  
latum,  
vel et-  
em, su-  
Fracto  
eritur.  
dicem  
lapilo-  
n con-  
modo  
, non-  
enicu-  
la exi-  
mimi-  
b alijs  
singulis  
s pro-  
nomi-  
i, sine  
X. Al-



*Consolidamedia alpina.**Bellis alpina maior rigido folio.*

DE CONSOLIDA MEDIA.

## CAPVT X.

**C**ONSOLIDA media alpina: radice est fibrosa, caule pedali, quadrato, striato, leuiter hirsuto, inani: foliis paucis, oblongis, longoque pediculo donatis, angustis, crassis, asperis, per ambitum crenatis, binis caulem ambientibus, & ex aduerso respondentibus: flores cærulei veluti in spica, caulis summo insident: in Baldo monte Italiae reperitur.



DE BELLIDE.

## CAPVT XI.

**I.** BELLIS alpina maior rigido folio: ex radice nigra, repente, ab vna parte fibras spargente, & lignosa, caulis rotundus, striatus, cubito altior exurgit, circa quem folia pediculis carentia, quinque vel sex vncias longa, vix vnciam lata, rigida, partim obtusa, partim ex rotunditate acuminata, per circumferentiam profunde crenata; nulloq; ordine disposita; in caulis summo flos vnicus, Bellidis vulgaris maioris flore maior, medio luteus, folijs albis discum cingentibus, cui semen oblongum vt in vulgari, succedit: in monte Baldo provenit.

**II.** BELLIS alpina minor: ex radice cauliculus vnus, vel alter, lauis, semipalmaris incuruus prodit, quem cingunt folia rigidiuscula, angusta, breuia, per



*Bellis montana maior folio acuto.*



per ambitum profundis & asperiusculis crenis donata: cauliculo summo, flos vnicus, magnus, disco luteo, aliquando purpurascens, folijs albis multis cincto, insidet. In alpidibus Heluetiorum prouenit, vt in Valesia supra Gemme, & supra Thermae Fabarias: aliquando tota plantula, vix vncias duas, superat.

III. *BELLIS montana maior folio acuto*: hæc cauliculo est Bellide prima breuiore, folijs breuioribus, duplo triplove angustioribus, leuius crenatis nec rigidis, in acumen exquisitum desinentibus flore primæ simili, sed minore: in montibus Euganeis collecta.

IV. *BELLIS montana folio obtuso crenato*, radicem habet lignosam, fibrosam, caulem vnum, tenuem læuem & pedalem, folia angusta, longissimis pediculis donata, per marginem crenata, obtusa, in tres apices desinentia: in caulis summo flos


vnicus, paruus, disco luteo & foliolis albis eum cingentibus: Monspeffuli versus Vigan.

V. *Bellis maritima folijs Agerati*: plantula est palmo minor, ad cuius radicem paruum, albam, cauliculus pilis leuissimis aspersus, in binos ternosve tenuissimos ramulos diuiditur, quorum vnus sex, alij tres vncias non excedunt, ad quorum partem inferiorem pauca & parua foliola, Agerati foliorum instar, per margines crenata, superiore & maiore cauliculorum parte folijs carente; singulis vnicum florem, qui paruus, disco viridi, foliolis albis vltra viginti cincto, sustinentibus. Hæc copiose in insulis Stechadibus in arenosis prouenit, vnde D. Burserus attulit.

*BELLIS spinosa duplex est*: alia folio Agerati, q̄ Lobelius in parte secunda aduersariorum descripsit: alia forma Bellidis cæruleæ, cuius descriptionem subijciemus.

VI. *BELLIS spinosa flore globo*: hæc tota fere facie Bellidem cæruleam, Globulariam dictam refert, cuius ad radicem folia plura sunt, parua, rigida, crenata, & cuilibet crenæ aculeus insidet: cauliculo est palmari atrouirente, quem folia oblonga, angusta, non crenata, sed in aculeum abeuntia, inordinate basi sua vestiunt, cuius summitati capitulum rotundum, cæruleum, Globulariæ capitulo maius, multis flosculis vt in succisa hirsutum: hanc copiose, pluribus simul cespitem constituentibus, in Granadæ montibus, D. Albinus obseruauit.

VII. *BELLIS hortensis pediculo foliato*: hæc à communi hortensi in eo tantum differt, quod pediculus, qui leuiter hirsutus, foliolis oblongis, subrotundis, duobus, aut tribus longe distantibus, cingatur, & flori folia quina subijciantur: in hortis reperitur.





Gnaphalium roseum.

Gnaphalium roseum hortense.




## DE GNAPHALIO.

## CAPVT XII.

I. GNAPHALIUM roseum: plantula est exigua, tomentosa, incana, vix vnciam superans: radícula simplici, capillacea, rufescente, cauliculo semunciali, paruis tomentosis & conglobatis folijs donato, flosculo roseo, disco flauesciente. Monspeffuli ad pedem montis Cerij & Massiliae in saxosis reperitur.



II. GNAPHALIUM roseum hortense: ex semine minuto, in horto prouenit planta tota incana, tomento molli, radice tenui, capillacea, quatuor vnciarum, ex qua aliquando plures, quandoque pauciores ramuli triunciales, reclinati, folijs subrotundis cincti, quorum summitatibus flos roseo modo expansus, disco luteo, etiam aureo, foliolis vt in ramulis vndique sustentatus, eleganti spectaculo insidet.



DE



Helichryson Orientale.



DE HELICHRYSO.

## CAPVT XIII.

**H**ELICHRYSON Orientale: caule est rotundo, lanuginoso, pedali, folijs oblongis, angustis, lanuginosis & ob tomentum crassis & incanis, ijsque ad radicem oblongam, nigricante cortice tectam, pluribus: caulis in summo in plures pediculos vnciales, incanos diuiditur: quibus singulis flos rotundus, rarius oblongus, quali ex plurimis squamis compositus, quintuplo quam in vulgari, quæ Stachas citrina dicitur, maior, flauus & splendens. An hæc Chrysocome Dioscoridis l. 4. c. 35. & Plin. lib. 21. c. 5. Chrysites, nostro enim corymbi auri fulgore splendent: quod Comæ aureæ primum, dein ex Creta ab Honorio Belli, Elichrysi Orientalis nomine, accepimus. Simile, sed caule cubitali, fo-

Helichryso syl. similis.



lijsque latioribus, minusque lanuginosis, umbella multo latiore floribusque minoribus & pallidioribus, Helichrysi Cretici appellatione, ex horto nobiliss. Contareni habemus.

**H**ELICHRYSO sylvestri flore oblongo similis: caule est sesquipalmari, rotundo, lanugine candidissima vestito, in ramulos aliquot inæquales, palmis breuioribus brachiato: folijs Stachadi citrinæ alterius in odore similibus, latioribus tamen, aliquibus leuiter sinuatis, sesquiuncialibus, inferne incanis & tomentosis, superne virentibus: ramuli in pediculos tenues, nudos, vncias quatuor longos, abeunt, quorum summitatibus capitulum vnicum, squamosum, cum flore insidet, qui in pappum breuem, vt in Elichryso sylvestri angustifolio, abit. In montibus Italiæ prope Terracinum, prouenit.

Q 2

DE

semine  
na, to-  
nor vn-  
doque  
lis sub-  
os rosæ  
foliolis.

DE



## DE CONYZA.

## CAPVT. XIV.

I. **C**ONYZA cærulea alpina maior: hæc ex radice lignosa, rufescente, caulem crassum, pilis asperum, palmarem, mox in ternos ramulos, & horum aliqui in pediculos diuisum, protrudit: circa quem folia pauca, hirsuta & aspera, crassa, vncias tres, quatuorve longa, vncia angustiora, nervis aliquot distincta: singulis pediculis flos vnicus, cæruleus, Conyza cærulea vulgari similis, & similiter in pappum euanescent: hæc in monte S. Bernhardi prouenit.

II. **C**ONYZA cærulea alpina minor: plantula est semipalmaris, aliquando minor, læuis, rarus, nonnihil pilosa, radice nigricante, fibrosa, cauliculo rotundo, tenui, vnicum florem cæruleum, illius quidem flori forma similem, sed triplo minorem, multis apicibus donatum, & in pappum abeuntē, sustinente: foliola habet ad radicem plura, angusta, triuncialia, pediculis donata, pallide virentia: ad quæ caulem basi sua cingunt, breuiora sunt: hæc in monte Gotthardo reperitur.

III. **C**ONYZA aquatica Asteris flore aureo: caule est cubitali, rotundo, hirsuto, geniculato, in plures ramos brachiato, qui folijs tres, quatuorve vncias

longis, semunciam latis, villosis, per marginem & hispidis, & crenis rigidioribus exasperatis, cingitur: flores magni Asteris forma, aurei, singuli singulis pediculis insident, discum enim aureum folia plurima, & angustissima aurei coloris cingunt, at aliorum more in pappum auolant. Hanc in Valesia prope Sedunum ad aquas, D. Burserus legit: non tamen Conyza palustris serratifolia, quam alij, consolidam palustrem vocant, censenda est.

## DE ASTERE.

## CAPVT. XV.

**A**STER hirsutus Austriacus cæruleo magno flore: caule est rotundo, hirsutie aspero, pedali, in vnum alterumve ramū brachiato, folijs latis, subrotundis, per marginem nonnihil exasperatis & in apicem rigidiores desinentibus, rigidis, crassis, hirsutie leui exasperatis & scabris, cincto: cuius summo flos magnus insidet, eiusque orbem pallidū, folia multa, tenuia, oblonga, pallide cærulea, ambiunt, qui maturus similiter in pappum abit. Hic licet in Austria circa Cremam reperiatur, attamen cum Atere montano cæruleo magno flore, qui etiam in Austriacarum alpium iugis (imo & Heluetiarum, vt in lura) oritur, confundi non debet.

DE VER-



Verbena nodiflora.



DE VERBENA.

## CAPVT XVI.

**V**ERBENA nodiflora: ex radice tenui, fibris capillata; caulis tenuis, quadratus, geniculatus, glaber, in terram reflexus & sesquipalmaris, prodir, quem folia, ad geniculum bina aduerso situ, vngue non multum longiora, per extremum erenata & acuminata, cingunt: ex quolibet pene geniculo, & ramulus folijs aliquot cinctus, & pedicellus nudus, duas tresve uncias longus, exurgit: hicq; capitulum subrotundum squamatum sustinet, vnde flosculi Verbenæ vulgaris similes exeunt, semeng; paruum, vt in vulgari, succedit. Hanc Neapoli vna cum semine, ab Imperato accepimus.

## DE SCABIOSA.

## CAPVT XVII.

**I**SCABIOSA peregrina rubra: ex radice annua, caulis bicubitalis, ramosus, parte inferiore leuiter hirsutus exurgit: folia tenuia, ad radicem Rappæ forma laciniata, subrotunda, longis pediculis subhirsutis donata, & per ambitum serrata, ad ramulos superiores, oblonga, angusta & integra: pediculis pedilibus & palmaribus lauibis & maiore parte nudis, & quidem singulis flos vnicus attrorubens, Scabiosæ globulariæ maioris forma, oblongis filamentis puncto albo notatis, donatus, suauis odoris, insidet: huic capitulum oblongum, rufum, oblongis filamentis, vt in Caryophyllata vulgari exasperatum, & semen stellatum succedit. Hæc ex semine Scabiosæ Hispanicæ rubræ nomine misso (vt in Phytopinace monuimus) æstate in horto floruit: & à Clusio Scabiosa Indica nominatur.

Hanc, sed folijs in tenuiores lacinias dissectis, floreque minore & nigro, ex horto Patauino, D. Peckius, nomine Scabiosæ nigræ odore Zibethi, attulit.

**II.** SCABIOSA folio Sinapi sylvestris: caule est cubitali, striato, in ramos palmo longiores brachiato, qui ex foliorum alis, vbi pili paucissimi, prodeunt: folijs glabris, forma Sinapi sylvestris modo, ad neruum vique laciniatis, & sparsim crenatis, inferiorib; subrotundis: flores rubentes, mediæ magnitudinis, & singuli, cauliculorum summis insident. Neapoli ex horto Imperati habemus.

III. SCA-



## Scabiosa prolifera.



III. SCABIOSA prolifera folijs Gingidij: Scabiosa prolifera duplex est: altera folijs in latiores lacinias diuisis à Lobelio & Clusio proposita, cuius figura addita, de qua sermo non est. Altera folijs est tenuius incisis, ad modum foliorum Gingidij, quod Visnaga dicitur: quæ caule est cubitali, viridi, striato, geniculato, folia utrinque ad geniculum triun-

cialia, ex quorum alis ramuli aliquot trium quatuorve unciarum, exurgunt: at maior caulis pars, nudus & nonnihil asper est, cuius summo, flos purpureo caruleus insidet, & ad huius latera plures cauliculi modo unciales, modo palmares & glabri, minores quidem in orbem funduntur, at maiores florem superantes eriguntur, singulis flosculum eiusdem coloris, ex filamentis compositum, sustentibus, quibus folia fœniculacea subijciuntur: semina aliorum modo succedunt. Vtramque D. Doldius Norinberga misit: illa tamen, Patauij inter dumeta, circa Thermas D. Virginis, etiam obseruata.

IV. SCABIOSA montana dentis leonis folio: caule est sesquipedali, viridi, rotundo, striato, læui & cauo, superiore parte nudo: folijs latiore basi caulem amplexantibus, paucis, læuibus, crassis. inferioribus obtusis, & parum crenatis, superioribus ad modum foliorum dentis leonis, in binas ternasve lacinias diuisis & acuminatis, per oras crenatis, uncias sex longis, & duas circa folij medium latis, per quod nervus excurrit: caulis summum, quem duo folia, fere ut in Dipfaco complectuntur, flores aliquot subcerulei, pedicellis hirsutis, inæqualibus insidentes, exornant. Hæc Monspeffuli, in monte Calcaris reperitur.

V. SCABIOSA stellata minima: plantula est, trium quatuorve unciarum, læui hirsutis canescens, radícula simplici, cauliculo ut & folijs biuncialibus, angustis, in paruas & profundas lacinias diuisis: cauliculi summo, capitulum rotundum, ex caliculis paleaceis compositum, insidet, flores subcaruleos, paruos continens, quibus exiccat in caliculorum medio stella parua conspicitur, à qua filamenta capillacea, oblonga, rufa, quinque numero extra cauliculum producantur. Hanc in Provincia locis incultis obseruauimus, & à Scabiosa minore Hispanica Clusij: quam in litore Veneto notauimus, diuersam facimus.

VI. SCA-



Scabiosa argentea angustifolia.



VI. SCABIOSA argentea angustifolia: ex radice lignosa, caules bini, terni, sesquipalmes, rotundi, incani, parum reflexi, exurgunt: circa radicem folia quatuor aut quinque vnciarum longa, angusta, graminea, albicantia, & argenti colorem referentia, inordinate disposita, in superna caulis parte nulla: caulis vnicum discum orbiculatum planum, molli lanugine incanum sustinet: qui plures flores caeruleos, vel pallidos, aliarum forma continet: quibus cauliculi membranacei, etiam stellati cum staminibus, sed quam in priore brevioribus, semen continent, succedunt. In monte Sumano.

prope Vicentiam pro-  
uenit.

## DE IACEA.

## CAPVT. XVIII.

I. IACEA nigra angustifolia, vel Lithospermia aruensis, folijs: radice est nigricante, in fibras aliquot diuisa, caule pedali, rarius cubitali, rotundo, aspero, in alas inaequales diuiso: quem folia incana, angusta, breuia, rigidiuscula & aspera, Anchuse siue Lithospermia aruensis similia, alternatim sua basi cingunt: cauliculorum summis capitula squamatum, & nonnihil asperum, aliarum lacearum forma, sed minus, insidet, ex quo flos multis exiguus, oblongis foliolis, pallide rubentibus, vel ex purpura candicantibus, prodit, cui semen exiguum, nigrum succedit. Hanc passim Monspeluli & Patanii obseruauimus.

2. Huic & altera similis, sed caule molli tomento vestito, & folijs incanis, mollibus & longioribus.

II. IACEA integrifolia humilis: haec cauliculis est pedalibus, rotundis, alba lanugine hispida & terram versus reflexis: folijs vnciam latis, duas longis, nec laciniatis, nec crenatis, sed integris, lanugine, praesertim per marginem, pubescentibus & subasperis, basi sua cauliculum ambientibus: in cuius summo, capitulum ex multis squamis imbricatum dispositis, constans: ex quo flos laceae vulgari similis, subpurpascens, ex foliolis oblongis, in filamenta aliquot diuisis, compositus, prodit. In Austria ad S. Hippolytum prouenit, vnde laceae Austriae repentis nomine, D. Burserus misit.

III. IACEA capite longis aculeis spinoso: tota planta subincana breuib. & rigidulis pilis hirsuta: radicem habet fibris crassioribus implexam, fragilem, candidam, sed membrana subfusca teeta: caulem cubito altiore, rotundum, incanum, asperum, in ramulos inaequales diuisum: folia prima & tenella, pilis densioribus, albidioribus, mollioribusque stipantur, reliqua vero oblonga, vncias duas lata, crassa, rigida, per ambitum profundius crenata, nonnunquam ad pediculum laciniata, per quae fibrae crassiores albae, transcurrunt: caulis summitati, capitulum squamosum ex pluribus squamis, etiam triginta numero compositum, & in conum pini amulum compactum, insidet, quarum apices in spinas oblongas, rectas, subflauas & rigidas desinunt, & squamarum ora, firmis pilis alben-  
tibus, tanquam



tanquam setis vñq; circumdata sunt: inter quas flos multis folijs oblongis, laciniatis & candicantibus emergit, cui semen Cnico simile, sed vulgari maius, succedit. Hæc à Iacea montana echinato capite Clusij diuersa est, & à D. Doldio missa fuit.

IV. IACEA laciniato Sonchi folio, siue Iacea latifolia purpurea capitulo spinoso: radice est recta, fragili, fibrosa, membrana subfulca recta, & si plures caules protrudat, brachiata, sapore subaustriusculo, ex insipido ad amariuscum tendente: caulibus vt plurimum rectis, hirsutis, breuib; densisq; villis seu lanugine, potissimum parte inferiore, refertus, qui ob capitulorum grauitatem, humum versus reflectitur, & in summo in aliquot ramulos diuiditur. Folia primum prodeuntia variant, sunt enim rotunda, oblongo pediculo donata, dein magis magisq; sinuata, tandem vero in lacinias (quæ ad exortum inferiorum minora sunt) inæquales diuiduntur: sunt etiam rigida & dura, adeo vt complicata cum quodam pene crepitu frangantur, breuissima & duriuscula lanugine, potissimum superiora & ad exortum, recta. Cauliculorum summis capitula spinosa, ex squamis compacta, initio viridia, mox ad apicem purpurascens, insident: ex squamis spinæ septem pulchro ordine, stellam dimidiatam referentes, exeunt, quarum media cæteris latior & longior, in minuto capitulo rubens, paulo post vero pallens. Flos ex capitulo tarde prorumpit, qui elegantis purpuræ & inodorus, cuius foliola fistulæ sunt oblongæ, superius amplo & laciniato rectu præditæ, inferius angustæ, quæ ad exortum coloris albi, sed paulatim versus fastigium in rubrum sese mutante: omnes autem stamina clauata sustinent, claua ex purpureo seu violaceo prorsus nigricante, in summo alba puncta habente, & staminum pediculis, vbi ex fistula prorumpunt albis existentibus. Semen, Cyani semen refert, oblongum, angustum, & cinereum est. Hanc Centaurii marini nomine, D. Doldius misit.

Eandem sed palmo minorem, folijs paruis, rigidis, parum laciniatis, & per marginem crenis rigidis exasperatis, Cyani marini nomine, à D. Neudorffero ex Italia habemus.

V. IACEA montana incana aspera capitulis hispidis: radice est lignosa, in longas fibras diuisa & rufescente: cauliculo palmari, rotundo, lanuginoso: folijs asperis, ad radicem pluribus, incanis, hispidis, parum laciniatis, angustis, vncias quatuor longis, reliquis vero, in profundas & rigidas cre-

Iacea montana candidissima.



nas diuisis, basi; sua caulem amplexantibus, qui aliquando in ramulos diuiditur, quorum singuli capitulum paruum, ex squamis hispidis compositum, sustinent, earum enim cuspides exterius reflexæ, in tenuissima filamenta desinunt: flores vulgari similes, sed multo minores. Monspeffuli in monte Calcaris prouenit.

VI. IACEA montana incana laciniata capitulo hispido: ex radice caulibus palmo maior, rotundus, molli lanugine canescens, exurgit, circa quem folia pediculis oblongis incanis donata, laciniata & subrotunda, tactuq; mollia: capitulum paruum & priori simile, eodemq; in loco proueniens.

VII. IACEA montana candidissima Stæbe folijs: hæc ex radice crassa lignosa, caulem profert palmarem, nonnūquam cubitalem, angulosum, striatum, molli & incana lanugine vestitum: folia habet ad radicem multa per terram sparsa, palmaria, lata,



## PERFOLIATA.

## CAPVT XX.

lata, Stræbes instar laciniata, molli lanugine incana & superiora molli tomento, quasi farina aspersa, mollia & alba sunt: cauliculis summis flores singuli Iacæe vulgari similes insident, q̄ ex capitulis squarrolis prodeunt in montib. prope Capuam puenit.

VIII. IACÆA tomentosa capitulo spinoso: tota planta, quasi farina aspersa florēt, albescit, & à radice, caulis pede minor, statim in alas plures diuisus, exurgit: folia habet breuia, ang. ista, in petiolaria, quina, septena, subrotunda diuisa: cauliculis, capitula parua, ex squamis multis in aculeos acutos & rufescentes abeuntibus, composita: flos non fuit conspectus: in Murena Hispaniæ, D. Albinus legit.

IX IACÆA Babylonica: ex horto clariss. Contarini, hoc nomine folium accepimus, quod primo intuitu Acanthium aliquod referre videtur: hoc longitudine cubitum æquat: in medio, latitudine palmum superat, non nihil incanum, tactu asperū, cuius tota circumferentia veluti minimis aculeis exasperatur: ad exorū lacinias acutas trium quatuorve vnciarū longas, obtinet: hinc ex rotunditate sensim angustatur & in apicem abit, cuius summo breuissimus aculeus insidet: per ipsius mediū, costa eleuata, non nihil hispida fertur, à qua plures nerui in latera excurrūt. Plura non licet.

## TRAGOPOGON.

## CAPVT XIX.

I. TRAGOPOGON folio sinuato: radice est oblonga, lacteo succo manante, caule gracili, striato, pedalis altitudinis, raris folijs alternatim septo, quæ oblonga, non multum palmo breuiora, at angusta, sinibus breuioribus, & quasi serratis exasperata, pallideq; virentia: caulis summo flos insidet pallide luteus, magnus, Tragopogo vulgari similis, ex calice magno apicibus acutis donato prodiens, quo marcido, semen oblongum, in materia villosa alba latitans, succedit: Monspeffuli legim⁹.

II. TRAGOPOGON tenuissime laciniatum: radice est oblonga, crassiuscula, fibris carente, rufescente & lacte turgente: ad quam folia plura oblonga, angustissima, acuminata, & in plures angustissimas lacinias diuisa: caule est cubito non multum breuiore rotundo, laui, striato, non nihil folioso, in alas brachiato: singulis flos vnus, magnus & pallidus insidet, cui semen oblongum, scabrum, cristapilosa in summo præditum & calici oblongo inclusum, succedit. Et hoc Monspeffuli obseruauimus.

I. PERFOLIATA alpina latifolia minor: radice est vnica, rufescente, paucissimis fibris capillata: cuius caulis gracilis, teres, glaber, cauus, cubito altior, in ramulos, quasi in vmbella dispositos distribuitur, quem folia glabra, venosa, sesquiunciam lata, Vaccariæ folijs similia, basifolia medium amplectuntur: in cauliculorum fastigijs vmbellæ, vna cum foliolis exiguis, flosculis tenuibus subluteis, quibus semen oblongiusculum, nigricans, angulosum, succedit. Hæc in Heluetiorum alpihus reperitur.

II. PERFOLIATA alpina angustifolia maior, siue folio anguloso: radicem habet vnicam, oblongam, rotundam, crassam, nigricante cortice tectam, minime capillatam, ex qua prodeunt folia plura, pallide virentia, glabra, pedem longa, vnciam vel sesquiunciam lata, longis pediculis donata: at folia caulem amplectentia angulosa sunt & acuminata, rarius bina, hederæ modo angulosa ex opposito sita: caulis rotundus est, teres, glaber, cauus, sesquicubitalis, quasi foliorum basin penetrans: cuius summo quina folia, lata, in orbem disposita insident, eo modo quo in Tithymalo, vnde pediculi seni, septeni, longitudine impares prodeūt, quibus vna cum folijs paruis, rotundis, flores parui ex luteo rufescentes insident: Semen nō vidimus: in Pyrenæis, non longe Narbona, D. Burserus legit.

III. PERFOLIATA alpina angustifolia media: hæc à præcedenti sola magnitudine & foliorum angustia differt, quæ pro Perfoliata longifolia Dalechampi, in historia Lugdunensi picta videtur, & ex monte Gotthardo habemus.

IV. PERFOLIATA alpina angustifolia minor: hæc radice est rufescente, ad quam folia multa, atrouirentia, graminea, semipalmaria: caulem habet vnum, aliquando geminum, pedalem, rotundum, glabrum, quem folia pauca acuminata, basi sua latiore ambiunt, in cuius summitate veluti vmbella, vt in vulgari Perfoliata, ex qua ramuli eragunt, flores rufescentes, cum seminibus sustinentes. Hæc ex Sumano monte, & Valesianorum alpihus, habemus. Verum cum Perfoliata alpina gramineo folio, siue Bupleuro angustifolio alpino, quod in Baldo provenit, confundi non debet.

V. PERFOLIATA alpina angustifolia minima: plātula

R

tula



tula est semipalmaris, inter Perfoliatam & Bupleuron media, radice tenui rufescente & serpente, fibris capillaceis terræ affixa: ex qua folia oblonga, angustissima, pluribus locis progerminant: inter quæ cauliculi efferuntur tenuissimi, glabri, vncias quatuor alti, in ramulos binos & hi in minores quasi ex umbella minima prodeuntes, diuisi, quos folium vnum vel alterum basi latiore cingit, & flosculi exigui flauis insident. In summis Pyrenæorum iugis reperitur.

VI. PERFOLIATA minor ramis inflexis: hæc folijs est vulgari paulo longioribus, breuioribus tamen quam in montana, caulem habet ramosum reclinatum, & velut per terram sparsum, flores luteos: annua est instar vulgaris siue aruensis, in quo alpina differt: hanc apud Ioh. Bauhinum fratrem p. m. vidimus, quam ex horto Stucgardiano habuit.

## CENTAURIUM.

## CAPVT XXI.

Centaurium minus spicatum album.



CENTAURIUM minus spicatum album: ex radice parua, alba, fibrosa, caulis exurgit, mox in duos palmares & semipalmares striatos, hi que in alios diuisi: folia sunt parua, pediculis carêtia, quorum prima lata, subrotunda, superiora angusta, acuminata, quandoq; bina aduerso situ caulem amplexantia: flores oblongi, albi, ab imo sursum per caulem sparsi, singuli, vt plurimum, ex vna caulis parte sibi inuicem succedentes, ex caliculis foliosis prodeunt, ea forma qua non patentes in figura exprimuntur, patentes enim sculptor non recte expressit: his siliqua, vt in vulgari, semen minutum continentes, succedunt. In montibus Euganeis Patavinorum, & hinc inde circa Monspelium reperitur, vt in nostro Matthiolo monuimus.

## ASCYRON ET HYPERICVM.

## CAPVT XXII.

ASCYRON magno flore: hoc Ascyro vulgari, siue Hyperico dumetorum simile, caule sesquicubitali, rotundo, glabro, rufescente, quem folia pallide virentia & inferne albidiora, vnciam longa, semunciam lata, subrotunda, bina semper situ aduerso cingunt: in caulis summo, flores calice viridi sustentati, pallide lutei, magni, quintuplo vulgari maiores, ex quinque folijs vncialibus compositi, è quorum vmbilico staminula plura, flaua, velut puncto notata, exurgunt: siliquas & semina non vidimus. In Pyrenæis D. Burserus hoc, quemadmodum & subsequens, legit.

HYPERICVM nummularie folio: radicem habet oblongam, tenuem, paucis fibellis capillatam, ex qua cauliculi tenues, rufescentes, palmares efferuntur, quos folia parua, rotunda, nummo similia, bina aduerso situ & æquali distantia locata cingunt; quæ superne atrouirentia, inferius alba, aliquando punctis vel maculis rubris notata, conspiciuntur: cauliculorum summis flores pallide lutei, satis magni, plurimis staminulis donati, insident.

POLY-



## POLYGONVM.

## CAPVT XXIII.

**I. POLYGONVM** saxatile: huius radix tenuis, liguosa tamen, fibris capillata & alba est: ramulis multis oblongis & crebro geniculatis serpit: circa quos folia subrotunda, vnciam longa, semunciam lata, superne virentia, at inferius albicantia, quasi polline aspersa, quæ sensim minora redduntur: à geniculis flosculi exigui, vt in vulgari, pallide rubentes exeunt, quos semina triangularia sequuntur. Hoc inter saxorum fissuras, ad arcium editissimarum radices, vt in petris arcis Walden-burgensis Basileensium, & in vicinis, obseruauimus.

**II. POLYGONVM** Creticum thymi folio: herba est supina, humique procumbens, cauliculis siue viticulis, palmatis, ramosis, hinc inde sparsis: flosculis paruis albicantibus, pluribus simul quasi in nodo iunctis, quibus foliolum Thymi forma, modo vnum, modo bina, ternave, magnitudine imparia adponuntur: semen pusillum ac copiosum succedit. Hoc Polygoni Cretici nomine, D. Gille-nius misit.

**III. POLYGONVM** littoreum minus flosculis spadiceo albicantibus: ex radice candicante, tenui, oblongiuscula, prodeunt viticuli pluri, tenerri-mi, per terram sparsi, ramosi & dodrantes, folio-lis oblongis, angustis, & albicantibus alternatim cincti, ad radicem vero longioribus & biunciali-bus: viticulorum summitatibus flosculi plures mi-nutissimi, intus albi, foris spadicei insident, quibus semina minutissima & copiosissima, vt singuli co-lliculo eo turgant, succedunt: hinc ad Millegra-num referri potest. Hoc apud nos, in arenosis ad Wiesam flumen, autumno florens reperitur, quod Polygoni *πρινιλαυθέρων* nomine, Northu-sio, apud quos in sabulosis reperitur, D. Furerus misit: idem, sed sine nomine, ex inferiore Lusatia, vbi locis arenosis, in ripa fluminis Nissa prouenit, à D. Franco accepimus.

**IV. POLYGONVM** minus lentifolium: plantula est tota virens, parua, supina, humiq; procumbens ex cuius radice simplici, in altum descendente, cau-liculī plures, impares longitudine, crebris internodijs geniculati, exiguis folijs subrotundis, lenticu-laribus adnatis, prodeunt: flosculi in cauliculorū

summis minimi, albicantes, vel pallide virentes plures simul iuncti & semen pusillum, obseruatur.

Cum Anthyllide Valentina Clusij, quæ tota subrubens est, longe minoribus folijs, & copiosioribus flosculis ex albo purpurascens, ijsq; non solum in cauliculorum summis sitis, confundi nō debet. Hoc in Hispaniæ montibus prope Escorial D. Albinus inuenit: quod tamen ante annos triginta nouem Monspeffuli in incultis, sed aliquan-tum minus, collegimus.

## DE SEDO.

## CAPVT XXIV.

**I. SEDVM** tridactylites alpinum maius: radicem habet tenuem capillaceam, cauliculum semi-palmarem, purpurascens, non nihil pilosum, in ramulos plures tenues & fragiles diuisum: folia ad radicem tenuia & mollia, lata (in ramulis minuta) in tres lacinias primum, & in alias, diuisa: flores in ramulorum summis albi, quinquefolij, totidem staminibus donati, quibus capitula subrotunda, longiuscula, minutissimum semen continentia, succedunt. Hoc ex Baldo habemus, & saxifragæ albæ petreæ nomine, Pona suo Baldo exhibuit, idem præterito anno D. Furerus, nomine Dactyliobota-ni siue Saxifragæ petreæ sempervirentis misit, quod in ea Harcyniæ parte, qua Buda fluius officinas Rubelandicas alluit, totos scopulos obuoluere scribit.

2. Simile, sed folijs latioribus, & in ternas primū profundas lacinias diuisis, & in his in minora & tenuiora segmenta sectis: caulibus pedalis, florib. pallide luteis, in humidis montium Pyrenæorum natum, habemus.

3. Aliud cauliculo rotundo, semipalmari, pilis leuissimis aspersis, folijs paruis, crassiusculis & eo modo quo folia Sedi tridactylitidis in teetis pro-uenientis, incisa sunt, etiam diuisis, totumq; cau-liculum alternatim basi suæ cingentibus, qui in sum-mitate in ramulos diuiditur, & singuli flosculum candidum, sed minorem, sustinent, capitulaq; vt in præcedenti, succedunt. Sedi dactyli nomine, ex Taurero Austriæ, D. Burserus misit.

**II. SEDVM** tridactylites alpinum minus: ad radi-cem parua, repentem & nigricantem, folia plu-ra, exigua, viridia, simul compacta, superne in cre-nas profundas, binas, communiter ternas, rarius

R 2 plures,



plures, diuisa: ex quorum medio, cauliculus vnus vel alter, tenuis, aliquando diuisus, paucis & exiguis foliolis cinctus, trium quatuorve vnciarum exurgit, cui flosculi terni, quaternive pallidi, quinque folij, multis staminulis donati, singuli singulis pedicellis insident: hic calices parui, semen minutum continentes, succedunt. Hoc in monte Lupi & Calcaris, in eorundem rupibus collegimus: ex humidis Gotthardi montis & Pyrenæis quoq; habemus.

III. SEDVM montanum ericoides: ramis est palmaribus, lentis, flexibilibus, dense geniculatis, per terram sparsis, quos folia breuia, crassiuscula, Ericæ forma, vestiunt, & hi in plures alios, duarum triumve vnciarum, & etiam breuiiores diuiduntur, hiq; foliola frequentia, sibi fere incumbentia & rotundiora habent: in singulorum summitatibus velut ex squamoso calice flos satis magnus purpurascens, ex quatuor, aliquando quinque folijs, & aliquot in medio staminibus compositus, insidet: quid florifuccedat, non constat. Hoc ex horto Dei dicto, habemus: & cum Lobelij Sedo minimo arborecente vermiculato, plurimum affinitatis habet.

IV. SEDVM alpinum ericoides cæruleum: ex præruptis iugis, ac faxis humidis propendet, radicem habens oblongam, fibrosam, rufam, ramos plures, foliolis quam in priore breuioribus, crassis, cinereis, velut in Samunda 2. Clusij, siue Erica Alexandrinæ compactis, cinctos: singulis cauliculis vncialibus, foliaceis, flos magnus, cæruleus, quadrifolius, aliquot staminulis breuib; donatus, insidet. Hoc, cum ann. 1579. Martio mense, per Rhetia alpes iter faceremus, è rupibus, ob aquam defluentem humidis, instar Cymbalaria, dependens, florensque, collegimus, quod florum eleganti colore cæruleo, oculos nostros valde reficiebat.

Idem in Gotthardi summitatibus, & in Valesia ad thermas Leccenses supra Gemme reperitur: quod a priore differt potissimum foliorum exilitate, & colore florum: item & colore & magnitudine.

V. SEDVM saxatile hirsutum purpureum: plantula est triuncialis; radícula capillacea, cauliculo tenui, leniter piloso, cuius summitas in breues ramulos diuiditur, qui singuli florem purpureum sustinent: foliola ad radicem plura, hirsuta, & lente minora. Hoc, vt & subsequens, ex Pyrenæis D. Burserus attulit.

VI. SEDVM saxatile atrorubentibus floribus: hoc, tres quatuorve vncias non excedit, habens ra-

diculam exilem, longiusculam, vnum alterumve cauliculum biuncialem, foliolis paucis exiguis, longiusculis, alternatim vestitum, flosculos atrorubentes, quasi in umbella dispositos, sustententem. Hoc etiam in Gotthardo nonnihil altius excrecit.

VII. SEDVM saxatile variegato flore: radice est capillacea, cauliculis plurimis, tenuibus, biuncialibus, per terram repentibus & fibellis capillaribus terræ adherentibus: foliolis multis, pallide virentibus, subrotundi, lente minoribus, vestiti: ex ramulorum summis, pedicelli plures capillacei, oblongi, exurgunt, singuli florem quadrifolij, varium, album, purpureum & atrorubentem eleganti spectaculo sustentent, cum plantula hæc cespitis musciq; instar saxa exornet. Hoc inter Valesiam & Augustam vallem, in monte Giesberg dicto, qui toto pene anno niuosus est, copiose provenit.

VIII. SEDVM alpinum foliolis crenatis asperis: radice est capillacea repente, cauliculis tenuissimis, semipalmaribus, etiam breuioribus, rarius palmaribus, in summo in ramulos aliquot sectis: folia habet longiuscula, angusta, acuminata, crenis utrinque exasperata, & parte auersa candicante; flores quadrifolij, purpurascens & staminibus donati, caliculis sustentantur, quibus capitulum subrotundum, membranaceum, apice donatum, minutulum semen continens, succedit. Hoc Iulio mense floret, in ascensu montis S. Bernhadi maioris & Gotthardo. An forte Gesnerus lib. de hortis Germaniæ, hoc intellexit, dum scribit, Sedum quoddam esse, cuius folia marginibus asperis, branchias piscium referunt?

IX. SEDVM aruense flore rubente: radice est lignosa, fibris capillata, cauliculis aliquot palmaribus rotundis, rugoso rufescente cortice tectis, qui in ternas, quandoque plures ramulos (quorum aliqui recuruantur) diuiduntur: hos folia longiuscula, angusta, succulenta, sine ordine ambiunt: ramulis superioribus flores plures, vulgaris Sedi floribus similes, sed rubentes insident, semenque vulgari simile succedit. Hoc non longe ab vrbe, in agris Huningensi autumnis iam exiccatum reperitur: quod etiam in agris argillofis ad Pyrenæos, sed minus, reperitur.



## DE COTTLEDONE.

## CAPVT XXV.

**C**OTYLEDON minor folijs subrotundis serratis: radix subest tenuis, fibrosa, fusca, circa quæ folia multa, semi vngue minora, non vt in altero oblongis ligulis similia, sed subrotunda, margine crenato, crassiuscula, candicantia & non nihil adstringentia: è quorū medio caulis semipalmatis, quandoque palmaris, subasper, minimis & paucis folijs cinctus, assurgit: in cuius summo, pedicelli, flores, multo quæ in secunda minores, ex quinque, quandoque etiam sex folijs & medijs apicibus cōpositos, sustinentes, qui albi, aliquando rubentibus punctis aspersi, nonnunquam extrinsecus lincis tenuis foliola floris percurrentibus, ita vt flores pallide purpurascētes appareant: his capitula exigua, nigrum semen continentia, sequuntur. In Heluetiorum alpihus, ipsis saxi sac scopulis adhæret; Iunio & Iulio floret: at ea quæ flore est pallide purpurascēte, apud Monspelienſes, in horto Dei collecta fuit.

## DE KALI.

## CAPVT XXVI.

**K**ALI minus villosus: radice est oblonga, fibrosa, nigricante, caule pedali, inæquali, ramoso, folijs pluribus, angustioribus, mollibus & villosis, inter quæ vnum, quod cæteris subiicitur, longius est, quemadmodum etiam in Tragio obseruare est: in cauliculorum summis, capitula parua, florem minutum continentia: semen non obseruauimus. Hoc, cum figura Kali albi Dodonæi, melius conuenit, quam Kali minus Lobelij. Tota planta salsa est, & non longe Monspelio à Perault, quæ ad mare itur, legimus: quamuis idem, nomine Kali hirsuti folijs Spergulæ, ex Italia, à D. Neudorf. habeamus.

**K**ALI folio gramineo: ex radice oblonga, alba, exiguis capillaceis fibris donata, caulis pallide virescens, rotundus, incuruus, pedalis, in varios & plures ramos quadrunciales, tenues & fragiles, inordinate dispositos, brachiatus exurgit: quos folia oblongiuscula, angustissima, alternatim disposita cingunt, quibus singulis, singuli noduli exigui florum & seminum, vt in Kali minore Lobelij, cauli

adhærentes, adponuntur. Ex Salinis Saxonice siccum, D. Iungermannus transmisit: & ad Anthylloidem Thalij accedere videtur.

## DE TELEPHIO.

## CAPVT XXVII.

**T**ELEPHIUM purpureum minus: hoc à radice nodosa, & aliquot veluti minimis naps constante, multisque fibris prædita, cauliculum vnū vel alterum rotundum, semipalmarem, fragilem ac succulentū promit: quem folia crassiuscula, succulenta, parua, in ambitu crenata, sine ordine ambiunt: flosculi quinquefolij, purpurei, velut umbellæ insident: quibus capitula pentagona, minutissimum semen scobis instar continentia; succedunt. In editissimo monte Brisoia, & Veldhen dicto, locis humidis Iulio florens, collectum.

## DE TITHYMALLO.

## CAPVT XXIX.

**T**ITHYMALLUS incanus hirsutus: caules pedales, rotundos, rufescentes, profert, folijs incanis & hirsutis, Myrsenitis legitimi forma, confuso ordine vestitis, in summitate in virgulas diuisi, quibus, vt in Myrsinite, flores & capitula triangularia, semina continentia, insident. Hunc ex Italia D. Neudorfferus attulit.

**II.** TITHYMALLUS siue Esula exigua folijs obtusis: radice est exili, oblongiuscula, capillata, cauliculis pluribus ad terram resupinatis, aliquantulum repentibus, biuncialibus, triuncialibus, alijs palmo minoribus, rotundis, lacteo succo turgentibus, qui foliolis oblongis, angustis, sed semper in summo obtusis & velut abscissis, inordinate vestiuntur: hic in agris Patauinis & Massiliensibus, reperitur.

**III.** TITHYMALLUS exiguus saxatilis: radiculam habet capilli modo tenuem, longiusculam, cauliculos tenues, vnciales & biunciales, angustissimis & breuibz foliolis cinctos, flosculos exiguos, rubentes: circa Monspelium locis asperis prouenit.



# LIBER OCTAVVS. DE CONVOLVULO.

## CAPVT I.

I. CONVOLVVLVS purpureus folio rotundo: caules prælongos, teneros, viticulosos, paucis pilis exasperatos, vicinis perticis circumvolutos, promit: folia habet longis pediculis subasperis donata, quæ lata sunt, angulis carentia & nonnihil hirsuta, præsertim superiora: flores oblongi, ex calicibus hirsutis instar Campanulæ siue Smilacis laevis ex cæruleo purpurei sunt, quibus succedit semen nigrum, semicirculare & angulosum, capitulo membranaceo inclusum, quod semine Campanulæ cæuleæ multo minus est. Hic sub ætatis finem floret. An ad Nil Auicennæ quoque referri potest?

II. CONVOLVVLVS peregrinus cæruleus folio oblongo: radice est singulari, oblonga, rufescente, ex qua caules multi, tenues, pedales, interdum cubitales, flexiles, ramosi, leuissimis pilis pubescentes prodeunt: quos folia oblonga, inferiora quidem, vncias tres, quatuorve longa, vix vnciam lata, inordinate vestiunt, quæ sensim minora redduntur, & per marginem leuiter hirsuta sunt: ex omnium fere foliorum sinu, pedicelli tenuissimi, oblongi exurgunt, quibus singulis flos cæruleus ad exortum pallidus, Campanulæ forma, vnico folio constans, & ex caliculo prodiens, insidet: floribus succedunt capitula membranacea parua, quibus semina parua, nigra includuntur. Planta sane ob florum copiam elegantissima, & quæ ob cauliculorum flexibilitatem fulciri debet. Hic in horto meo ex semine, Campanulæ cæuleæ nomine accepto, sæpius creuit.

III. CONVOLVVLVS folijs laciniatis, vel quinquefolius: viticulis est tenuibus, geniculatis, lænibus: ex quolibet geniculo folium, longo tenuissimo pedicello donatum, prodir, quod in quinque lacinias angustas longiusculas diuiditur, & quandoque inferior vna alterave bipartitur, & cuilibet laciniæ, tenuissimus mollisq; aculeus insidet. Supra folij exortum, pedicellus æque tenuis, dua-

Conuoluulus quinquefolius.



rum triumve vnciarum longus & nudus exurgens, florem magnum purpureo cæruleum, aliorum Conuoluulorum forma, sustinet. Semen non conspectum, cum solum huius ramum, Conuoluuli Ægyptiaci nomine, à nobiliss. Cortuso Patauio ante viginti annos accepimus.

DE



## DE BRYONIA.

## CAPVT II.

**I.** BRYONIA Cretica maculata: radice est longa, alte descendente, sed ad vulgaris magnitudinem non accedente, fusco cortice tecta; ex qua longa & tenuia sarmenta prodeunt, quæ ambiunt folia aspera (qualis & tota planta) ad similitudinem vitium, aut Bryoniæ vulgaris diuisa, sed minora, viridia; albis strijs per medium discurrentibus, vel maculis albis notata, quibus capreoli vt in vite adduntur. Flores habet pallidos, quinquefolios, striatos, vulgaris Bryoniæ floribus maiores, ex longis pediculis propendentes: cuilibet flori, fructus succedit semicircularis, superne in partes duas diuisus, viridis primum, at per maturitatem ruber, femina duo continens. quare Dicoccos appellari potest. Hæc in Creta frequens est, vnde semen à D. Honorio Belli accepimus & in D. Zuingeri hortu (quia tum hortum colere intermisimus) seruimus.

**II.** BRYONIA syluestris baccifera: radicem habet magnam, crassam, longam, succo glutinoso plenam: caules vero sarmentorum vitis instar longos, lignosos, angulos, quibus se, (sicet capreolis careat) crebris circumvolutionibus vicinis frutibus circumuoluit: folia hederacea, Smilacis læuis similia; magis tamen sinuata, tenuia, splendentia, & neruosa, longissimis pediculis donata: flores albi sunt; muscosi: ad cuiuslibet folij exortum, in viticulis maxime superioribus, pedicellus breuis ex caule exurgit, qui baccam vnicam ceraso minorem, virentem primum, at per maturitatem rubentem, sustinet: cui semina satis magna, rotunda, nigraque quaterna, quinave includuntur. Prouenit in syluis circa pagum Huningen, Iunio florens: at baccæ Septembris fine maturæ sunt.

Hæc à communi Bryonia syluestri, quæ Tamus dicitur, potissimum in his differt, quod communis florem minorem habeat, racemosa sit: hæc vero flore sit maiore & baccifera.

**III.** BRYONIA Mechoacana nigricans: radice est Mechoacæ simili, sed cortice nigricante vestita, interius rufescens, quæ tessilarim incisa rotunda, magnitudine & figura calculo aleatorio respondens, ex India Chelapæ siue Celapæ nomine ante annos vndecim allata fuit. Ab Alexandrinis &

Massiliensibus, Jalapium vel Gelapo vocatur: & à Massiliensibus, Mechoaca nigra vel mas existimatur.

Gusto est non ingrato, & gummoso, & ob copiosam gummositatem, si carbonibus, vel igni admoveatur, flammam concipit. Facultate, vulgarem siue albam Mechoacam, superat: nam ob gummi copiosum, fortius humores serosos purgat, cum imi ventris leui dolore, & præcipue viscera, hepar & ventriculum roborat. Quare drachmæ vnus pondere exhibetur tuto, & sine fastidio opus suum exequitur. Sunt qui ea in dosi, cum aqua Cichoreæ, aut simili stillaticia, seu iure actæ frigidis, tribus horis ante prandium, agris propinent.

## DE CLEMATIDE.

## CAPVT III.

**I.** CLEMATIS maritima repens: hæc cauliculos habet sarmentolos, geniculatos & striatos, cubitales, atrouirente cortice vestitos: folia Flammulæ erectæ instar oblonga, acuminata, neruosa, rigida, sed angustiora, quod communiter tria vni pediculo, qui velut in capreolum abit, insident, & quadam per circumferentiam nonnihil crenata, quæ vero in summo caule floribus subijciuntur, angustissima sunt: flores albi sunt; multis staminibus villosis albis, meditullio occupantibus, longis pediculis sustentati: quib. semina plana, subrotunda, rufescentia; vt in Flammulæ erectæ, sed minora, bina, ternave iuncta, singulis capreolo plumoso, veluti incana crista donatis, succedunt: hæc acria sunt quemadmodum & tota planta. In maris Adriatici littoribus, vt in Venerorum Insula Lio & Litze-fusina, suis sarmentis repentem obseruauimus.

**II.** CLEMATIS alpina Geranifolia: ex radice sarmentosa & perenni, caules plures lenti, lignosi, quandoque rufescente cortice tecti, duos tresve cubitos alti; exurgunt, qui æqualiter bipartiti, in latera diuiduntur: quibus singulis folia, crebris & profundis diuisuris incisa, trigemina, coherentia, vt in Anemone geranifolia, insident: flores singuli, singulis pediculis longissimis ac tenuissimis insident, qui coloris cærulei albicantis, aut obscure purpurascents, ex quatuor folijs oblongis, mucronatis, neruosis, crucis in modum dispositis & nonnihil lanuginosis, in cuius medio folia, plura, breuiora, quæ quasi acruulum capillaceorum fila-

mento-



mentorum alborum ambiunt: semen nō vidimus. Hanc in altioribus Baldi rupibus enatam, & Cle-  
matidem cruciatam à Iungermanno appellatam,  
ante annos viginti sex, & ante biennium elegan-  
tiorē & maiorem, ex Austria montibus, vbi fre-  
quens est, à D. Bursero accepimus.

## DE NUMMULARIA.

## CAPVT IV.

Nummularia flore purpurascēte.



NUMMULARIA flore purpurascēte: hæc eo  
quo Nummularia vulgaris modo, serpit, radi-  
cem habens tenuem, capillaceam, à qua coliculi  
multi, tenues, palmo minores emergunt, quos v-  
trinq; folia vulgaris forma, propemodum rotunda  
sed parua, & p'us quam decuplo minora, quorum  
nonnulla leuiter sinuata: ex horum sinu pediculi

tenues oblongi, prodeunt, quorum singuli florem  
purpurascētem, paruum, oblongum, quinquefo-  
lium, staminulis in medio breuib; sustinent: his  
capitulum paruum, apice donatum, minutissi-  
mum semen continens, succedit. Hæc in humidis  
Monspelienſium prope Castelnouum prouenit.

DE POLYGONATO ET LILIO  
convallium.

## CAPVT V.

I. POLYGONATVM latifolium minus, flore maio-  
re: ex radicis albicantis, subrotundæ & fibrosæ  
medio, cauliculus vnicus, fere pedalis, striatus, nec  
admodum inflexus exurgit: qui folijs, vt in vulgari  
dispositis, firmioribus tamen, vestitur: ex singulis  
alarum sinibus, flores singuli, magni, albi, in odori,  
breuib; & quidem singulis pediculis insidentes,  
ab vna caulis parte propendent, quibus bacca suc-  
cedunt, quæ per maturitatem caſium colorem ac-  
quirunt, & semen osseum, durum continent. Apud  
nos in monte Crenzacho copiose prouenit.

II. POLYGONATVM latifolium perfoliatum  
Brasiliæ: hoc caule est bicubitali, striato, folia  
perfoliatæ modo tranſeunte: folijs pallide virenti-  
bus, tenuibus, neruosis, vncias duas latis, quatuor  
longis: flore magno, albo, ex folijs quinque angu-  
stis, binas vncias longis composito, qui ex longo  
tenuissimo pediculo dependet: fructum non vidi-  
mus. Hoc in Brasilia apud Toupinambaultios cre-  
uit, & D. Burserus communicauit.

LILIVM CONVALLIVM latifolium: radicibus est  
tenuibus, longis, repentibus: caule pedali, folijs  
ternis, viridibus, neruosis, subrotundis, læuibus,  
palmaribus, vncias quatuor latis, basi sua caulem,  
fistulæ modo ambientibus: floribus magnis, albis,  
rotundis hiantibus, reflexis, & odoratis, quibus  
fructus rotundus, rubeus, semen durum con-  
tinens, succedit. In hortis quibusdam  
colitur.





## DE CHELIDONIA ROTUNDIFOLIA.

## CAPVT VI.

**C**HELIDONIA rotundifolia maior: huius radix fibrosa est, quibus aliquot oblongi testiculi adherent: folijs est subrotundis, crassis, laevibus, ad foliorum Asari magnitudinem accedentibus, sed non nihil quandoq; sinuatis, pediculis semipalmaribus donatis & humi procumbentibus: cauliculo palmo minore, flos insidet, calice triphyllo membranoso sustentatus, qui pallide luteus, magnus, vulgari quadruplo maior, qui ex quinque vel sex folijs, quorum singuli ad medium fissi sunt, componitur & ad eius umbilicum stamina plura rufescentia, conspiciuntur: capitulum cum semine non vidimus. Monspeßuli locis humidis prouenit.

## DE MALVA.

## CAPVT VII.

**I.** MALVA folio ficus: huius folia sunt nigricantia, alpera & crassa, quorum prima, modo intres, modo quinque lacinias inæquales diuiduntur: quædam in lacinias quinque profunde secta, sine ordine sinuata, & per marginem crenata sunt, quorum lacinia aliquæ palmares existunt, & pediculis longissimis & pilosis donantur. Scapum siue caulem simplicem, aliquot cubitorum habet: flores & semina non vidimus, quia ante tempus, Argentina in horto Friderici Meyeri, ante annos viginti legimus.


**II.** MALVA folio vario: radice est alba fibrosa, caule rotundo, cubitali, in plures ramos brachiato, quem folia cingunt pallide virentia, inferne candicantia, crassiuscula & non nihil lanuginosa, sed figuræ, in eodem ramulo, diuersæ, quorū quædam Bryoniae forma, quædam acuminata, duabus alis donata, quædam subrotunda, vngue minora, omnia tamen in ambitu serrata: flores quinquefolij purpurascens, staminibus in umbilico pallidis, pedicellis oblongis insident: semen in capitulis foliaceis semicirculari succedit. Argentina D. Saltzmannus misit.

**III.** MALVA Americana: radicem habet oblongam, albam, fibrosam, caulem angulosum, striatū, lanugine leui oblitum: folia viridia, tenuia, plera-

Malua folio vario.



que semicircularia, vncias duas longa, tres lata, superne angulosa seu sinuata, per ambitum leuiter crenata, pediculis palmaribus, hirsutis donata, flores albi vna cum semine, Maluæ syl. pumilæ similes sunt. Hanc ante annos octodecim in horto D. Saltzmanni, Argentinae collegimus.



florem  
quefo-  
ent: his  
nutissi-  
umidis  
enit.

e maio-  
fibrosæ  
us, nec  
vulgari  
ingulis  
odori,  
lentes,  
cæ suc-  
em ac-  
Apud

liatum  
o, folia  
irenti-  
atuor  
angu-  
longo  
n vidi-  
os cre-

bus est  
folijs  
uibus,  
ulem,  
albis,  
quibus  
con-



## DE ALTHÆA.

## CAPVT. VIII.

**I.** **ALTHÆA** Bryonia folio: caule est cubito altiore, rotundo, lanuginoso, albo; folijs Bryoniae similibus, in quinas lacinias ut plurimum diuisis, palmaribus & alijs, multo minoribus, crassis, nervosis, lanugine nonnihil asperis, parte inferna canescentibus & longis pediculis insidentibus: flores habet purpureo-ceruleos, quinquefolios, superne semilunatos, staminibus rufescentibus donatos, quibus singulis capitulum foliaceum, planum, semen Altheæ simile continens, succedit. Hæc in horto aluimus, quam tamen prius Altheæ arborescentis sempervirentis nomine, D. Doldius: dein Altheæ Americanæ, D. Sprengerus, Heidelbergæ, misit.

## DE GERANIO.

## CAPVT. IX.

**I.** **GERANIVM** malacoides minus: plantula est duarum unciarum, in terram reclinata, radícula longiuscula, exigua, foliolis malacoidi maiori similibus, sed minimis, eleganter incis & longis pedicellis insidentibus: flosculos paruos caruleos habet, quibus capitulum rostro tenuissimo longiusculo donatum, succedit. In agris circa Rothomagum reperitur.

**II.** **GERANIVM** columbinum tenuius laciniatum: radicem habet oblongam, tenuem, fibrosam, rufescentem, ex qua cauliculi plures, palmares, rotundi, hirsutis nonnihil asperi & reclinati prodeunt: folia, quæ vnguem vix superant, rotunda sunt, in lacinias quatuor primum, & hæc in alias, diuisa, & longis pediculis hirsutis prædita: ad cauliculorum latera, flosculi communiter bini, singuli singulis pedicellis insident, parui, carulei, quibus capitula parua rostrata, sive vtriculi tumentes rostrati succedunt, & ubi semen maturuit, vtrinque cum vtriculorum mucronibus, quasi capreolo insidens, modo geminum, modo ternum, ad rostri apicem, quod adhuc supereminet, reflectitur, quod in alijs quibusdam Geranijs etiam obseruauimus: Hoc Monspeßuli in syluestribus reperitur.

**III.** **GERANIVM** cicuta folio acu longissima:

caulibus est bicubitalibus, hirsutis, asperis, angulosis, in varios ramos brachiatis: folijs Geranijs modificatis sive Cicuta modo diuisis: floribus subpurpureis, vel violaceis, quinquefolijs, cuiuslibet acus, uncias quinque, longa, hirsuta succedit, quæ ex vtriculo hirsuto quinquefolio, apicibus donato, semine continente, prodit, quod per maturitatem exilit, & cum vtriculorum mucronibus sursum primum, dein deorsum, alijsq; modo circumuoluitur. Hoc Monspeßuli legimus: in Valesia etiam reperitur.

## DE ALCHIMILLA.

## CAPVT. X.

**ALCHIMILLA** alpina quinquefolia: radicem habet oblongam, nigricantem, fibras plures de se mittentem, ex qua folia aliquot parua, longis pediculis donata & glabra prodeunt, quæ in quinque lacinias ad pediculum, hæc in profundas crenas diuiduntur, inter quæ pediculi bini, terni, tenues, glabri, trium, quatuorve unciarum longi, reclinati: quorum summitatibus flosculi vulgari Alchimillæ forma & colore similes, trifolij, pallidæ herbaceæ, singuli singulis minimis pedicellis donati: quasi umbellæ insident. In monte S. Bernhardi maioris & Gotthardo locis humidioribus, Augusto florens, reperitur.

## DE CANNABINA.

## CAPVT. XI.

**CANNABINA** aquatica similis capitulis nutantibus: radicibus est fibrosis, Ellebori nigri similibus, caulibus pluribus, cubitalibus, hirsutis, in varios ramos scissis: ad singulos ramos folium vnum longum, latum, quandoque serratum, pilosum: ramuli iuxta florem pulchre contorquentur, folia plura habet satis longa, stellæ instar disposita: in quorum medio flos deorsum nutans, ex multis veluti squamis compositus, in cuius medio molli apices lutei: semen in Cannabina aquatica, Hanc in humidis Michelsfeldensibus montibus inuenimus.



## LIBER OCTAVVS.

### DE CARTOPHYLLATA.

#### CAPVT XII.

**C**ARTOPHYLLATA alpina minor: radicem habet crassam, oblongam, repentem, fibris donatam & cortice purpurascens tectam: folia crassa, hispida in lacinias diuisa, in ambitu serrata: inter quæ caulis vnus vel alter, rotundus, hispidus, paucis folijs vestitus, palmo minor: cuius summitati flos vnicus satis magnus, aureus, cum exiccatur rufescens, quinquefolius, multis staminibus donatus: cui villosa congeries cum semine succedit. Hæc in summitatibus Baldi collecta.

### DE PÆONIA.

#### CAPVT XIII.

**P**ÆONIA flore pallido folio hirsuto: huic ex radice aliarum simili, caules angulosi, læues, exurgunt: folia, quorum pediculi nonnihil pilosi sunt, in ternas lacinias, & harum vna rarius in binas diuisa, mucronata, inferne breui lanugine pubescentia & candicante, superne virentia quidem, sed non splendentia, multis venis à medio nervo in latera excurrentibus: caules singuli florem vnicum, reliquis minorem pallecentem, ochrice colore, simplici octo foliorum serie constantem, multis staminulis albis præditum, sustinent. In quibusdam hortis obseruauimus.

### DE QVINQUEFOLIO.

#### CAPVT XIV.

**I.** QVINQUEFOLIUM album maius: radice est crassiuscula, rufa, folijs in quinque lacinias subrotundis vsque ad pediculum diuisis, in ambitu serratis, paucissimis & breuissimis pilis asperis, longissimis & hirsutis pediculis insidentibus, inter quæ paucis pediculis, angulosus, paucis pilis donatus, folijs vestitus, exurgit, & in ramulos binos, & hi in summo in plures alios diuiduntur: quorum singulis flos albus, satis magnus insidet, qui ex folijs quinque in summo diuisis, compositus est: in cuius medio, veluti parvus pappus, vnde plura sta-

minula rufescentia efferuntur. Hoc in mœnijijs vrbis Basiliensi Helueticorum, collectum.

**II.** QVINQUEFOLIUM album minus: radice est nigricante, parua, cauliculis pilosis, erectis, palmo minoribus, in summo diuisis: folijs vnguem latis, in quinque lacinias, extremis oris serratis, diuisis, & breuibus pedicellis insidentibus: floribus est prioris Quinquefolij similibus, sed minoribus. Hoc in saxosis circa Curiam Rhetorum reperitur.

**III.** QVINQUEFOLIUM montanum luteum erectum hirsutum: ex radice nigricante cauliculi & folia exurgunt: cauliculi quidem tenuissimi & seliquipalmares, in summo multifidi, & molli lanugine pubescentes: folia inferiora, longissimis pediculis donata, in septem (at quæ in caule in quinque) lacinias profundas, diuersæ longitudinis, per oras serratas, pilisque donatas, diuiduntur: quæ parte inferna, vt in vulgari, rufescunt, tantillum incana sunt, non tamen splendent: flores habet paruos, aureos, quinquefolios, multis breuibus & croceis staminulis donatos, quibus capitulum aliorum more, semen minutum continens, succedit. In montis Crenzacenensis ad patibulum ascensu, prouenit.

**IV.** QVINQUEFOLIUM similis enneaphyllos hirsuta: radicem habet crassam, nigricantem, in longas fibras abeuntem, à qua cauliculi plures, ad exortum quasi conglobati, per terram sparsi, capillacei, multifidi, tres, quatuorve vncias longi, prodeunt: folijs est oblongis pedicellis donatis, in nouem lacinias angustissimas, per marginem incisas & hirsutæ villolas, diuisis: flosculi parui, aurei, & capitula parua quinquefoliorum modo à pedicellis sustentantur. Ex Helueticorum alpibus.

### DE FRAGARIA.

#### CAPVT XV.

**F**RAGARIÆ affinis sericea incana: radice est lignosa, nigricante, ad quam folia plura, Fragariæ syl. similia sed longe minora, vnguem non æquantia, crassa, vtrinque incana, molli & sericea lanugine tecta, in tres lacinias ad pediculum vsque diuisa & superne crenata: ramulos habet breues, reclinatos, flores paruos, luteos, stellatos sustentantes, quibus capitulum, calice quinquefolio sustentatum, minutum semen

S 2 conti-



continens, succedit. Hanc ante annos circiter quadraginta à Ioan. Bauhino fratre p.m. nomine Leucas aduersarium: & ante quadriennium, à D. Albino qui eam in saxosis Granadæ collegit, sine nomine accepimus.

## DE TRIFOLIO.

## CAPVT XVI.

**I.** TRIFOLIUM montanum purpureum folio acuto crenato: cauliculis est pedibus, firmis, rectis: folijs rarioribus, ternis ab vno exortu prodeuntibus, oblongis, angustis, nervosis, acutis sursumq; spectantibus; in ambitu dentalis, aliquando profundius incisus: in cauliculi summo, flores purpurei, quasi in globo conferti: quod in montosis pratis, Maio, Iunioque florens, reperitur.

**II.** TRIFOLIUM montanum purpurascens folio obtuso crenato: hoc caule estramoliore, folijs oblongis, angustis, sed obtusis & superne & vtrinque crenatis, cuius ramuli, frequentioribus & angustifimis folijs, donantur: flores, quam in priore rariores & purpurascens: in pratis montosis circa Geneuam.

**III.** TRIFOLIUM montanum lupulinum: hoc ramis est cubitalibus, glabris: folijs rarioribus, paruis, subrotundis, leuissime denticulatis, longissimis pediculis donatis: rami fastigio, capitulum lupuliforma, sed oblongum, ex flosculis spadiceis compositum, insidet: quod in montibus supra Ilfeldam prouenit, vbi D. Furerus collegit & transfudit.

**IV.** TRIFOLIUM capitulo spumoso læui: radice est alba, oblonga, fibrosa & capillata, cauliculis multis humi sparsis, tres, quatuor, rarius sex vncias longis, foliolis paruis, ternis, oblongo petiolo hærentibus, per marginem acutiuscule crenatis: floribus paruis luteis, quibus capitula incana, veluti ex pluribus vesiculis sibi inuicem insidentibus composita, spumamq; referentia, succedunt, quibus semen paruum, rotundum & planum inclusum est. Hoc circa Neapolim Italorum, in maritimis: circa Monspelium, in agris & lico Gramuntio reperitur.

**V.** TRIFOLIUM capitulo spumoso aspero maius: radice est oblonga, fibrosa, caulibus bicubitalibus, tenuibus, flexibilibus, à vicinis fruticibus sustentatis: folijs rotundis, trifolio vulgari similibus,

crenatis, prælongis pediculis donatis: inter quæ pediculi nudi, palmares, quandoque pedales efferruntur, qui singuli capitulum subrotundum, nonnunquam parvæ auellanæ magnitudine, ex floribus aureis compositum, sustinent: hos folliculi membranacei sibi inuicem incumbentes, nonnihil à quibusdam filamentis exasperati, sequuntur. Hoc in Salicetis Michelfeldæ Huningam versus, ijs se suffulciens, reperitur.

**VI.** TRIFOLIUM capitulo spumoso aspero minus: huius radix transuersim fertur & fibris capillaceis terræ infigitur: ramulis suis per terram repit, à quibus pediculi biunciales & triunciales, nudi eriguntur, qui capitulum paruum, subrotundum, ex rufescentibus floribus compositum, sustinent, quibus capitulum, quasi ex vesiculis pluribus compositum, subaspermum & initio virens, minutum semen subrufum continens, succedit: folia parua sunt, rotunda & crenata: hoc apud nos ad Rheni ripam, herbido & arenoso loco, iuxta Barræ & circa Monspelium, prouenit.

**VII.** TRIFOLIUM capitulis Thymi: radice est oblonga, alba, tenui, capillacea: cauliculis semipalmaribus, humi sparsis: foliolis ternis obtusis, vni petiolo inhaerentibus, in ambitu serratis, cuius virgulis capitula rotunda, vt in Thymo, flosculorum rufescentium insident, quæ per maturitatem indurantur, minutumque semen subrufum continent. Monspessuli locis siccioribus prouenit.

**VIII.** TRIFOLIUM capitulo oblongo aspero: & hoc radicem habet capillaceam albam, cauliculos plures pedales, læues, rotundos, & quasi articulatos, paucis folijs rotundis vestitos: ex singulis articulis flosculi plures simul iuncti, ijque lutei, prodeunt: his succedunt capitula oblonga, pluribus quasi spinis recuruis donata & per maturitatem exasperata, quibus singulis folium tripartitum subijcitur: & huius, quemadmodum & prædictorum, semen exile est. Patavij, in edito monte prope Arqua, quod longe minus altero, quod Monspessulo habemus, legimus.

**IX.** TRIFOLIUM cochleatum folio minuto obtuso fructu latiore: radice est oblonga tenui, cauliculis aliquot tenuibus, rotundis, palmaribus, in terram reclinatis: foliolis trifolij, sed minimis lente minoribus, obtusis & tenuissime crenatis: floribus paruis, luteis, oblongis pedicellis insidentibus: fructu lato, compresso, aliquot circumuolutionibus in spiras cochleæ modo contorto, semen planum,



planum, recuruum & rufum, continente. Hoc æstate florens in montibus Euganeis & Monspessuli legimus.

X. TRIFOLIUM cochleatum polycarpon: hoc ramis est pedalis, glabris & striatis: folijs trifolio vulgari similibus, longis pediculis donatis, singulis petiolis vnguem latis, tenuibus, subrotundis, minime crenatis: pediculorum extremis flosculi parui, flauis insident quibus succedunt fructus plures, quini, seni, quasi conglobati, sed parui, in spiras conuoluti & spinulis mollioribus donati: quod in Italia collegimus.

2. Huic simile est alterum, solum folijs à priori differens, quorum quædam subrotunda, pleraque acuta, omnia tamen per marginem incisa, vel crenata.

XI. TRIFOLIUM cochleatum echinatum minus: ex radica prælonga capillacea, cauliculi plures, tenues, fragiles, repandi, palmares prodeunt, foliolis trifolij, sed paruis, iisque obtusis & crenatis, cincti: flosculis est paruis, aureis, communiter vno (rarius pluribus) oblongo pedicello ca-

pillaceo insidente, cui folliculus cochleæ modo circumuolutus, minimis spinulis exasperatus, plerumque vnus, iisque paruus (rarius terni quaterni vno pedicello donati) succedit, semina parua, plana, semilunata, rufa, continens. Ex Italia habemus.

XII. TRIFOLIUM fructu duro, spinis horrido: caulem habet pedalem, recuruum, per terram sparsum, folijs raris, subrotundis & superne crenatis cinctum: florem luteum, fructum Tribuli terrestris instar durum, sed rotundum & maiorem, eumque plerumque geminum, per maturitatem album, multis spinis horridum. Monspessuli legimus.

XIII. TRIFOLIUM folliculis coronæ similibus: radica est capillari, cauliculis aliquot, nonnihil hispidis, ramosis, palmo minoribus, folijs trifolij minutis, obtusis & crenatis, cincti: flosculis luteolis, oblongis pedicellis donatis, quos sequuntur folliculi minimi, sibi insidentes & formam coronæ regiæ referentes. Monspessuli provenit.



S. 3


XIV. Tar-



Trifolium peltatum Creticum.



Trifolium spinosum Creticum.



XIV. TRIFOLIUM peltatum Creticum: ex radice tenui, oblonga, fibrosa, cauliculi exurgunt palmo minores, pede nudi, folijs parvis, tripartito diuisis, parum crenatis, oblongis pediculis donatis, vestiti: cauliculorum summis flosculi quaterni, quinive ordine succedentes, forma Ornithopodij, luteo-pallidi insident: quibus siliquæ luteæ, planæ, membranæ, quasi semicirculares, in filamentum abeuntes, semen vnum vel alterum paruum compressum continentes, succedunt: quæ dum molles sunt, dulcissimæ, esui aptæ, at vbi indurauerint amarissimæ. Hoc rusticis in Creta, *κακωρία*, dici, D. Honorius Belli auctor est,

qui Trifolij Cretici odorati nomine misit.

XV. TRIFOLIUM spinosum Creticum radicem habet oblongam, capillatam, caules plures, palmares, & sesquipalmares, versus terram reclinatos, angulosos, in frequentes ramulos brachiatos, frequentib. geniculis, ex viridi purpurascens cinctos: ramulos cingunt, vtrinq; ex opposito sibi respōdentia, tria folia vni petiolo inharētia, viridia, oblonga, acuminata, in minimam spinam abeuntia: quemadmodum etiam ad singula genicula, spinæ quatuor paruæ, aduncæ superne binæ, totidem inferne adpositæ sunt: vnde brevis pediculus exurgens, florem singularem, quinquifolium, Campanulæ



nulæ aruenfis forma & colore (siue purpureo caruleum) similem, capitulo viridi insidentem, sustinet, in cuius medio stamina decem, apicibus luteis prædita, capitulo inter ea latente conspiciuntur: quod capitulum postmodum quinque angulis donatur, styloque prominente augetur, & per maturitatem petiolo incuruato ramis se recondit, & in singulis angulis, semen vnicum compressum, rufum, continet. Hoc primum, nomine Trifolij spinosi sempervirentis Cisti flore, Patauio à Laurentio Rosena accepimus, postmodum apud fratrem Ioh. Bauhinum p.m. Montembelgardii collegimus, cuius semen *ὀψιτροχόπος* nomine missum fuerat.

XVI. TRIFOLIUM stellatum: ex radice alba, tenui, oblongiuscula, capillata, cauliculi prodeunt, modo pauciores, bini, terni, modo plures, quini, seni, septeni, semipalmes, palmes, rarius longiores, rotundi, lanuginosi, incani, quandoque rufescentes, inanes, rarissime in alas diuisi: folia habet parua, Trifolij modo diuisa, mollia, villosa, in summo sinuata, & ad radicem oblongis pediculis donata, duobus alijs ad pediculi nexum adnatis: cuilibet cauliculo, spica rotunda, ex floribus oblongis, rubris, rarius luteis, composita insidet: qui ubi delabi incipiunt, spica magis orbiculata redditur, quasi ex pluribus stellis simul iunctis composita foret: etenim flori cuilibet capsula (vel vtriculus) oblonga, villosa, in quina, oblonga, acuminata foliola abiens, succedit, quæ semen ut plurimum vnicum, idque rufum & planum continet. Hoc Monspefuli, Maio mense collegimus: at per omnia minus, ex Hispania accepimus.

XVII. TRIFOLIUM globoflo flore, vel capitulo Lagopi rotundiore: radicem habet longam, fibrosam, capillaceam, albam: caules plures, tenues, rotundos, palmo minores, quandoque pedales, in ramulos leuiter hirtutos diuisos: quos folia parua tripartita, non nihil pilosa, per ambitum crenata cingunt, quibus iuxta pediculum communiter duo alia subiiciuntur: cauliculorum summis, flores parui, lutei insident, quibus capitulum rufescens, sphaericum, ex apicibus asperis compositum, succedit: Maio mense, Monspefuli circa Castelnouum copiose prouenire obseruauimus.

XVIII. TRIFOLIUM globofum repens: radice est exili, capillacea, rufescente, cauliculis aliquot per terram sparsis trium quatuorve vnciarum, mollibus, lanuginosis & rufescentibus, foliolis paucis superne sinuatis: cauliculorum summis capitulum globofum, plurimis apicibus villosum, insidet: flosculis enim rufescentibus, vtriculi, pluribus apicibus rufescentibus donati succedunt, quorum singuli semen minutum includunt. Monspefuli in loco Gramuntio, & iuxta castrum Episcopi, prouenit.

XIX. TRIFOLIUM saxatile hirsutissimum: radice lignosa, transuersim repenti, rufo cortice tecta, quasi truncis ex multis plantulis simul iunctis, caule carentibus, insidet: tota planta duas tresve vncias non superante: folia habet Trifolij parua, mollia, incana & velut argentea, superne crenata & pedicellis breuissimis insidentia: inter ipsa folia, capitula parua, rotunda, longiusculis pedicellis donata, in quorum medio, pili breues, inoliffimi, stantes, conspiciuntur: nec florem nec semen vidimus, & in Heluetiorum altissimis iugis legimus.

XX. TRIFOLIUM alpinum flore magno radice dolci: radice est longa, crassa, cortice pallescente tecta, medulla candida dulci, multis capillis tecta & fibris aliquot oblongis donata, ex qua cauliculi plures in terram reclinati prodeunt, quos folia trifida, oblonga, angusta, & glabra, paucis & ad tactum sensibilibus crenis, & oblongis pediculis donata: inter quæ pediculus communiter vnus (quandoque duo) læuis & nudus, trium quatuorve vnciarum, exurgit, cuius summitati flores Astragalo siue Onobrychidi forma similes, purpureascentes, magni, octo vel decem, quasi spica orbiculari insident: qui singuli ex calice oblongo, quinque apicibus donato prodeuntes, singulos pedicellos obtinent.

Hoc primum ex Bernaturn alpibus, ante quadraginta annos habuimus: dein, in plantis Horti Dei apud Monspelienfes, mense Iunio cum floribus, sed illo multo maius, legimus. Radix sapore est Glycyrrhizæ; hinc forte Glycyrrhiza Astragaloides, vel Astragalus dulcis dici possit: ex Hispania Glycyrrhizæ Hispanicæ nomine accepimus.

XXI. TRI-



XXI. *TRIFOLIUM corniculatum* minus pilosum: radícula est capillacea, cauliculis pedibus, tenuissimis, rufescentibus, subtilissimis pilis aspersis, folijs parvis, acutis & hirsutis, in breui pediculo ternis, duobus alijs ad pediculi nexum adnatis, ex quorum alis, pediculilongi capillacei exurgunt, flosculum vnum, vel alterum, coloris ad croceum vergentis, sustinentes: quibus singulis, siliquæ oblongæ, strictissimæ, modo vna, modo duæ, minutissimum semen continentes, succedunt. Hæc Monspeffuli in syluulis, & pratis inter montem Lupi & Calcaris prouenit.


XXII. *TRIFOLIUM corniculatum* frutescens, tenuissimis folijs: caulibus est tenuibus, viridibus, glabris, pedibus, in plures ramos palmo minores, brachiatis: folijs vt in priori, sed angustissimis, cinctis: cauliculorum summitatibus, quemadmodum & pedicellis, ex foliorum alis, prodeuntibus, flosculi bini, terni, rarius quini in orbem dispositi, lutei coloris, insident: quos siliquæ binæ, ternæ breuiiores & crassiores, quam in priore, in longum apicem desinentes, in quibus semina exigua, sequuntur. Monspelio habemus, quemadmodum etiam ex Italia: ad hoc minus est, folijs & siliquis paulo latioribus, inque breuiorem apicem desinentibus.

XXIII. *TRIFOLIUM angustifolium* repens, folliculis rotundis: radicem habet albam oblon-

gam, tenuem, capillaceam, à qua cauliculi plures semipalmares, rarius palmares, per terram sparsi, vtrinque prodeunt: circa quos foliola oblonga tribus petiolis pediculo insidentia, quæ leuia sunt & per marginem crenata: ex quorum alis pediculi emergunt tenues, oblongi, quibus flores parui, luteoli octo, nouem, decem & quandoque plures alternatim dispositi, affiguntur: his totidem folliculi rugosi, singuli semen vnum continentes, succedunt. Hoc Monspeffuli in aruis, & ad pedem montis Lupi D. Saltzmannus legit.

XXIV. *MELIOTUS* Hispanica folijs maculatis: ex radice parua, ramuli palmares, aliquando pedales, tenues emergunt, quos ambiunt folia bina hinc inde, ex quorum alis petiolam prodians, tria folia sustinet, obtusa, atrouentia, & ob venas candidas per ea discurrentes, maculata: flores parui pallidi. Hæc in montibus Castiliæ frequens

est, vnde D. Albinus attulit.



LIBER



# LIBER NON VS.

## DE RVBIA ET GALLIO.

### CAPVT I.

**I.** RVBIA montana angustifolia: radicem habet rufescentem, fibrosam, caules cubito altiores, læues, rotundos, striatos, geniculatos: folia ad quodlibet internodium oblonga, angusta, Galij forma, sena, septena, in orbem disposita, & rigidiuscula caulem ambiunt: ad internodia, breuissimi ramuli exurgunt, ipse vero caulis in ramulos plures brachiatur, quorum summis, flosculi frequentes, albi quadrifolij insident, quibus semina minuta rotunda, quodlibet suo pedicello donatum, succedunt. Hæc apud nos in asperis collibus legimus: quam & Montpelio, sed folijs subtilioribus, breuioribus, & asperiusculis, quemadmodum quoq; ex Austria, apud quos hinc inde in petris reperitur, habemus. Hanc, Gesnerus in lib. hortorum Germaniæ nomine Rubiæ Syluaticæ longioribus & angustioribus folijs, nulla descriptione addita, forte intellexit.

**II.** RVBIA pratensis læuis acuto folio: ex radice caulis cubitalis, læuis, quadratus, rufescens, geniculatus, cauius, & communiter vnus exurgit, ex cuius nodis ramuli semipalmares prodeunt, quorum summis flosculi plures quadrifolij, pallidi (semen non conspectum) insident: folia læuia quaterna, vncialia, in acumen abeuntia, ad quemlibet nodum in orbem disposita sunt. Hæc apud Valesianum in pratis ad thermas Leucenses nata, quam etiam in pratis Lipsensibus reperiri, relatum fuit.

**III.** RVBIA quadrifolia rotunda læuis: ex radice capillacea rufescente, cauliculi tenues quadrati, geniculati, palmo altiores, quorum aliqui in ramulos brachiati exurgunt: ad singula genicula folia quatuor rotunda, neruosa, tantillum aspera in orbem disponuntur extremis cauliculorum, flosculi albi, quadrifolij, pedicellis capillaceis insident, quibus capitulum paruum, geminum, asperiusculum, succedit. In montibus Helueticorum, vt Gote-

hardo, & ad Eremitanos prouenit: hanc & circa Argentinam crescere dicunt.

**IV.** RVBIA angustifolia spicata: à radice tubrosa, lignosa, & paucis fibris capillata, cauliculi exeunt quadranguli, nodosi, palmares, ramulis ad nodos ex aduerso nascentibus præditi, & nodos, folia plura capillacea, vt in Polygono Knaut dicto, sursum spectantia, in orbem ambiunt: cauliculi in longam tenuemque spicam, ex vtriculis paruis acuminatis compactam, abeunt: flores & semina non vidimus. Monspeßuli in collibus nascitur.

**V.** RVBEOLA aruensis cærulea repens: radice est oblonga, tenui, capillacea, rubra, cauliculis in terram reflexis, quadratis, geniculatis, semipalmaribus, rarissime pedatibus: ad quodlibet geniculum folia habet parua, subrotunda, quina, sena, in orbem disposita, asperiuscula, & in acutissimum apicem desinentia: ex geniculis hinc inde prodeunt pedicelli, quibus quina, senaue similiter folia insident: ex his quemadmodum in cauliculorum summis, flores parui cærulei, vel ex cæruleo purpurascētes, quinquefolij insident, quibus semina oblonga, acuminata, sena, octena, binis tamen simul iunctis succedunt. Hæc passim in agris nostris, etiam autumnoflorens occurrit, quam forte Rubiolæ aruensis nomine Camerarius in suo horto, nulla descriptione addita, intellexit.

**VI.** RVBEOLA saxatilis: plantula est tota incana, semipalmaris, cauliculo tenui, quadrato, geniculato, in vnciales ramulos brachiato: folia parua, aspera, angusta, acuminata, cōmuniter octo, rotæ modo disposita habet: ramulorum summis flosculi plures, exigui, quadrifolij apicibus, & minimis pedicellis donati, luteoli, si recte recordor, insident. In saxosis Gallo prouinciæ.

**VII.** RVBEOLA maritima aspera: radice est oblonga, tenui, repente & rufescente: cauliculis

olures  
parfi,  
ga tri-  
nt &  
diculi  
ni, lu-  
res al-  
liculi  
edūt.  
is Lu-

s ma-  
quan-  
folia  
liens,  
venas  
spar-  
ens

BER



liculis pluribus geniculatis, biuncialibus, per terram sparsis, & capillaceis fibellis terræ affixis, foliis pluribus, breuib, acuminatis, virentibus, & asperis, cauliculos inordinate cingentibus: flocculis minutis, pallidulis. Hæc copiose in littore maris Mediterranei, non longe Monspelio, & etiam Massiliæ occurrit.

VIII. RYBIA cynanchica saxatilis: ex radice alba, oblonga, tenui & fibrosa, cauliculi plurimi, trium, quatuorve uncium longi, foliis plurimis, oblongis, angustissimis, & viridibus, vestiti, exurgunt: & inter hos pediculi bini, terni, palmares, graciles, in ramulos diuisi, & paucissimis foliolis vestiti, quibus flores, ut in Cynanchica vulgari, pallide rubescentes, singuli singulis pedicellis donati, insident. Hæc in saxosis vdis circa Valentiam Delphinatus, à D. Bursero collecta fuit.

GALLIUM latifolium glabrum: radice est tenui, repente, geniculata: cauliculis tenellis, quadrangulis, geniculatis, palmo minoribus: folijs è singulis internodijs quaternis, decussatis, glabris, instar plantaginis nervosis, pallide virentibus, & sesquiuncialibus: flores habet paruos, cauliculos verticillatim coronæ modo ambientes, luteos, breuib, pediculis donatos. Hoc circa Bononiam.

inter sentes, tota æstate,  
reperitur.



Thalictrum angustissimo folio.



DE THALICTRO.

CAPVT II.

I. THALICTRYM angustissimo folio: radice est flauescens, ex aliquot fibris, oblongis, crassiusculis, composita: caule bicubitali, læui, rotundo, p̄funde canaliculato, & geniculato: ex quolibet geniculo folia plura prodeunt, in plures oblongas, & plerasque angustissimas, tandem & ternas lacinias, secta: at caulis, in fastigio in ramulos diuiditur, in quibus flores plures muscosi, pallidi, ad luteum vergentes, velut in oblonga spica dispositi, quos valuulæ tenues, paruæ, minutissimum semen continentes, sequuntur. Hoc in pratis Michelsfeldensibus æstiu mensibus florere, quod Ruram.



tam pratensem maiorem quintam Tabernæmontani esse, minus recte suspicati sumus.

II. *THALICTRUM* minimum foetidissimum: caule est pedali, rotundo, in ramulos diuiso: foliis pluribus in tres lacinias diuisis, anterius duabus incisuris denticulatis, superne atrouirentibus, inferne pallefcentibus: in ramulorum fastigijs flosculi parui, muscosi, ex plurimis staminulis compositi, quibus succedunt exiguae valuulae, oblongae, senae, septenae, striatae, apice incuruo donatae, sibi-que inuicem iunctae, capillaceo oblongo pediculo insidentes, semen exiguum includentes. Tota planta odorem foetidissimum spirat, & in Valesia reperitur.

Simile, sed caule expuniceo colore purpurascente, *Thalictri* maritimi minimi nomine, *D. Gilenius* misit.

## DE FABA ARBORESCENTE.

## CAPVT III.

**F**ABARVM differentiae plures dantur, at solum Fabae arborescentis hoc loco meminisse lubet. Fabae arborescentis Anglicae nomine, species sex Amstelrodamo, à *D. Iacobo Guilhelmi Hooft* anno 1614. una cum quam plurimis alijs fructibus exoticis accepimus: quarum prima lata, compressa, cordis humani figuram refert: siquidem circa umbilicum veluti ad basim sinum habet semicircularem, & sensim ex rotunditate in obtusum apicem definit; cortice rufo, splendente tegitur, cuius interior pars, siue caro subiecta, rufa dura, densa; existit: quo ad magnitudinem, uncias tres lata, & quatuor longa est, & in duas partes finditur.

Altera priore minor est, magis compressa, figuraque magis rotunda, & parte superiore non secus, quam prior, profundum umbilicum semicircularem obtinet, & multo quam alijs partibus crassior: cortice est nigro, striato, tenuiore, & carne pauciore.

Tertia, priore adhuc minor, magisque plana, atque compressa, etiam nigro cortice tecta, uncias duas lata, tres longa, & parte superiore umbilico, non vt in duabus prioribus semicirculari cauo, sed oblongo.

Quarta, à proxima solum crassitie, & corticis colore spadiceo, differt.

Quinta, colore quidem, cum quarta conuenit,

sed quadruplo crassior est, & aliquomodo os Scapulae refert: siquidem ad umbilicum, ubi unciam crassa, sinus pollicis unguis latitudinem aequans, acetabulum Scapulae refert, vtrinq; costas tenues obtinet: nam sensim oblongatur, in fine rotundatur, & ad latera sensim angustior redditur: at per medium linea extuberat.

Sexta, lata est, & compressa humani unguis similitudine, & magnitudine, nigro cortice tecta, superne umbilicum paruum cauum obtinente.

## DE PISO.

## CAPVT IV.

**P**ISVM vmbellatum: & Pisorum differentias praeterire lubet, & solum Pisi vmbellati historiam breuem subijcere. Hoc caulibus est longis, striatis, fistulosis, fragilibus, ramosis, & per maturitatem albis: folijs aliquot oblongis, vni costae aduerso situ adnatis, quae parte extrema, capreolorum modo in clauiculas, quibus se vicinis implicat, definit: flores habet albos, circa umbilicum purpurea nota insignitos, in summitate caulium velut in vmbella dispositos: hic succedunt filiquae duarum unciarum, in formam vmbellae situatae, in quibus Pisum rotundum, album, communiter vnum, vel duo, rarius tria, vulgaribus maiora continentur. Germanis, apud quos licet rarius, in hortis colitur, *Wüschelerbs* / id est, Pisi in fasciculum iuncta, appellantur.

## DE CICERE.

## CAPVT V.

**C**ICER montanum ἀκρυλον: radice est longa, in profundum, nisi fissilium lapidum interuentu prohibeatur, descendente, à qua exurgunt pediculi palmares, tenues, hirsuti, vtrinq; folijs duodenis, & pluribus subrotundis, sed non nihil, quam in Cicere satiuo longioribus, marginibus hirsutis, modo aequaliter, modo inaequaliter ex aduerso nascentibus, folio tamen extremo impari, vestiti: flosculi ad radicem oblongiusculi, pallidi, forma ad florem Loti tetragonoboli accedente: his succedunt filiquae praetumidae, duabus valvulis constantes, semine reniformi, Medicæ in morem flauescente, praegnantis. Vernis mensibus floret,



ret. in montibus Thuringiæ circa Northusam, unde D. Furerus anno 1616. transmisit.

I. Cicer montanum lanuginosum erectum: ramis est pedilibus, rectis, rotundis, molli lanugine hispidis, in ramos semipalmes, etiam multo nupiores, brachiatis, in quibus folia Viciæ sylu. forma longa, modo latiora, modo angustiora, mollia, leni lanugine oblita, dena, duodena & totidem ex aduerso eidem costæ inharrentia, extremo semper impari numerum faciente: ramulorum apicibus spica florum pallidorum & hirsutorum insidet, quos sequuntur siliquæ oblongæ, lanuginosæ, in exiguum filamentum recuruum desinentes, quæ semen nigrum minutum continet.

Hoc angustioribus folijs, in Valesia ad Thermas Leucenses, Julio florens reperitur: at quod folijs paulo latioribus, Ciceris montani erecti Thuringiani nomine, à D. Furero, & Ciceris astragaloidis erecti Fræncenhusanorum à D. Iungermanno accepimus, quod in montibus Francenhusanis copiose reperiri scripsere.

## DE LUPINO.

## CAPVT VI.

LUPINVS cæruleus maior villosus: radice est lignosa rufescente, fibrosa: caule cubitali, firmo, rotundo, striato, molli lanugine obfuso (nam in hoc longe maior est hirsuties, quam in alijs Lupinis) in summitate in paucos ramulos diuiso: ramulis quandoque etiam subalaribus, rudimenta floris futuri habentibus, qui raro nostro cælo perficiuntur: folia septena, octona, molli lanugine oblita, & quam in cæteris latiora, stellæ in modum disposita, pediculis villosis, tres, quatuorve uncias longis insident, quæ decidue sunt, maxime ubi semen perfici incipit: flores magni sunt, eleganter cærulei, & inodori (rarius floribus est incarnatis) semper quini in ordine seu verticillatim dispositi: ita ut quam plurimum quatuor, raro quinque ordines conspiciantur: & quo planta perfectior fit, eo etiam magis à se inuicem distinguuntur, & quintus ordo plerumque perit, dum inferiores semen perficere student: siliquæ sequuntur hirsutæ, unciam lata, duas longæ, sed paucae, cum ex quinque ordinibus vix binæ singulo ordine proventiant (quod raritatem & peregrinam plantæ naturam ostendere videtur) quæ semen vulgaribus maius compres-

sum, & rufescens, quandoque strijs variegatum, continent. Huius semen anno 1593. Lupini Indici nomine, D. Doldius Norinberga, ipsam vero plantam Lupini-Cretici appellatione, D. Springerus Heidelbergæ misit: quem Lupinum quartum, Clusius in postrema historia facere videtur.

II. LUPINVS minimus: ex radícula oblonga capillacea, cauliculus tenuis, palmaris, quam minimum hirsutus exurgit, circa quem foliola quina, sena, septena, breuia, angustissima, subhirsuta, quæ oblongis pedicellis insident: flores & semina nondum vidimus: plantam Lupini Africanæ minimi nomine, ex horto nobiliss. Contareni habemus.

## DE LATHYRIDE.

## CAPVT VII.

LATHYRIS angustissimo siue capillaceo folio: plures Lathyridis differentias in foliorum latitudine & angustia, floris colore, siliquarum forma, hirsutie, & læuitate hic præterire lubet, & solum meminisse Lathyridis angustissimo folio, quæ radice est exili cauliculis cubitalibus infirmis, quibus hinc inde, & aduerso situ bina minima foliola adnascuntur, è quorum sinu bina, nonnunquam terna folia capillacea, trium, quatuorve unciarum longa, & surrecta, exiguo pedicello innixa, vna cum pediculo in multitudine capreolum desinent, prodeunt, ex quo etiam pediculus tenuissimus, oblongus & nudus effertur, qui florem vnicum, paruum, subcæruleum, quandoque pallide rubentem sustinet: quo defluxo, siliqua uncialis in apicem falcatum abiens, bina, ternave grana parua rotunda nigricantia, continens succedit.

Montepessuli in collibus, Maio florens, reperitur.



—o—(—)—o—



DE



## DE VICIA.

## CAPVT VIII.

**V**ICIA Onobrychidis flore: & Viciarum quamuis differentias plures obseruauerimus, attamen in præsens vnus solum descriptionem subiicere lubet. Hæc caules habet pedales, teretes, striatos, quos foliorum alæ, vt in Vicia vulgaris, sed breuiiores & angustiores, vni costæ ex aduerso respondentes, ambiunt, capreolis extremum occupantibus: ex foliorum alis superioribus, pediculi semipalmares, nudi exurgunt, quorum summitatibus flores plures oblongi, galeculati, Onobrychidis Clusij forma similes inferne pallidi, superne violacei coloris insident: floribus succedunt siliquæ planæ, deorsum reclinatæ, semina exigua, fena, septena numero, continentes, Monspeßuli prouenit.

DE CAPITÆ GALLINACEO, ET  
*onobrychide.*

## CAPVT IX.

**C**APITÆ Gallinaceum minus: ex radice tenui oblonga, fibris caræte, cauliculos aliquot palmares, & semipalmares profert, eosque vt plurimum procumbentes, & in ramulos diuisos: folia vulgaris, siue maiori similia, sed breuiora & angustiora: flores habet paucos, paruos, dilute rubentes, breuibus pediculis insidentes: fructus parui, asperi, echinati & subrotundi succedunt. Hoc in maritimis & arenosis Prouincijs, & iuxta Olbiam, & in montosis iuxta oppidum Vigan, reperitur.

I. **ONOBRYCHIS** clypeata aspera minor: a radice crassa, fibrosa, cauliculi semipalmares, reclinati prodeunt; circa quos foliola multa, breuia & angusta, aduerso situ costæ adhærentia: flosculi elegantiori colore rubentes, parui, Genistæ forma similes, pedicellis insident: sequuntur fructus clypeolis exiguis similes, plani, asperi, semen minutissimum continentes. Monspeßuli in planitie Lupi collecta.

II. **ONOBRYCHIS** clypeata læuis: ex radice rufescente, paucissimis fibris donata, caulis vnus (nonnunquam duo) pedalis, nodis distinctus, exurgit: circa quem folia alata, ex senis, septenis v-

trinque fibris oblongis, glabris, vni costæ innatentibus, vnoque extremam aliam occupante composita: ex alis, tenues, & oblongæ virgulæ, flores purpureo cæruleos, velut in spica dispositos, sustinentes, prodeunt, quos sequuntur fructus plani, leues, clypeiformes, communiter terni, sibi inuicem per longum coherentes, semen minutum includentes. In Heluetiorum alpidibus, vt monte Fræto, & ad Thermas Fabarias prouenit.


III. **ONOBRYCHIS** incana: caulem habet rotundum, ramosum, incanum: folia plura, acuminata, angusta, vni costæ adnexa, incana velut cinere asperia: cauliculi semipalmares, nudi, spicam florum purpurascens, aliorum forma sustinent: quibus succedunt siliquæ oblongæ, incanæ, incuruo mucrone donatæ, duabus valvulis constantes, semen minutum, nigrum, planum, & semicirculare continentes. In Prouincia Galliæ reperitur.

Alteram, non minus incanam, sed minorem, semipalmarem, folijs breuioribus & rotundis, ex Aragoniæ & Castiliæ saxosis, D. Albinus attulit.

## DE OROBO.

## CAPVT X.

**O**ROBUS alpinus latifolius: ramis est cubitalibus, aut altioribus, angulosis, viridibus: folijs in singulis alis octonis, vni costæ adnatis, & sibi inuicem oppositis, vncias tres longis, duas latas, viridibus, neruosis, & cæteris Oroborum folijs minus acutis: è virgulis ex alarum cauis palmaribus nudis prodeuntibus, flores vnciales, Genistæ forma, pallide lutei, at folio superiore rufescente, dependent stylo ex illorum medio prominente: lobos & semina non vidimus: ex Pyrenæis & Heluetiorum alpibus habemus.





## DE GLAUCE LEGUMINOSA.

## CAPVT XI.

**G**LAUCI Leguminosæ affinis: radicem habet albam, oblongam, paucis fibris donatam, ex qua caulis bicubitalis, & altior, satis crassus, rotundus, rubescens, cauus, paucis & breuibuspilis aspersis, prodit, & nisi sustentetur, procumbit: at frequenter ad cubiti solum altitudinem accedit, nec fulcimine opus habet: hic in alios ramos diuiditur: folia habet Glauco leguminosæ similia, duodecim etiam quatuordecim, & pluribus, vtrinque ad costam ordine dispositis, nec in ambitu serratis, & elegantivirore nitentibus: ex foliorum sinubus pe-

diculi prodeunt, flores pallide luteos, modo vnum communiter plures, forma Glauci leguminosæ similes sustententes: hos sequuntur siliquæ crassæ, coniunctæ, vnciam longæ, triangulares, in breuem apicem abeuntes, semina angulosa, per maturitatem ex viridi flauescencia, continentes. Huius semen Araci Boetici nomine, à D. Io. Pona Verona accepimus, & ab annis aliquot in hortulo nostro habuimus: nam licet planta annua sit, attamen ex semine deciduo sese propagat. Tota planta ingratisaporis est: folia commanducata, herbaceum primum & ingratum, dein amarum saporem in faucibus relinquunt.



## LIBER DECIMVS.

## DE OPHIOGLOSSO.

## CAPVT I.

**I.** OPHIOGLOSSVM anguloso folio: ex radice crassâ, in fibras crassas abeunte, vnus vel alter pediculus, vncias quatuor longus, post medium dilatatus, effertur, cui folium vnicum, vncias tres longum, sesquiunciam latum, ad exortum vtrinque dilatatum, & angulosum insidet, & stylum sesquiunciam linguam referentem, pediculo donatum obrinet. Helmstadio, D. Sigfridus misit.

**II.** OPHIOGLOSSVM minus; radiculis est fibrosis, pediculo simplici & breui, cui folium vnicum, subrotundum, vnciam latum, sesquiunciam longum insidet: ad cuius exortum, & veluti è folij sinu, stylus serpentis linguam referens, vnciam longus exit: in humidis circa Monspelium prouenit.



## DE ADIANTHO.

## CAPVT II.

**A**DIANTHVM fruticosum Brasilianum: hoc Filicis instar excrecit, caule tenui, leui, subnigro puniceo colore nitente, qui in alios subdiuiditur, circa quos folia viridia, Adiantho vero aliquantum similia, parua, oblonga, sed obtusa, superne tantum incisuris diuisa, inferiore costa, qua capillaceo insident, integra, alternatim cauliculo, & quidem vtrinque duodecim vsq; ad viginti, petiolis, per pedicellum iunguntur. Apud Tououpinambaultios in Brasilia natum à D. Bursero accepimus.

## DE FILICE.

## CAPVT III.

**I.** FILIX palustris maxima: radice est omnium Filicum crassissima, duos pugnos superante nigra, velut ex crassissimis squamis cōpacta, & multis fibris



fibris nigris capillata, vnde exurgunt folia plura at-  
trouirentia, tres cubitos superantia, in latus am-  
plissime expansa: quorum pediculus rufescens, an-  
gulosus, cauus, instar oblongi auriscalpij ex radice  
prodit, qui vbi pedalem altitudinem adeptus est  
foliosus redditur, ad modum Filicis maris vulga-  
ris: nam veluti ex plurimis pinnis, secundum mar-  
gines crenatis, & ad vnum pediculum cohærenti-  
bus componuntur. Verum ad radicem, inter me-  
dia folia, plura foliorum rudimenta cubitalia, vel-  
uti futurorum principia, conspiciuntur, eo modo,  
quo in Filice florida, siue Osmunda dicta, circa  
summos ramulos apparent: à qua tamen differt, q̃  
Osmunda caules edat, & caulium summis, veluti  
flores siue seminum rudimenta adhæreant, & folia  
habeat latiora, & haudquaquam per margines ser-  
rata. Hanc locis palustribus, circa thermas Marchicas  
copiose obseruauimus: aliquando in editis & sa-  
xosis, sed humidis montibus etiam reperitur, vt  
circa Râmstein arcem Basileensem notauimus.

II. FILIX mas aculeata maior: radicem habet ni-  
gram, fibrosam, pediculos pedales, foliosos, in  
multas alas pinnatas, modo maiores, modo mino-  
res, modo minores profundius diuisos pallide vi-  
rentes, primis in ambitu dentatis, & in breuem spi-  
nulam desinentibus. Hanc in monte Wasserfall le-  
gimus.

III. FILIX mas aculeata minor: hæc pinnulis est  
breuibus, totis integris, non dentatis, sed in spinu-  
lam acutam breuemq; omnibus desinentibus: eo-  
dem quo prior loco, licet eam postmodum à D.  
Furero, ex Hircynia & Stolberga veteri, acceperi-  
mus.

## DE MUSCO.

## CAPVT IV.

I. MVS CVS pennatus: hic colore est ex luteo-  
virescente, lateq; serpit, multis viticulis, sed  
breuibus, ramosis, minutis folijs pennam æmulan-  
tibus vestitus, qui fibras tenues pro radicibus ha-  
bet: in petrosis & syluis reperitur.

Huius altera species, radice rufescente ex co-  
piofissimis fibris composita, viticulis ramosiori-  
bus, folijs minoribus: in sylua Vilenfi, locis vligi-  
nosis prouenit.

II. MVS CVS filicinus minor: huius aliquot dif-  
ferentias obseruauimus: sed hic solum de minore  
agemus, qui per terram serpit, cauliculis tenuibus,

in summo ramosis, foliolis Filici similibus, sed te-  
nuissime dissectis: ex ramulis, pedicelli aliquot ca-  
pillares rufescentes, biunciales, efferuntur, quibus  
singulis capitulum exiguum, subrotundum, incur-  
uum, in apicem exiguum desinens, insidet. Hunc,  
cum alijs D. Iungermannus misit.

III. MVS CVS Abietis facie: prædicto non mul-  
tum ab similis, viticulis in ramos diuisis, folijs ca-  
pillaceis, vtrinq; (vt in Abiete) costæ oblongiuscu-  
læ adnatis, multo quam in priore breuioribus, &  
viridioribus.

IV. MVS CVS ramosus repens, velut spicatus:  
hic ad arborum radices, nigris radiculis terræ affi-  
gitur, viticulis crassis, & longis serpit, & de se co-  
piosas veluti spicas oblongas, ex tenuissimis & le-  
uissimis foliolis compactas, ramulorum instar e-  
mittit.

Hic similis & alter, foliorum tantum apicibus  
candicantibus discrepans: vterq; in monte Crent-  
zacho ad arborum radices crescit.

V. MVS CVS ramosus erectus maior: hic cespitis  
instar eleganter & arctissime quasi compactus, ex  
radicibus oblongis capillaceis, cauliculum trium  
quatuorve vnciarum emittit, qui in binos, ternos,  
quaternos, biunciales, etiam triunciales ramulos,  
& hi quoque in alios erigitur, qui minimis capilla-  
ceis foliolis vestiuntur: inter ipsa foliola, pedicelli  
vnciales, nudi, capillacei, capitulum, vt in Adianto  
aureo, sustinentes, efferuntur. Hic in Crentzacho  
môte ad arborum radices, alijs Muscis commixtus  
conspicitur: at elegantior & viridior, ad sepes circa  
Bursam flumiuium reperitur.

VI. MVS CVS ramosus erectus minor: ex capilla-  
cea radícula cauliculus ad summum biuncialis var-  
ie diuisus foliolis vix conspicuis cinctus, emer-  
git: eodem, quo tres priores, loco prouenit.

VII. MVS CVS saxatilis ericoides: huic circa ra-  
dicem folia multa Musco vulgari similia, inter quæ  
viticuli sunt palmares, asperi, foliolis Ericæ cori-  
dis folio similibus, inordinate vestiti, aliquando  
hinc inde nudi, quorum summo capitulum exi-  
guum insidet. Ad Wiesam flumiuii super saxa repit.

VIII. MVS CVS stellaris roseus: ex fibellis nigris  
radicem constituentibus, pedicelli vnciales pro-  
deunt, quibus singulis folia plura instar rosæ com-  
pacta, pallide virentia, acuminata, in modum stel-  
læ disposita, insident. Hic in saxosis Telamontij  
prouenit.

IX. MVS CVS Cupressiformis: paruus est, ramo-  
mosus,



1122, foliis cupressi forma, atroviuentibus, interque pedicellus exurgit, qui minimas spicas pallidas & molles sustinet. Ex Hircynia.

X. *Muscus* Polytrichoides: hic triplex est; Primus, viticulis est plurimis, iisque breuibus, & compactis, qui foliis breuibus capillaceis rigidiusculis cinguntur. Alter, per omnia minor est, cuius folia rigidiuscula non sunt: Tertius, minimus est, & mollis: prior in syluis viginosis reperitur: duo posteriores mutis insident.

XI. *Muscus* terrestris coralloides incanus: muscus hic pedalis est, incanus, ramis pluribus crassioribus erectis, iisque compactis, qui in plurimos ramulos, cornuum ceruinorum instar, eosque acutos diuiduntur: hic ad Wiefam in syluis occurrit.

XII. *Muscus* terrestris, coralloides erectus, cornibus rufescentibus: hic Musco terrestri vulgari elegantispectaculo innascitur: nam Musco vulgari ex pallido virescenti, hic candidus insidet, coralli modo in ramulos rigidiusculos diuisus: qui licet candidus sit, ipsius tamen summitates cornutæ, & rigida rufescunt: hic ad Wiefam flunium late expansus in arenosis reperitur. Verum hic cum Musco Corallino, siue Corallina montana Tabernæmontani, neququam confundi debet.

XIII. *Muscus* ceranoides: hic duplex est, maior & minor: maior, trium, quatuorve vnciarum est, folijs carens, cauliculis latiusculis in ramos diuisis, hiq; in alios breues, & hi similiter in tenuissima segmenta, trifida, quadrifida, acute scinduntur.

Minor totus incanus, vnciam non excedens, ex plurimis ramulis proxime iunctis cōpositus, quorum summitas communiter in duo minutissima

& acutissima cornua abit: vterque in Hircynia collectus fuit.

XIV. *Muscus* aquaticus folio expanso: hic ex radice transuersum repente, & nigricante, ramos frequentes, late sparsos & semipalmates emittit, quorum summitates ob foliola cōpactiora, velut in spicam abeunt: folijs est breuibus, latiusculis primum, dein acutis. Hic apud nos aquæ in riuiis innatat, & nonnihil splendet: quamuis eundem ex lacu Gaderschlebianus D. Sigfridus, & D. Iungermannus, Musci maioris lapidum Hircyniæ nomine, miserit.


XV. *Muscus* fontanus siue Hepatica aquatica: hunc triplicem habemus, maiorem & minorem, Hepatiæ nomine à Lobelio, Tabernæmontano & alijs depictum, his tertium addere lubet, ab illis diuersum, quem Muscum fontanum capitulis racemosis vocamus: hic folijs est longe minoribus, squamarum instar iunctis, pallide viuentibus, & nonnihil hirsutis, inter quæ quam plurimi pediculi capillacei, biunciales, nudi efferuntur, quorum singuli capitulum paruum instar racemi compactum, & rufescens sustinent, quantum ex sicco, à D. Sigfrido misso, colligere licuit.

XVI. *Muscus* pyxioides duplex est: alter terrestris, tubulis maioribus, & candidioribus constans, à Lobelio nomine Musci terrestris pyxidatos alabastriculos imitantis, propositus: sub quo in Silesia calcem reperiri relatum fuit.

Alter v. saxatilis est, tubulis longe minoribus, copiosioribus, nec ita candidis, qui petris saxiue latissimis innascitur, eaque obtegit, quemadmodum in via Telamontium verius, videre est.



Lenticula palustris latifolia.



LENTICULA PALUSTRIS.

## CAPVT V.

**L**ENTICULA palustris latifolia punctata: Lenticula palustris mihi quadruplex est: vulgarissima, Lentem referens: altera trifida: tertia quadrifolia: quarta cuius & figuram (in Phytopinace & Matthiolo propositam) & descriptionem adiungere lubet. Hæc ramulis aquis innatæ, à quibus filamenta radicales constituenta deorsum feruntur: folijs est copiosis, subrotundis, eleganter virentibus, coniugatis in ramulis digestis, superne punctis minutissimis notatis: his inferne copiose lenticulæ, aliquando singulæ, aliquando ternæ, & quaternæ, rugoso prætenui cortice donatæ adherent, quibus semen copiosissimum, minutissimum & flauescens includitur: sapore est aqueo; Hanc in fossis Patavinis aquis supernatantem vidimus, & in Silesia circa Vratislaviam reperitur: quam forte Cæsalpinus, pro Stratiote aquatica Dioscoridis

proposuit, quamque scribit fluitare, & cum aqua incidere. Pilsin Auxeris Junio, qui aquas thermales ex monte S. Iuliani recipit.

## CORALLINA.

## CAPVT VI.

**C**ORALLINÆ varietates multæ occurrunt, ac in præsens de tribus, quas hæcenus apud Aucthores, qui ad manus sunt, non observauimus.

I. CORALLINA alba nodosa: caule est pedali, ligno candido, & duro, candido & aspero cortice recto, à quo vtrinque, sed sine ordine, pediculi, trium quatuorve vnciarum erecti, flexiles, prodeunt, quorum aliqui in alios, etiam vncia minores subdividuntur: hos minimum noduli, velut ex duobus semicirculis, iisque ut plurimum pertusis, compositi, usque ad extremum apicem (triginta, etiam quadraginta in vno pediculo observare licet) eleganti spectaculo, ad antiquarum minimarum cæterarum aurearum similitudinem, cingunt. Hanc vna cum sequentibus, D. Rumbaumius, Massilia attulit, ex Barbaria illo deferri, & apud Massilienses plumarum loco supra pileos gestari, affirmavit.

II. CORALLINA cinerea rugosa: hæc duplex est, & utraque non secus quam sequens, intus lignum habet spadicei coloris, durum, medulla carens, & crusta obductum. Prima, ligno est duriore, quod crusta cinerea, aspera, rugosa, & tuberosa, veluti cortice vestitur, quæ friabilis est: forte ex lino maritimo exiccato creata: hæc in ramos plures recurvos, & hi in minores, veluti tuberculis exasperatos, diuiduntur, & in obtusum rotundiusculum apicem desinunt.

Alteræ, crusta magis albicante, minusque rugosa obducitur, & in ramos pede longiores flexiles, & hi in stylos plerosque palmares, absumuntur. Verum has duas, nec cum Lithophyto marino Gesneri, nec cum Corallina alba, lutea, & rubra Tabernæmontani, nec cum Erica maritima Clusij, confundere oportet, cum omnes has differentias habeamus.

III. CORALLINA pallide flauescens lævis: hæc crusta pallide flauescente, lævi ac friabili obducta est: à qua vtrinque modo rami, modo styli læues & flexiles prodeunt.



## QUERCUS MARITIMA.

## CAPVT VII.

QUERCUS *maritima* triplex mihi est: 1. quæ propter vesicas aut bullas plurimas, quibusdam baccifera dicitur: 2. vesicis quidem caret, sed foliorum extrema crassiora sunt, & inæqualia, quasi rudimentum Cucumeris exigui ostendunt, quam glandiferam vocant: vtraque iam descripta. At tertia, quam Quercum *maritimam* barbatam vocamus, pauca quidem folia habet, eaque secundæ similia, sed hæc in quam plurima oblonga capillacea filamenta, barbæ instar absumuntur.

## FUCUS MARITIMUS.

## CAPVT VIII.

EX Fucis *maritimis* quam plurimis, in præsens aliquot solum exhibebimus, quorum duos priores anno 1603. D. Cargillus, Abredonia ex Scotia vna cum descriptione transmisit.

I. Fucus *alatus*, siue phalganoides: huius admiranda est forma: faxis quæ Oceanus lambit, & in æstu quoque mergit, adhæret, lepadum instar mytilis coronata: caule tereti, pennæ anserinæ magnitudinis, colore, quem exhibet Pruna Damascena, inter rubrum & nigrum saturatum, medio; at folia, quæ non nisi caulem adultum ornant, saxo hærentia (in sicca virescunt) ad luteum magis vergunt, quæ palmæ latitudine supra radicem nascuntur plurima, ligularum instar, cartilaginea, tres, quatuor, sex, aut octo uncias longa: inter quæ caulis eo usque teres, latefeit, porrigiturque interdum ad vlnæ longitudinem inflexus, ut nisi aquis innatans sustentetur, humi semper procumbat: huic, si adultior, utrinque ala adnascitur, tantæ, quantæ & ipse caulis est longitudinis, ea vera tota membrana est, fibris hinc inde venosis à caule conspersa. Notandum autem membranam hanc, pro ut in sagittarum alis est videre, ima parte angustiore, sensim latiore reddi, ita ut tres ab ortu pollices transuersos, æqualis deinceps tota existat, vnius, duarum, aut trium unciarum latitudine. Vulgo Baderlacks vocant: Fucus *alatus*, aut phalganoides esto, caulis enim ancipitem gladium refert: hic, præsertim in Septembri viget, alio anni tem-

pore inutilis: membranæ abijciuntur, reliquo vescuntur grauidæ, alijsque etiam in cibos cedit: sapore est salso cum modica dulcedine: sitim manducantibus excitat.

II. Fucus *arboreus* polyschides: eodem ortu & usu est, quem vulgus Tangels nominat, Fucus omnium interdum maximus, trium quatuorve cubitorum, teres, luteus (tenerior, qui solus vescus est, longe infra minimi digiti crassitudinem, corticem Castaneæ bene maturæ colore æmulatur) caulem Angelicæ maximæ crassitudine æquat: fastigium, in latas cartilagineas membranas, varie diuiditur, eo prope modo, quo balthei pars, & quæ ensis suspenditur apud Helucios. Hic Fucus maximus, aut arboreus polyschides esto. Hactenus Cargillus. Verum hic postremus à Palmifolio Giganteo siue Alga latifolia Imperati, à quo Neapoli, cum quam plurimis maritimis plantis accepimus, distinguendus debet.

III. Fucus *longissimo*, latissimo, crassoque folio, radice est breui, ex crassis fibris composita, ex qua pediculus crassus, rotundus, semipalmaris prodit, qui in folium expanditur: folium vnum ingentis longitudinis, pedes aliquot & vlnas excedit (rarius ex vna radice duo folia, eiusdem omnino formæ & longitudinis) & latitudine uncias quatuor superat, eiusdem fere per totum folium, principio excepto, latitudinis, in medio æqualiter planum, ad vtrumque verò latus parum conuolutum, tortuosum & sinuosum, obscure virens, crassum, & dum terræ adhuc affixum, tactu forma gelatinæ, vitæosum, & madidum: quare, propter nimiam madorem vix asservari potest, licet sæpius Soli exponatur: nam quories chartæ reponitur, mador iste cum foetore recrudescit, ita ut à corruptione, non nisi post aliquot septimanas, donec plane sicet, seruari possit. Hic in Gallijs ad maris litora, versus S. Malo provenit, & è natali solo facile eruitur: vnde D. Sarlerus transmisit.

IV. Fucus *longissimo*, latissimo, tenuique folio: hic priori non multum absimilis, qui ex radícula nigra, fibrosa, pediculum tenuem, triunciale emittit, qui in folium, sesquicubitalis longitudinis, unciarum quinque vel sex latitudinis, planum, per margines hinc inde conuolutum, absumitur: coloris pallide virentis est, substantiæ tenuissimæ membranæ: hunc cum alijs maris Medieterranæ purgantibus reiectum, non longe à montis Cetij radice, collegimus.

V. Fucus



V. *Fucus* longo, angusto, & crasso folio: radice est rotunda & plana, ex qua bina, ternave folia (siue cauliculi, si mauelis) sesquipalmaria, crassa, coriacea & plana, ligulas referencia prodeunt, quæ in alias velut ligulas, sed rarius, diuiduntur. Hic ad *Fucum* maritimum secundum *Dodonæi* editionis *Belgicæ* referri posse videtur, cuius species altera breuiore & angustiore folio dici poterit. Hunc quoque à *D. Satero* habemus.

VI. *Fucus* membranaceus ceranoides: hic instar *Lactucæ* marinæ tenuis, palmum excedens, caule est vnciam & semunciam lato (mire varians) qui in plurimas alas modo latiores, modo angustiores, hæque in breuissimas easque plures cornuum modo subdiuiduntur. Huius species varias esse, scopulis adnasci, *Scotis* *Dils* dici, eiusque esum contra *Picam* commendari, *D. Cargillus*, planta addita, perscripsit.

VII. *Fucus* maritimus *Gallopauonis* pennas referens: hic membranaceus est, sese sensim late expandens, qui in plures lacinias semicirculares sibi quandoque incumbentes diuiditur, per quas variæ striæ semicirculares, variegatæ, diuersæque latitudinis, vt in pennis *Gallopauonis* eleganti spectaculo feruntur. Hic scopulis maritimis adnascitur: quamuis etiam ex *Mitulis*, cortex huic *Fuco* similimus, eximatur: hunc à *D. Cargillo* ex *Scotia* accepimus.

VIII. *Filum* maritimum *Germanicum*: hoc exiguo lapillo innascitur, & in plurima bicubitalia, angustissima, nigricantia, lauia, crassiuscula & firma, aliquando inter se complicata fila, absumuntur. Hoc ex mari *Baltico*, accepimus, & incolis *Meerfaden*, & *Meerstrand* dici accepimus.

*Alga* bombycina: *Algæ* hanc ex *Scotia* accepimus, quæ instar *Gossypij* siue bombacis mollis & compacta, late expansa, aquis dulcibus innatat, superne pallide virēs, inferne albicans: hoc *Gossypio*, quod ex veteri thorace, cui suffultum erat, eximitur, similemum est.



## CARDVVS.

## CAPVT IX.

I. *CARDVVS* mollis latifolius: caule est cubitali, striato, breuibus & mollioribus spinis armato: folijs *Rumecis* forma, tenuibus, lauibis, venosis, palmum longis, vncias quatuor latis, marginibus exiguis spinulis dentatis, caulis summitas in pediculos breues vnciales abit, quorum singuli capitulum *Lappæ* vulgaris forma, eiusque fere magnitudinis sustinent, quod in stamineum purpureum florem expanditur. Hunc *D. Burserus* in *Austriæ* monte *Taurero* *Rastadiensium* legit.

II. *Cirsium* angustifolium: ex radice nigra fibrosa, caulis cubito altiore effertur, membranosis alis asperiusculis vestitus, in ramos diuisus, quorum singuli in pediculum oblongum, eumque nudum, abeunt, cui capitulum vnicum hispidum insidet, quod in florem stamineum rubentem aperitur, & tandem in lanuginem absumitur. Folia habet ad radicem palmaria, vncia angustiora, atrouirentia, in ambitu raris aculeis prædita: at quæ in caule, breuia sunt, nonnihil lacinata, & aculeis magis exasperata. Hoc in monte *Wasserfall* legimus.

III. *CARDVVS* sphaerocephalus acutus vulgaris: ex radice crassa, caulis cubito altior, statim in ramos brachiatus, effertur, qui crassus, lignosus, membrana alata spinosissima usque ad summum inuestitur: quem folia pediculo latiore amplectuntur, quæ profunde lacinata, palmaria, duas tresve vncias lata, per ambitum crebris & acutissimis, pallide flauescētibus spinis armata. Caulium summis, capita rotunda, pene sphaericea, acutissimis spinis horrida, insident, quæ in florem stamineum purpurascētem explicantur, & tandem in pappū abeunt, cui semen *Cnico sylvestri* simile includitur. Hæc frequens est in dumetis humidis, quamuis etiam secus vias reperiatur.

IV. *CARDVVS* lanceatus angustifolius: hic caulibus est bicubitalibus, rotundis, striatis, hispidis & firmis, oblongis, acutis, albicantibus spinis horridus hinc inde membranacea ala donatus, & in summo in ramulos diuisus: circa hunc folia rariora, palmum æquantia, angusta, in lanceam oblongam, eamque latiore, quam in *Cardeo* lanceato latifolio, abeuntia, raris & breuibus lacinij diuisa, subtus incana, superne atrouirentia, spinis longis



longis donata: cauliculorum summis capitula plura, parua, ex imbricatis squamis composita, insident, quæ in stamina attrorubentia, apicibus diuisis expanduntur, & aliorum more in pappum & lanuginem resoluuntur, semenque exiguum in ea occultatur. Hic & flore albo quandoque reperitur. Hunc in nemore ad pontem. Wiesam obseruare licet.

V. *CARDVVS* palustris: radice est simplici, caule tricubitali, foliaceo, erecto, non nihil ramoso, breuib. spinis armato, folijs attrouidentibus, crassiss, sinuosis, quandoque etiam laciniatis, semipalmatis, sesquiunciam latis, per marginem rarioribus spinis cinctis; caulis summo capitula plura, singula singulis pediculis insident, quæ in florem stamineum purpurascens expanduntur, dein in pappum aliorum more abeunt. Hic ad Wiesam locis arenosis, herbosis, & Michelsfeldensibus palustribus, prouenit.

VI. *CARDVVS* polycephalus angustifolius: radicem habet lignosam, fibrosam, caulem cubito altiore, rotundum, striatum, spinis carentem, cuius summitas in plures semipalmates ramulos, & hi quandoque in breuiore, diuiditur: folia sunt pauca, angusta & breuia, spinis oblongis armata: capitula plura, parua, quibus minima subiunguntur, exiguis spinulis prædita, & flos laceæ similis ex staminibus purpurascens compositus, insidet, qui similiter in lanuginem abit. In pratis Michelsfeldensibus frequens occurrit.

VII. *CARDVVS* repens vinearum: ex radice oblonga, nigricante caulis prodir reclinatus, rarius erectus, pedalis, incuruus, striatus, candicans, cuius summum in ramulos paucos, eosque breues absumitur, qui capitula parua laceæ vulgari similia, sustinent: folia ad radicem plura, superne attrouidentia, inferius incana lanugine aspersa, semipalmata, unciam lata, leuiter sinuata, spinulis per circumferentiam donata: at quæ caulem ambiunt in profundas lacinias diuiduntur, palmata, duas tresve uncias lata, existunt. Hic in vinetis Mutensibus frequens est.

VIII. *ANONIS* viscosa minor flore pendulo: plantula est semipalmatis, totaque hirsuta: radice alba, oblonga, tenui, parum fibrosa, à qua cauliculi plures, duarum triumve unciarum, exurgunt, iique tenues, rotundi, foliolis paruis, plerumque ternis ex vno pediculo prodeuntibus, forma & situ vulgaris Anonidis similibus, viscosi: flores parui sunt, lutei, propendentes, quibus minutum semen in exigua siliqua succedit, & nullis spinis.

donatur. Ex Gallia Narbonensi habemus.

—(—)—

—



# LIBER VNDECIMVS

## CYTISVS.

### CAPVT I.

**CYTISVS** Hispanicus filiquis Ornithopodij: hic virgis est rotundis, striatis, duris, tricubitalibus, in varios ramos nonnihil lanuginosos brachiatis, quos folia numerosa, terna vni pediculo inherencia, in summis ramulis exigua, dilute virentia, ambiunt: flores parui, lutei, Genistæ similes, quibus filiquæ vnciales, molli hirsutie testæ, instar filiquarum Ornithopodij, minus tamen profunde sinuata, & plures simul iunctæ; ternæ, quaternæ, quinæ vni pedicello inherentes, quibus semina parua, plana, nigricantia inclusa sunt. Hic in Hispania, ad agrorum limites frequens est, non tamen cum Cytiso primo Clusij, cuius pars interior nigricat, & ramuli toti villo obfusi sunt, confundi debet.

### COLVTEA.

### CAPVT II.

**COLVTEA**, Scorpionides maritima glauco folio: virgis est pedilibus, rarius cubitalibus, lignosis, rotundis, rufescente, rugoso cortice vestitis, in frequentes ramos diuisis: folia alata, septem, aut nouem, vni costæ, binis semper ex aduerso sitis, adhærent; vno impare extremam alam occupante; Coluteæ folijs similia, sed multo minora, obtusa & cordata, glaucique vel cæsi coloris: flores & forma & colore Coluteæ similes, sed minores: pediculis tenuibus filiquæ; tenues, oblongæ vnciales, articulis distinctæ insident, quarum singulis articulis, singula semina parua inclusa sunt.

Hæc in maritimis prope Teracinum collecta, quamuis etiam Patavio, ex horto Bem-biano habeamus.

### GENISTA.

### CAPVT III.

**GENISTÆ** Hispanicæ affinis: suffrutex est cubitum superans, caule tenui, tereti, candicante cortice testæ, qui in plurimas virgas tenuissimas diuiditur, quarum aliquæ palmum superant, aliæ minores sunt: circa quas folia longiuscula, angustissima & rarissima, ita vt virgæ pene nudæ appareant: summis virgis singulis vnicum capitulum rotundum, villosum, molle, insidet, vt in Gramine maritimo siue polyanthemo maiore, ex pluribus floribus, Genistellæ tinctoriæ forma, sed minoribus pallide luteis compositum: nam quilibet flos, ex caliculo villoso, hirsutie albo prodit. In montibus plane saxosis ad aquas Blancas D. Albinus collegit.

**GENISTELLA** Monspeliaca spinosa: hæc viticulis est palmaribus, in terram reflexis, quorum pars inferior in breuissimos ramulos, ex paruis spinulis constantes diuiditur, à medio vero sursum villosi sunt, quandoque in ramulos brachiati; oblongis viridibus folijs, minoribus sæpe additis, vestiti, spinisque carentes: summitatibus, flores pallide lutei, forma Genistæ spinosæ vulgaris similes, insident. Hanc quidam Monspelluli Corrudam luteam vocabant: quæ etiam in Ventoso monte reperitur.

Similem sed per omnia maiorem, caulibus pedilibus, folijs rarioribus, spinis longioribus, minusque pungentibus, floribus maioribus & aureis, quasi in spica dispositis, ex Hispania habemus.

**GENISTELLA** minor Aspalatioides: suffrutex est pedalem altitudinem superans, stipite rotundo, rufo cortice vestito, lignoso, hinc inde spinis, sed rarioribus, armato, in ramos, qui in minores

V 3 subdi-



subdiuiduntur, brachiato: circa quos foliola rara, parua, quædam subrotunda, quædam oblonga, spinis interiectis, quibus flores lutei, Genistæ prædictæ duplo minores, hinc inde componuntur, nec, vt in priore, ramulorum summis, in aculeum abeuntibus, insident. Hanc, ex Anglia Genistæ spinosæ nomine accepimus: at eandem in asperis, circa Aureliam Gallorum, ramis late se spargentibus, collegimus.

**CHAMÆGENISTA** Cretica: hæc virgulis est palmo minoribus, humi diffusis, tenuibus, rotundis, subcanis, in ramulos aliquot duarum, trium vnciarum diuisis, foliolis oblongis, angustissimis, binis aut ternis ab eodem exortu, sed altero semper longiore, prædeuntibus, incanis: ex foliorum alicuiusculi terni, quaterni, parui, lutei, Genistæ floribus æmuli: siliquas non vidimus. Ex horto nobiliss. Contareni habemus.

**SVMACH.****CAPVT IV.**

**SVMACH** angustifolium: hoc potissimum folijs à vulgato differt: huius enim folia vncias quatuor longa, semiunciam lata sunt, in exquisitum apicem desinunt, & per marginem crenata sunt, quorum duodecim vni costæ, vtrinque nimirum sex, adherent, vndecimo imparem numerum, constituyente, quæ superne atrourent, inferne pallida sunt, costæ elata per longum excurrente. hoc in Brasilia apud Tououpinambaultios collectum & à D. Bursero communicatum.

**MELEGVETA.****CAPVT V.**

**MELEGVETA** siue Grana Paradisi: folia crassa sunt, vncias quatuor longa, tres lata, per quorum longitudinem costæ elata fertur, à qua fibræ plurimæ per transversum abeunt, vt in Caryophyllorum folijs cum quibus maximam similitudinem habent: fructus sacis cognitus, habetur in officinis, vt & Grana exempta: huius folij pediculus, sapore est aromatico, ipsis granis correspondente, non tamen ita acuto & aromatico, vt in folijs Caryophyllorum animaduertitur, quo signo potissimum à se inuicem distinguere possunt. Huius folia vna cum

Nucis moschatæ folijs, D. Clutius Amstelrodami misit.

**STYRAX LIQVIDA.****CAPVT VI.**

**STYRACIS** liquidæ folia: ex radice rotundo, nigricante, rugoso, striato & quasi articulate cortice tecto, folia terna, etiam quina, oblongis, tenuibus, nigricantibus pediculis donata, ex vno veluti tuberculo prodeunt, quæ virginea sunt foliorum Aceris, vel Platani instar, in lacinias ternas, etiam quinas diuisa, nervosa, per circumferentiam crenata, & mucronato cuspidæ. Hæc ab Honorio Belli accepimus, qui styracis huius magnum ramum se habere perscripsit.

**LIGVSTRVM.****CAPVT VII.**

**LIGVSTRVM** duplex ex Italia accepimus, de vtroque breuiter in præsens, cum solum ramos absque floribus & seminibus acceperimus.

**I. LIGVSTRVM** Myrtifolium: hoc ad Ligustri vulgaris modum excrescere, & in ramos brachiarum audio: rami rotundi sunt læues non nihil rufescentes: folia atrourentia, vulgaris folijs & latiora & longiora. Hoc nomine, Ligustri myrtifolij perpetui, vel Myrti Ligustri folio, Patavio ex horto Pharmacopæi (cuius nomen excidit) ad pontem molin accepimus.

**II. LIGVSTRVM** folijs lacinia- & huius ramos pedales habemus, circa quos folia atrourentia, glabra, inferiora quidem subrotunda, alia vero oblonga: hæcque modo integra, modo lasmini lutei instar diuisa, quandoque ab altero solum latere, laciniam vnam, quandoque vtrinque vnam, rarius binas, quandoque ternas, quaternas, inordinatas lacinias obtinent. Hoc primum Ligustri nigri nomine, ex horto Ill. Mori Senatoris Veneti, quem in villa di Carbonara colit: dein, pro Syringa lacinia- tis folijs, ex horto Ill. Contareni Sen. Veneti accepimus: de vtroque plenius in

Theatro nostro.

—(—):—

**SALIX**



## SALIX.

## CAPVT VIII.

I. **SALIX** fragilis: hæc mediocris est altitudinis, scaulibus ramosis, rotundis, rubente cortice vestitis: folijs longis, angustis, prona parte incanis, superius atroirentibus, & tandem pene nigris: iulis quam in cæteris breuioribus. Fragilem appellare lubet, quia non aliarum Salicum instar virgis lentis & vimineis, sed plane fragilibus donatur. Nostri *Brandwiden* eo quod tandem nigrescat, dicitur: frequens ad *Bursam* & *S. Iacobum*.

II. **SALIX** oblongo incano folio: huius caules, cortice atrorubente vestiti, in breues & plures ramulos diuisi: folijs oblongis, superna parte obscure virentibus, parte prona cinereis & incanis: flores copiosos aliarum salicum modo producit, & semen paruum nigrum, cum albissima lanugine auolat: hæc apud nos frequens, in primis in minore vrbe, ad molendinum ærarium, in sepibus ad aquam.

III. **SALIX** subrotundo argenteo folio: hæc caulibus est cubito altioribus, rotundis, incanis & ramosis: folijs subrotundis, superne nigricantibus, parte prona incanis, argentei coloris, splendentibus, tactu mollibus, & veluti tenui lanugine pubescentibus, per ambitum raris crenis exasperatis. Hanc sine fructu ex Belgio *D. Gallus* transmisit.


IV. **SALIX** humilis latifolia erecta: hæc salici, latifoliæ aquaticæ acuto folio similis est, sed humilior, cum huius virgæ rotundæ striatæ, vix cubitum superent: folia minora sunt, ex rotunditate oblongata, in acumen desinentia, rugosa,

parte prona lanuginosa, tactu mollia: iuli rotundi, parui, flauis: hæc cum latifolia repente confundi non debet. Michelfeldæ in humidis.

V. **SALIX** alpina angustifolia repens: ex radice, atrorubente cortice tecta, cauliculi palmares humi fusi prodeunt, qui capillaceis radicibus terræ affiguntur, ramulis tamen paucis sursum elatis: foliolis oblongis, latiusculis, breuibus cincti: flores vt in cæteris, quibus absentibus, nullus salicem esse crederet. Hæc in Heluetiorum alpibus & monte Fracto, frequens est.

VI. **SALIX** alpina Pyrenaica: hæc ad semicubitalem altitudinem vix assurgit, virgis tenuibus, ramosis, folijs oblongis, paruis, per circumferentiam pilosis, tactu holoserici instar, ob minutissimos pilos, mollibus: spicæ florum vnciales, angustæ, molles sunt. In summitatibus Pyrenæi *D. Burserus* legit.

VII. **SALIX** saxatilis minima: hæc duas vncias vix superat, quæ ex radícula caudicem crassiusculum, vix semiuncialem emittit, qui in binos ternosve vnciales ramulos, terræ incumbentes, diuiditur: folia sunt parua, oblonga, subrotunda, atroirentia, venosa, quorum medio capitulum paruum subrotundum, veluti ex multis baccis compositum, insidet, quibus maturis apertis, veluti ex triangulari caliculo, mollis, candida & brevis lanugo effertur. In alpium Heluetiorum iugis, saxis insidens, reperitur.





## LIBER DVODECIMVS.

## S A N A M Y N D A.

## CAPVT I.

**S**ANAMYND A viridis vel glabra: radice est crassa, lignosa, fibrosa, alba, cortice crasso, pallido, lento vestita, à qua ramuli plures, tenues, palmares, etiam minores, iique geniculati prodeunt, foliis oblongis (rarius subrotundo) Chamæleæ vel potius Polygalæ similibus, sed breuioribus, viridibus & glabris, alternatim circa ramulos dispositis: inter quæ flores oblongi, luteoli, in quatuor foliola diuisi conspiciuntur: fructum non obseruauimus. Hæc Aprili florens, Monspeßuli in horto Dei collecta fuit.

## FRANGVLA.

## CAPVT II.

**F**RANGVLA altera polycarpus: frutex est Frangulæ siue Alni nigræ similis, ramolus, cortice candicante vestitus: folijs subrotundis in apicem plerumque abeuntibus, plurimis neruis elatis per ea discurrentibus, quare instar foliorum Vlmi rugosis, tenuissime per marginem serratis: Flores habet forma Frangulæ vulgari similes, paruos, stella-

tos, luteolos, copiosos, velut in racemo cohærentes, quibus succedunt fructus parui angulosi compressi, Spinæ insectoriæ baccis correspondentes, ex minimis pediculis dependentes. Hæc vere florens in quibusdam dumetis, etiam in monte nostro Muteto, reperitur.

## RIBES.

## CAPVT III.

**R**IBES montana oxyacanthæ sapore: duplex Ribes in Heluetiorum alpibus reperitur: altera, quæ frutice & folijs, sed minoribus vulgari conuenit: fructum v. habet rubrum, hortensi duplo pene maiorem, sapore oxyacanthæ fructui respondentem: in Valesianorum montibus reperitur. Altera, humilior est, & per omnia minor, baccis vulgari minoribus, minusque acidis: in Bernatum montibus prouenit. Et hæc ad gloriam Dei dicta sunt, cui sit laus honor & imperium in sæcula.

## FINIS.

## INDEX





# INDEX PRODROMI THEA- TRIBOTANICI,

Quo plantæ supra sexcentæ vna cum aliis  
continentur.

*Primus numerus paginam,  
Secundus pagina segmentum,  
Tertius paragraphum denotat.*



- A.  
Brotanum Campstre inca-  
num, Carlinæ odore, 71.1.  
vbi proueniat ibid.  
Absynthium Ponticum Creti-  
cum grati odoris, 71.1. I.  
Græca lingua quomodo re-  
cte vocetur ibid.  
Absynthium alpinum incanū,  
71.1.II. vbi nascatur, ibid.  
Absynthium alpinum candidum humile ibid. III.  
Absynthium alpinum umbelliferum, 71.2. IV. quando in-  
uentum nouum, ibid. quæ eius varietas ibid.  
Acetosa Americana foliis longissimis pediculis donatis, 54.  
2. I.  
Acetosa rotundifolia alpina 55.1. II.  
Acetosa scutata repens 55.1. III.  
Acetosa Cretica semine aculeato ibid. IV. & 2.  
Acetosa lanceolata angustifolia repens ib. V.  
Adiantum fruticosum Brasilianum, 150.2. vbi nascatur  
ibid.  
Æthiopis laciniato folio 115.1.  
Alchimilla alpina quinquifolia, 138.2. quo mense floreat,  
& quibus locis reperitur ibid.  
Alga bombycina 155.2. F. III.  
Allium iuncifolium bicornè luteum 27.2. I.  
Allium montanum minus ibid. II.  
Allium montanum radice oblonga, ibid. I. I. I. vbi proueniat  
ib. d.  
Alpine palustris minor serpillifolia, 118.1. I. quibus locis pro-  
ueniat ibid.  
Alpine palustris minor folio oblongo, 118.1. II. alias Portula-  
ca aquatica ibid.  
Alpine alpina glabra ibid. III.  
Alpine alpina iuncto folio, 118.1. IV. quo anni tempore flo-  
reat & vbi nascatur ibid.  
Alpine minor Androsaces alterius Matthioli facie 118.2. V.  
Alpine verna Androsaces capitulis, ibid. V. I. cuius soli sit a-  
lumina



I N D E X.

*Carduus*



# I N D E X.

ib.	<i>Carduus Spherocephalus acutus vulgaris</i> , ib. III. quibus locis	<i>Chamaedrys Hispanica</i> folijs tenuissime diuifis 117. 2. III.
221. 2. V.	gaudeat ib.	<i>Chamaedrys alpina minima</i> hispanica, ibid. V. vbi reperitur
ibid. VI.	<i>Carduus lanceatus angustifolius</i> , ibid. IV. vbi reperitur	ibid.
ibid. VII.	156. 1.	<i>Chamaedrys spuria minor angustifolia</i> 117. 2. V. vbi occur-
7. 1. & 2.	<i>Carduus palustris</i> , 156. 1. V. quo loco proueniat ib.	rat ibid.
02. 1. IV.	<i>Carduus polycephalus angustifolius</i> , 156. 1. VI. vbi frequens	<i>Chamamelum leucanthemum</i> Hispanicum magno flore 70. 2. I.
ileflorum	occurrat ibid.	<i>Chamamelum luteum</i> Hispanicum odoratum ib. II.
ib. 2.	<i>Carduus repens vinearum</i> , ibid. 2. VII. vbi nascatur ibid.	<i>Chamamelum leucanthemum</i> incanum Hispanicum mi-
& 2. II.	<i>Carui alpinum</i> 84. 1. & 2.	nus ib. III.
4. 2. III.	<i>Caryophyllata alpina minor</i> , 139. 1. vbi colligitur ibid.	<i>Chelidonia rotundifolia maior</i> , 137. 1. quib. locis proueniat
159. 1. I.	<i>Caryophyllus arborescens Creticus</i> , ex radice crassa, 104. 1. I.	ibid.
ib.	<i>Caryophyllus sylvestris repens multiflorus</i> , ibid. II. vbi proue-	<i>Chelidonium maius</i> folijs quernis flore laciniato 74. 2.
e floreat	natur ib.	<i>Chondrilla viminea viscosa monspeliaca</i> 68. 1. I.
at ib.	<i>Caryophyllus sylvestris biflorus</i> , ibid. III. vbinam reperitur	<i>Chondrilla viscosa humilis</i> 68. 1. & 2. II.
alpinum	ibid.	<i>Chondrilla purpurascens fetida</i> ib. III.
ib.	<i>Caryophyllus pumilus latifolius</i> 104. 1. IV.	<i>Chrysanthemon latifolium</i> Brasilianum 70. 1.
50. 2. I.	<i>Caryophyllus holostius alpinus latifolius</i> ib. V. vbi reperitur	<i>Cicer montanum</i> αμυλον, 147. 2. 1. quo anni tempore, &
nonnulli	104. 2.	quo loco proueniat 148. 1. I.
ib.	<i>Caryophyllus holostius alpinus angustifolius purpurascens</i> ,	<i>Cicer montanum lanuginosum erectum</i> 148. 1. II.
51. 1. III.	104. 2. VI.	<i>Cicer astragalus erectum</i> ibid.
147. 2.	<i>Caryophyllus holostius alpinus gramineus</i> , ib. VII. vbi proue-	<i>Cirsium angustifolium</i> , 155. 2. II. vbinam colligatur ib.
	natur ibid.	<i>Clematis maritima repens</i> , 135. vbinam reperitur ib.
reiri so-	<i>Caryophyllus holostius montanus angustifolius albus</i> , ibid.	<i>Clematis alpina Geranifolia</i> , ib. 1. vbi nascatur 136. 1.
102. 2.	VIII.	<i>Crista Galli umbellata</i> 85. 2. I.
natur ib.	<i>Caryophyllus holostius tomentosus latifolius</i> , 104. 2. IX. a-	<i>Crista Galli angustifolia montana</i> 86. 1. II.
	lias <i>Ocymoides tomentosus</i> , ibid. vbinam proueniat ibid.	<i>Cochlearia minor erecta</i> 53. 2. I.
25. 2. I.	<i>Caryophyllus holostius tomentosus angustifolius</i> , 104. 2. X.	<i>Cochlearia Danica repens</i> ib. II.
29. 1. III.	& 105. 1.	<i>Conuolulus purpureus folio rotundo</i> , 134. 1. I. quando flo-
3. 2. III.	<i>Caryophyllus aruensis glaber minimus</i> 105. 1. quomodo va-	reat ibid.
4. 1. IV.	rietur 10. 2. vbi prouenire consueuerit ibid.	<i>Conuolulus peregrinus caruleus folio oblongo</i> , ibid. II. alias
ibid.	<i>Caryophyllus saxatilis ericaefolius umbellatis corymbis</i> , 105.	<i>Campanula carulea</i> ibid.
10 copio-	2. XI. vbi nascatur ibid.	<i>Conuolulus foliis laciniatis, vel quinquefolius</i> 134. 1. III.
ibid.	<i>Caryophyllus saxatilis ericaefolius ramosus repens</i> , ibi. XIII.	<i>Colurea, Scorpoides maritima glauco folio</i> , 157. 1. vbi nas-
4. 2. IV.	ex Hispania qualis ad nos adferatur ibid.	catur ibid.
5. 1. VII.	<i>Caryophyllus saxatilis siliquosus</i> , 105. 2. X. V. in Hircynia	<i>Consolida media alpina</i> 120.
panula	promontorijs frequens, ibid. alias <i>Gypsophytum siliquo-</i>	<i>Consolida regalis latifolia paruo flore</i> 74. 1.
36. 1. I.	sum ibid.	<i>Consolida regalis peregrina paruo flore</i> ibid.
6. 1. II.	<i>Caucalis nodosa echinato semine</i> , 80. 1. I. alias <i>caucalis</i> se-	<i>Conyza carulea alpina maior</i> , 124. 1. I. vbi proueniat ibid.
minor	mine ad caulium nodos echinato ibid. 2.	<i>Conyza carulea alpina minor</i> , ibid. II. vbi reperitur ibid.
ibid.	<i>Caucalis semine aspero flosculis subrubentibus</i> 80. 1. & 2. I.	<i>Conyza aquatica Asteris flore aureo</i> , ibid. III. vbi legatur
Frache-	<i>Caucalis tenuifolia montana</i> 80. 2. II.	124. 2.
ibid.	<i>Centaureum minus spicatum album</i> , 130. 1. & 2. vbinam	<i>Corallina alba nodosa</i> , 153. 2. I. vnde ad nos deferatur ibid.
8. 2. vbi	reperitur ibid.	<i>Corallina cinerea rugosa</i> , 153. 2. II. quoruplex sit ib.
ibid.	<i>Centaureum maius</i> 56. 2.	<i>Corallina pallide flauescens lauis</i> 153. 2. III.
riatur.	<i>Centaureum alpinum luteum</i> ibid.	<i>Coronopus maritimus minimus</i> 98. 2.
ur ibi-	<i>Cichorium spinosum Creticum</i> 62. 1.	<i>Cotyledon minor folijs subrotundis serratis</i> 133. 1.
ardus	<i>Chamaedrys spinosa</i> 117. 1. I.	<i>Cynscramba Dioscoridis</i> 59. 2.
	<i>Chamaedrys Austriaca folijs tenuissime laciniatis</i> 117. 2. II.	<i>Cynoglossum semper virens</i> 119.
		<i>Cynorchus angustifolia biante cucullo</i> 28. 1. I.



# I N D E X.

D.

**D**aucus montanus apij folio flore luteo, 77.1. I. huic al-  
ter similis. ibid.  
Daucus pratensis apij folio 77.2. II.  
Daucus Alsaticus ibid. III.  
Daucus pratensis tenuifolius 85.1. & 2. II.  
Dens Leonis latifolius caulescens 62.2. I.  
Dens Leonis tenuissimo folio ibid. II.  
Dens Leonis minor folio radiatis ibid. III.  
Dens Leonis minor aspero folio 63.1. IV.  
Digitalis angustifolia luteo paruo flore, 115.2. vbi proueniat  
ibid.  
Doronicum Helueticum incanum, 97.1. I. vbi locorum cre-  
scat ibid.  
Doronicum Helueticum humile, crassu folio, ib. II. quan. en-  
se & loco floreant ib.  
Draba tenuifolia velut spicata 53.1. I.  
Draba flore caruleo g. leato ibid. II.  
Dracunculus alpinus folio scabiosa 39.1.

E.

**E**chium Hispanicum flore calcari donato, 119.1. I. vbi  
nascatur ibid.  
Echium Scorpioides minus flosculis luteis 119.2. II.  
Elleborus niger Sannicula folio minor, 97.1. veratrum mi-  
gram Dodonai siue Atrantiam nigram Lobelii per om-  
nia refert, sola autem magnitudine differt, ibid. vbinam  
locorum reperitur 97.2.  
Equisetum palustre linaria scoparia folio 24.2. I.  
Equisetum palustre minus polytachion ib. II.  
Equisetum palustre tenuissimis & longissimis seris, ibidem  
II.  
Equisetum nudum minus variegatum Basileense, ibid. IV.  
& 25.1.  
Equisetum fetidum sub aqua repens 25.1. V.  
Eruca latifolia, 39.1. I. an Eruca tertia Anglica ib.  
Eruca sylvestris minor Bursa pastoris folio 39.2. II.  
Eruca sylvestris minor incana ibid. III.  
Eruca lutea siue Barbarea flore pleno ib. IV.  
Eruca carulea in arenosis crescens, 40.1. V. prouenit locis a-  
renosis ibid.  
Eruca maritima Cretica siliqua articulata 40.2. VI.  
Eruca maritima Italica siliqua hasta cuspidi simili ibid.  
Eruca Monspelica siliqua quadrangula echinata, 41.1.  
VII.  
Erythraea similis hirsuta alba 42.2.

Erysimum tertium 43.1.  
Euphrasia lutea radice squamata, III.2. I. vbi nascatur,  
ibid.  
Euphrasia purpurea minor, III.2. II. vbi proueniat, ibid.

F.

**F**aba arborecens 147.1.  
Faba arborum differentie quot ibid.  
Faba arborecens Anglica species quot ibid.  
Festuca graminea glumis vacuis 19.1. LXIV.  
Festuca graminea effusa iuba 19.2. LXV.  
Festuca iuncea folio ibid. LXVI.  
Festuca iuncea folio spica gemina ib. LXVII.  
Festuca pratensis lanuginosa ibid. LXVIII.  
Festuca dumetorum ib. LXIX.  
Festuca dumetorum angustissimis & pilosis foliis, ibidem  
LXX.  
Filipendula minor 85.2.  
Filix palustris maxima 150.2. I.  
Filix mas aculeata maior, 151.1. II. vbi legatur ibid.  
Filix mas aculeata minor, 151.2. III. vbi proueniat ibid.  
Filum maritimum Germanicum, 155.1. VIII. vbi reperia-  
tur ibid.  
Fragaria affinis Sericea incana, 139.2. alias Leucas aduer-  
sarium, ibid. & quibus locis prouenire soleat ib.  
Frangula altera polycarpus, 160.1. qua anni tempore flo-  
reat, & quo loco 160.2.  
Fucus maritimus 154.1.  
Fucus alatus siue phaeogonoides ibid. I.  
Fucus arboreus polyschides 154.2. II.  
Fucus longissimo, latissimo, crassoque folio, ibid. III. vbi repe-  
riatur, ib.  
Fucus longissimo, latissimo tenui folio, ibid. IV. vbi colli-  
gatur 155.1.  
Fucus longo, angusto & crasso folio 155.1. V.  
Fucus membranaceus ceranoides ibid. VI.  
Fucus maritimus Gallopaonis pennas refrens, 155.1. VI.  
G.

**G**allium latifolium glabrum 146.1. VIII. vbi reperitur  
ibid.  
Genista Hispanica affinis, 157.2. quo loco proueniat ibid.  
Genistella Monspelica spinosa, ibid. alias Corradia lutea  
ibid.  
Genistella minor Aspalatoides 157.2.  
Gentiana alpina latifolia magno flore, 97.2. I. quo loco  
proueniat ibid.  
Gentiana omnium minima, ibid. II. in summis Alpium  
Helueticarum iugis reperitur ibid.  
Geranium malacoides minus, 138.1. I. quibus locis reperitur  
ibid.



# INDEX.

43.1. scatur, ibid.  
 47.1. ibid.  
 LXIV. ibid.  
 LXV. ibid.  
 LXVI. ibid.  
 LXVII. ibid.  
 LXIX. ibidem.  
 85.2. ibid.  
 10.2.1. ibid.  
 160.2. ibid.  
 154.1. ibid.  
 155.1. ibid.  
 156.1. ibid.  
 157.1. ibid.  
 158.1. ibid.  
 159.1. ibid.  
 160.1. ibid.  
 161.1. ibid.  
 162.1. ibid.  
 163.1. ibid.  
 164.1. ibid.  
 165.1. ibid.  
 166.1. ibid.  
 167.1. ibid.  
 168.1. ibid.  
 169.1. ibid.  
 170.1. ibid.  
 171.1. ibid.  
 172.1. ibid.  
 173.1. ibid.  
 174.1. ibid.  
 175.1. ibid.  
 176.1. ibid.  
 177.1. ibid.  
 178.1. ibid.  
 179.1. ibid.  
 180.1. ibid.  
 181.1. ibid.  
 182.1. ibid.  
 183.1. ibid.  
 184.1. ibid.  
 185.1. ibid.  
 186.1. ibid.  
 187.1. ibid.  
 188.1. ibid.  
 189.1. ibid.  
 190.1. ibid.  
 191.1. ibid.  
 192.1. ibid.  
 193.1. ibid.  
 194.1. ibid.  
 195.1. ibid.  
 196.1. ibid.  
 197.1. ibid.  
 198.1. ibid.  
 199.1. ibid.  
 200.1. ibid.

*Gramen syluaticum angustifolium spica alba*, 8.2.XXI.vbi  
 reperitur ibid.  
*Gramen spicatum folio aspero*, 9.1.XXI. quo nomine à Da-  
 lechampion proponatur, ibid. vbi proueniat ibid.  
*Gramen Caryophyllatum nemorosum spica multiplici*, 9.1.  
 XXII.  
*Gramen Caryophyllatum montanum spica varia*, 9.1.XXIII.  
 vbi reperitur ibid.  
*Gramen spicatum foliis & spiciu hirsutis mollibus*, 9.2.  
 XXIV.  
*Gramen typhoides maximum spica longissima*, 10.1.  
 XXV.  
*Gramen Phalaroides minus siue Hispanicum*, 10.1. & 2.  
 XXVI. Phalaridi quomodo similis & dissimilis, ibidem.  
 Gillenius quo nomine transmissit ibid.  
*Gramen Phalaroides spica molli siue Germanicum*, 10.2.  
 XXVII. Vlmenses quo nomine id indigent, ibidem. vbi  
 prouenire soleat ibid.  
*Gramen alopecuroides spica aspera*, quo nomine apud Lug-  
 dunensem describatur 10.2.XXVII.  
*Gramen tomentosum alpinum & minus* 10.2.XXVIII.  
*Gramen spartum Basiliense siue capillaceo folio maius* 11.  
 1.XXIX.  
*Gramen spartum Hollandicum siue capillaceo folio minus*  
 11.1.XXX.  
*Gramen spartum Monspelacum capillaceo folio minimu*  
 11.1.XXXI.  
*Gramen spartum setas equinas referens* 11.1.XXXII.  
*Gramen spartum variegatum* 11.2.XXXIII.  
*Gramen foliis iuncis breuibz maius, radice nigra* 11.2.  
 XXXIV.  
*Gramen palustre iuncum racemoso semine* 11.2. XXXV.  
*Gramen iuncum folio articulo aquaticum*, 12.1.  
 XXXV.  
*Gramen montanum iuncum capite squamoso*, 13.1.  
 XXXVI.  
*Gramen iuncum minimum capitulo squamoso*, 13.1.  
 XXXVII.  
*Gramen iuncum minimum alterum*, 13.2. XXXVIII. à  
 priore quomodo differat ibid.  
*Gramen iuncum minimum maritimum* 13.2.XXXIX.  
*Gramen Cyperoides latifolium spica spadiceo viridi maius*  
 13.2.XL.  
*Gramen Cyperoides angustifolium spica spadiceo viridi*  
 minus 13.2.XLI.  
*Gramen Cyperoides spica pendula longiore & angustiore*  
 13.2.XLII.  
*Gramen Cyperoides spici minoribus minusq. compactis*,  
 13.2.XLII. quoniam eius sint differentia 14.1.XLIII.  
 X 3 Gramen



# INDEX

Gramen arundinaceum plimofam album 14.1. XLIV.  
Gramen nemorosum paniculis albis capillaceo folio, 14.2. XLV.  
Gramen holosteum alpinum minimum 14.2. XLVI.  
Graminis hirsuti differentia quotnam dentur, 15.1. XLVI.  
Gramen hirsutum latifolium minus iunce panicula, ibid.  
Gramen hirsutum capitulis psyllij 15.2. XLVI.  
Gramen hirsutum angustifolium maius 16.1. XLVII.  
Gramen spica subrotunda echinata, vel gramen echinato capitulo 16.2. XLVIII.  
Gramen spica plana echinata 16.2. XLIX.  
Gramen montanum panicula miliacea sparsa 17.1. L.  
Gramen arundinaceum panicula miliacea 17.1. LI.  
Gramen arundinaceum Sorghipanicula sparsa 17.2. LII.  
Gramen latifolium spica triticea compacta 18.1. LIII.  
Gramen latifolium spica triticea diuisa 18.1. LIV. a priore quomodo differat ib.  
Gramen angustifolium spica triticea compacta 18.1. LV.  
Gramen angustifolium spica tritici mutica simili, 18.2. LVI.  
Gramen spica secatina, 18.2. LVII. vbinam proueniat ibid.  
Gramen spica briza maius, 19.1. LVIII. vbi reperitur ibid.  
Gramen spica briza minus, ibi. LIX. vbi locorum proueniat ibid.  
Gramen loliaceum latifolium spica angustiore, ib. LX. cui sit simile ibid.  
Gramen loliaceum minus spica simplici ibid. LXI.  
Gramen loliaceum minus supinum, spica multiplici, ibid. LXII.  
Gramen maritimum panicula loliacea ibid. LXIII.  
Gramen montanum auenaceum locustis rubris, 20.1. LXXI.  
Gramen auenaceum lanuginosum glumis rarioribus 20.2. LXXII.  
Gramen glumis varijs 21.1. LXXIII.  
Grass Polcy 108.2

## H.

**H**alinus minor 59.1  
Hastenbrod 4.2. IX.  
Helichryson Orientale 123.1  
Helichryso sylvestris flore oblongo similis 23.2. vbi nascatur ibid.  
Hesperis sylvestris flore paruo, 103.1. I. vbinam colligatur ibid.  
Hesperis sylvestris Hieracij folijs hirsuta, 103.1. II. vbi proueniat ibid.

Hieracium dentis leonis folio hirsutis asperum minus, 63.1. & 2.1.  
Hieracium minus glabrum 63.2. II.  
Hieracium dentis leonis folio obtuso minus ib. III.  
Hieracium dentis leonis folio floribus paruis ibid. IV.  
Hieracium dentis leonis folio bulbosum 63.2. V. & 64.1  
Hieracium tomentosum H spanicum 64.1. VI.  
Hieracium maximum asperum Chondrilla folio, 64.1. & 2. VII.  
Hieracium alpinum angustissimo oblongoque folio, ibidem VIII.  
Hieracium alpinum punilam Chondrilla folio, ibidem IX.  
Hieracium intubaceum flore luteo, ibid. X. alias Hieracium Aphacoides ib.  
Hieracium intubaceum flore magno albido ibid. XI.  
Hieracium proserum falcatum ibid. XII.  
Hieracium minimum falcatum 65.1. XIII.  
Hieracium montanum rap folium ib. XIV.  
Hieracium montanum folijs dentatis flore magno, ibidem XV.  
Hieracium ramosum magno flore 65.2. XVI.  
Hieracium alpinum non laciniatum flore fusco, ibid. XVII.  
Hieracium hortenje non laciniatum floribus atropurpureiscentibus ib. XVIII.  
Hipparis locustis, 25.1. V. vbinam locorum proueniat, ibid.  
Hippomarathrum Creticum, 76.1. vbinam locorum reperitur ibid.  
Holistium siue Leontopodium Creticum 98.2. vbinam proueniat ibid.  
Horminum Syriacum, 114.1. I. alias Aman vocatur 114.2.  
Horminum angustifolium laciniatum, 114.2. II. vbi proueniat ibid.  
Horminum minus album Betonica facie, 114.2. III. vbi nascatur ib.  
Hyacinthus minimus maritimus, 26.1. & 2. vbinam reperitur ib.  
Hyoecyanus Creticus luteus maior, 92.1. quibus locis proueniat ibid.  
Hypericum numularia folio 130.2  
Hysopus latifolius 107.2. eius species ib.  
Hysopifolia siue Gratiola minor, 108.1. folijs variat, ibid.  
Hysopifolia siue Gratiola minor, 108.1. folijs variat, ibid.  
Hysopoides, ib. alias Halinus aquaticus ibid.

## I.

**I**acea nigra angustifolia vel Lithospermum aruenfis folijs, 127.1. I. vbi obseruata, ib. altera huic similis ibi.  
Iacea integrifolia humilis, 127.2. I. vbi proueniat, ib. alias Iacea



# I N D E X.

*Iacea Austriaca repens* ibid.  
*Iacea capire longis aculeis spinosa*, 127. 2. III. à *Iacea montana* echinato capite est diuersa 128. I. III.  
*Iacea laciniata Sonchi folio*, siue *Iacea latifolia purpurea capitulo spinoso*, 128. I. I. V. alias *centaurium maritimum*, ibid.

*Iacea montana incana aspera capitulis hispida* 128. I. V.  
*Iacea montana candidissima Stabe foliis* 128. 2. VII.  
*Iacea montana incana laciniata capitulo hispido*, ibid. VI.  
*Iacea tomentosa capitulo spinoso*, 129. I. V. III. vbi colligatur ibid.

*Iacea Babylonica* ib. IX.  
*Iacea maritima siue Cineraria latifolia* 69. I. I.  
*Iacobaea rotundifolia incana*, 69. 2. II. vbi reperitur ibid.

*Iacobaea alpina foliis rotundis serratis*, 70. I. & 2. vbi proveniat ib.

*Iunci differentie quotnam* 21. 2  
*Iuncus acutus maximus caule triangulo*, 22. 2. I. vbi reperitur ibid.

*Iuncus exiguus montanus mucone carens*, ibid. I. vbi proveniat ib.

*Iuncus inutilis siue Chamaeschenos*, 22. 2. III. vbi crescat ibid.

*Iuncus acumine reflexo alter* ib. IV.  
*Iuncus acumine reflexo trifidus*, ibidem V. vbi reperitur ibid.

*Iuncellus capitulis equiseti fluitans*, 23. I. V. I. vbi proveniat ibid.

*Iuncus alpinus capitulo lanuginoso*, 23. 2. VI. I. quo loco reperitur ibid.

*Iuncus alpinus bombylinus*, ibidem VII. vbi loci proveniat ibid.

*Iuncus floridus minor* ib. IX.

## K.

**K**ali minus villosum, 133. I. I. cum figura kali albi Dodonæi quomodo conueniat ibid. vbi reperitur ibid.

alias kali hirsutum f. ljs *Spergule* ibid.

*Kali folio eximio*, 133. I. II. vbi nascatur, 133. 2. ad *Anthyloides* in Thaly accedere videtur ibid.

## L.

**L**actuca folio oblongo acuto, 60. I. I. cui sit similis ibid.

*Lactuca italica laciniata* ib. II.

*Lactuca peregrina* *Scutellaria dictum*, 110. 2. vbi nam

*copiose proveniat* 111. I.

*Lapathum maritimum fetidum* 56. I.

*Lapparosa*, 102. 2. à vulgata quomodo differat, ibid. apud Lipfenses frequenter reperitur ib.

*Lathyrus angustifolius* 148. 2

*Lenticula palustris latifolia punctata* 153

*Leucium luteum magno flore*, 102. I. à vulgari, Keiri dicto, quomodo differat, ibidem, quo tempore anni floreat, ibidem.

*Leucium luteum serrato folio* ib. II.

*Leucium luteum sylvestre hieracifolium*, ib. III. vbi reperitur ibid.

*Leucium album odoratissimum folio viridi*, 102. 2. IV. hoc per aliquot annos durat, si in cella asseruetur ibid.

*Leucium minimum Creticum* ib. V.

*Leucium maritimum minimum*, 103. I. VI. vbi locorum reperitur ibid.

*Leucanarcissus*. Vide *Pseudonarcissus*.

*Libanotis latifolia*, *aquilegia folio*, 83. 2. I. aroma & aristolochiam sapore redolet, ib. alias in mine *Seseli* *Æthiopici* folio *aquilegia* appellatur 84. I. I.

*Libanotis latifolia minor semine crasso*, ibid. II. alias *Cosium* amarum semine crasso ibid.

*Ligusticum siue Siler montanum angustifolium*, 85. 2.

*Ligustrum myrtifolium* 158. 2. I.

*Ligustrum foliis laciniatis* ibid. II.

*Lilium conuallium latifolium* 136. 2. II.

*Limonium maritimum minus foliolis cordatis*, 99. 2. I. quibus locis reperitur ibid.

*Limonium maritimum minimum*, ib. II. vbi nam loci proveniat ibid.

*Linaria Americana paruo flore* 106. 2. II.

*Linaria latifolia triphylla*, ib. III. alias *Linaria latifolia Valentina* ibid.

*Linaria capillacea folio erecta flore odoro*, 106. 2. IV. quibus locis proveniat, ib. eadem quoruplex ib.

*Linaria arvensis carulea erecta*, 107. I. V. duplici flore conspicua, alio in agris *Lusaria*, alio ad montem *Cetium*, ibi.

*Lupinus caruleus maior villosus* 148. I.

*Lupinus minimus* 148. 2

*Lychnis auricula vrsi facie*, 103. 2. I. quibus aliis nominibus vocetur ibid.

*Lychnis sylvestris minima exiguo flore*, ibi. II. vbi reperitur ibid.

*Lyfimachia hirsuta siliquosa paruo flore* 116. I. I.

*Lyfimachia minor* ib. II.

*Lyfimachia Chamaenerion dicta alpina*, 116. I. III. vbi proveniat ibid.

*Malva*



**M** Alua folio seu 157.1.I.  
 Malua folio vario 157.1.II.  
 Malua Americana 157.1.III.  
 Marrubium palustre hirsutum tenuius laciniatum, 110.2.  
 I. quo solo gaudeat ibid.  
 Marrubium album villosum, 110.2.II. vbi reperitur ib.  
 Marrubium album crispum ib. III.  
 Melampyrum luteum linariae folio, 112.1. quo mense & loco  
 floreat 112.2.  
 Meleageta siue grana Paradisi 158.1.  
 Melilotus Hispanica folijs maculatis 144.  
 Mentha rotundifolia minor, seu flore globoso, 109.2. I. quibus  
 locis gaudeat ibid.  
 Mentha radice geniculata, 109.2. II. alias Mentha tubero-  
 sa, & Nepetha angustifolia odorata ibid.  
 Mentha Cattaria minor 110.1. III.  
 Mentha Cattaria minor alpina, 110.1. IV. vbi proueniat  
 ibid.  
 Millefolium maximum umbella alba 72.1. I.  
 Millefolium purpureum maius ibid. II.  
 Millefolium incanum Creticum, siue Millefolium Dioscori-  
 dis, 72.2. III. in Creta quomodo vocetur ibid.  
 Millefolium aquaticum pennatum spicatum 73.1. IV.  
 Millefolium aquaticum cornutum 73.2. V.  
 Moly Africanum umbella purpurascens, 28.1. I. quam ha-  
 beat odorem ibid.  
 Moly moschatum capillaceo folio 28.2. II.  
 Muscus pennatus, 151.1. I. quibus locis reperitur, ibid. eius  
 altera species ibid.  
 Muscus filicinus minor 151.1. II.  
 Muscus abietis facie 151.2. III.  
 Muscus ramosus repens ibid. IV. huic similis alter ib.  
 Muscus ramosus erectus maior, ibid. V. vbinam reperitur  
 ibid.  
 Muscus ramosus erectus minor ib. VI.  
 Muscus saxatilis ericoides ib. VII.  
 Muscus stellatus roseus, ibid. VIII. vbinam proueniat ibid.  
 Muscus Cupressiformis 152.1. IX.  
 Muscus polytrichoides, ibid. X. quotuplex sit, ibid. vbi re-  
 peritur ibid.  
 Muscus terrestris Coralloides incanus 152.1. XI. vbinam nascatur  
 ibid.  
 Muscus terrestris, coralloides, erectus, cornibus rufescentibus  
 ibid. XII.  
 Muscus Ceranoides 152.1. XIII. quotuplex sit ibid.  
 Muscus aquaticus folio expanso, 152.2. XIV. vbi reperitur  
 ibid.

Muscus fontanus siue Hepatica aquatica ib. XV.  
 Muscum fontanum capitulis acemosis 152.2.  
 Muscus pyxioides quotuplex ib. XVI.  
 Myagrum fetidum, 51.2. I. cursi dictum ibid.  
 Myagrum monospermon latifolium, 51.2. & 52.1. II. Pseu-  
 doisadis ab Alpino vocatum 52.1. II.  
 Myagrum monospermon minus 52.1. II.  
 Myagro similis siliqua rotunda 52.1. IV.  
**N** Apobrasica 54.1. I.  
 Napus sylvestris Cretica 58.1.  
 Narcissus angustifolius albus minor 27.1. I.  
 Nardo Celtica similis inodora 88.2.  
 Nasturtium hortenense quotuplex 44.1. & 2.  
 Nasturtium hortenense latifolium 43.1.  
 Nasturtium hortenense crispum angustifolium 43.2.  
 Nasturtium hortenense crispum latifolium 44.1.  
 Nasturtium hortenense crispum 44.2. I.  
 Nasturtium pratense paruo flore ibid. II.  
 Nasturtium aquaticum maius & amarum, 45.1. II. in-  
 terdam Sisymbrium vocatur, & saepe inter Nasturtium  
 aquaticum supinum reperitur ibid.  
 Nasturtium sylvestre minus 45.1. III.  
 Nasturtium alpinum minus Reseda foliis 45.2. IV.  
 Nasturtium alpinum capsula Nasturtij hortenensis, ibidem.  
 V.  
 Nasturtium alpinum Bellidis folio maius 46.1.  
 VI.  
 Nasturtium foliis Barbareae ibid. VII.  
 Nigella latifolia flore maiore simplici caeruleo 75.1. I.  
 Nigella Cretica 75.2. II.  
 Nummularia flore purpurascens, 136.1. vbinam proueniat  
 136.2.

O.

**O** Cimum latifolium maculatum 109.2.  
 Onobrychis clypeata aspera minor, 149.2. I. vbi colli-  
 gatur ibid.  
 Onobrychis clypeata laevis, ibidem II. vbinam proueniat,  
 ibid.  
 Onobrychis incana, 149.2. III. vbi locorum reperitur, ib.  
 altera huic similis ibid.  
 Ophioglossum anguloso folio 150.1. I.  
 Ophioglossum minus, ibidem II. quibus locis proueniat,  
 ibid.  
 Ophris minima, Ophridium seu Bisfolium Brocenbergicum  
 31.2.  
 Orchis.



# I N D E X.

ib XV.  
152.2.  
ib XVI.  
ibid.  
L. II. Pseu-  
52.1.II.  
52.1.II.  
52.1.IV.  
54.1.I.  
38.1.  
27.1.I.  
88.2.  
44.1. & 2.  
43.1.  
43.2.  
44.1.  
44.2.1.  
ibid II.  
15.1.II. ir-  
Nasturtium  
ibid.  
45.1.III.  
45.2.IV.  
is, ibidem.  
46.1.  
ibid. VII.  
75.1.I.  
75.2.II.  
a proueniat.  
109.2.  
L. vbi colla-  
ibid.  
proueniat.  
eriat, ib.  
ibid.  
150.1.I.  
proueniat.  
enbergicum  
31.2.  
Orchis.

Orchis. Vide Cynosorchis.  
Orchis montana Italica flore ferrugineo lingua oblonga 29.  
1.V.  
Orchis macrophylla 29.2.V.  
Orchis palmata angustifolia minor flore odoratissimo, 30.  
1.VII.  
Orchis palmata pratensis angustifolia maior ib. VI.  
Orchis palmata flore viridi 30.2.VIII.  
Orchis palmata montana maxima 31.1.IX.  
Origanum sylvestre humile, 109.1. vbi copiose reperitur,  
109.2.  
Orobanchae flore maiore ex caruleo purpurascens, 31.2.I.  
Orobanchae vulgaris, Theoph. Limodorum, & quare ita dicta.  
ibid. II.  
Orobanchae Hypopitys, ib. III. quomodo à vulgari differat, ib.  
Orobanchae alpinus latifolius, 149.2. vbi proueniat ibid.  
P.  
Paeonia flore pallido folio hirsuto 139.  
Papauer erraticum Pyrenaicum luteo flore 92.2. II.  
Papauer spinosum, 93.1. II. qualem odorem referat, ib. quo  
anni tempore floreat, ib. eius semen ex Anglia primo, no-  
mine Figo del inferno, id est, Ficus infernalis, allatum,  
ib. an Glaucium sit Dioscoridis ib.  
Perfoliata alpina latifolia minor, 129.2. I. vbi reperitur,  
ibid.  
Perfoliata alpina angustifolia maior, siue folio anguloso,  
129.2. II. (ibid.)  
Perfoliata alpina angustifolia media, ibid. III. vbi nascatur  
Perfoliata alpina angustifolia minor, 129.2. IV. vbi legatur  
ibid.  
Perfoliata alpina angustifolia minima, ibid. V. inter Perfo-  
liatam & Bupleurum media, 130.1. vbi reperitur, ibid.  
Perfoliata minor ramis inflexis 130.1. VI.  
Periscaria angustifolia 43.2.  
Pimpinella saxifraga tenuifolia 84.2. I.  
Pimpinella angustifolia inodora, ib. II. alias Pimpinella mi-  
nor Hispanica ib.  
Pisum umbellatum 147.2.  
Plantago maxima tota glabra, 97.2. I. vbi locorum repe-  
riatur ibid.  
Plantago quinqueruina caulium summitate foliosa, ibid.  
II. a vulgari quomodo differat, ibid. vulgaris vbi reperia-  
tur 98.1.  
Plantago trinerua angustissimo folio, 98.1. III. hac ad vias  
maxime ad rudera, reperitur ibid.  
Plantago angustifolia paniculis lagopi, 98.1. IV. vbi copiose  
proueniat ib.  
Polium latifolium incanum Creticum, 108.2. alias Polium  
platiphyllum Cydoniense ibid.

Polygonatum latifolium minus flore maiore, 115.2. I. vbi  
proueniat ib.  
Polygonatum latifolium perfoliatum Brasiliense, ib. II.  
Polygonum saxatile 131.1. I.  
Polygonum Creticum thymifolio ibid. II.  
Polygonum latifolium minus flosculis spadiceo albicanibus,  
131.1. III.  
Polygonum ποικίλον & λευκον ib.  
Polygonum minus lentifolium, 131.1. IV. vbinam reperia-  
tur 131.2. IV.  
Potamogeton racemosum angustifolium, 101.1. I. alias tri-  
bulum aquaticum minus ibid.  
Potamogeton gramineum ramosum, ib. II. alias Fontilapa-  
thum gramineum ibid.  
Potamogeton minimum capillaceo folio, ibid. III. vbi proue-  
niat ib.  
Potamogeton capillaceum, capitulis ad alas trifidis, ib. IV.  
& 101.2.  
Pseudonarcissus gramineo folio, siue Leuconarcissus aestiuus,  
27.1. II. (ibid.)  
Psyllium Indicum foliis crenatis, 99.1. I. quo tempore floreat  
Psyllium minus, ib. II. quo mense floreat, 99.2. alias Gotthe  
rubrum & album ibid.  
Pulegium foliis nummulariae 109.1.  
Pulsatilla palustris 94.1. I.  
Pulsatilla apii folio vernalis flore maiore, ibi. I. & 94.2. II.  
quo loco proueniat ibid.  
Pulsatilla apii folio vernalis flore minore, 94.2. III. & quo  
mense floreat ibid.  
Pulsatilla apii folio autumnalis, ib. IV. quo loco, & mense  
floreat ibid.  
Pulsatilla folio anemones secundae, vel subrotundo, ib. V. a-  
lias Pulsatilla latifolia ibid.  
Pyrola Alpinæ flore maior & minor, Europaea & America-  
na, 100.1. & 2. Europaeam sub herba trientali Val. Cor-  
dus posuit, ibid. & alij qualiter & quibus sub locis, ibid.  
Pyrola Alpinæ flore Brasiliense, 100.2. vbinam reperta,  
ibid. & 101.1.

Q.  
Quercus maritima quatuorplex 154.1.  
Quinquefolium album minus, 139.1. vbi colligatur,  
139.2. I.  
Quinquefolium album minus, 139.2. II. vbi locorum repe-  
riatur ibid.  
Quinquefolium montanum luteum erectum hirsutum, ib. II.  
Quinquefolium simile enneaphyllum hirsutum, ib. IV. vbi nasci-  
tur ibid.  
R.  
Ranunculus montanus subhirsutus latifolius, 96.1. VI.  
quibus locis proueniat ibid.  
Ranunculus



# I N D E X.

<i>Ranunculus montanus lanuginosus foliis ranunculi pratensis repentis</i> ib. VII. vbinam reperiri soleat	96.2. VI.	<i>Salix saxatilis minima</i>	ib. VII.
<i>Ranunculus saxatilis magno flore</i> , 96.2. VIII. quibus locis crescat	ib.	<i>Salvia folio serrato</i>	113.2. I.
<i>Ranunculus saxatilis folijs subrotundis</i>	ibid. IX.	<i>Salvia folio subrotundo</i>	ib. II.
<i>Ranunculus minimus saxatilis hirsutus</i> ib. X. vbi proveniat	ibid.	<i>Salvia lanuginosa angustifolia</i>	113.2. III.
<i>Ranunculus villosissimus Monspiliacus</i> , ib. X. I. quibus locis reperiat	ib.	<i>Sanamunda viridis vel glabra</i> , 160. vbi colligatur	ib.
<i>Ranunculus nemorosus Anemones flore minor</i> , 95.1. I. à vulgato quomodo diff. rat	ibid.	<i>Sanicula montana minor</i> , 115. 1. I. quomodo variet, & vbi proveniat	ibid.
<i>Ranunculus rotundifolius repens echinatus</i> ib. II. vbi proveniat	ib.	<i>Sanicula alpina minima pilosa</i> , 115. 2. I. vbi reperiat	ibid.
<i>Ranunculus palustris echinatus</i> ib. III. quibus locis gaudet	ibid.	<i>Saponaria concava Anglica</i> , 103. 1. quo anni tempore, & in qua regione floreat, 103.2. alias <i>Gentiana concava dicta</i>	ibid.
<i>Ranunculus grumosa radice folio ranunculi bulbosi</i> , 95.2. IV.		<i>Scabiosa peregrina rubra</i> , 125. 2. I. alias <i>Scabiosa Indica à Clusio dicta</i>	ibid.
<i>Ranunculus geranij tuberosi folio</i> , ibid. V. alias <i>Batrachium verum</i>	ib.	<i>Scabiosa folio Sinapi sylvestris</i>	ibid. I.
<i>Raphanus Creticus</i>	38.2.	<i>Scabiosa prolifera folijs Gingidij</i>	126.1. III.
<i>Raphanus aquaticus folijs in profundas laciniis divisis</i> , 38.2.		<i>Scabiosa prolifera quatuorplex</i>	ibid.
<i>Raphanus aquaticus alter</i>	38.1.	<i>Scabiosa prolifera folijs in latiores laciniis divisis</i> , 126.1. III.	
<i>Rapistrum floribus Leucoj marini</i>	37.1. I.	<i>Scabiosa prolifera folijs tenuius incis</i>	ibid.
<i>Rapistrum monospermon</i>	ibid. II.	<i>Scabiosa montana dentis leonis folio</i> , 126.2. IV. vbi reperiat	ibid.
<i>Rapunculus spicatus spica alba vel cinericea</i>	33.1.	<i>Scabiosa stellata minima</i>	ibid. V.
<i>Rapunculus alpinus siue pyramidalis minor</i>	ib. I.	<i>Scabiosa argentea angustifolia</i> , 127. 1. VI. vbi proveniat	ibid.
<i>Rapunculus a'pinus corniculatus</i>	33.2. II.	<i>Scandrix Cretica maior</i>	78.1. & 79.1. I.
<i>Reseda linari folijs</i>	42.1.	<i>Scandrix semine rostrato Italica</i>	78.2.
<i>Reseda minor alba, quam Sesamoidem parvam Salmanticensem Clusius vocat</i>	ibid.	<i>Scandrix Cretica minor</i> , 79. 1. II. quam eius varietas, 79.2. II.	
<i>Reseda affinis Phyteuma</i>	ib.	<i>Scandrici quæ herba maxime quadret</i>	80.2. I.
<i>Ribes montana oxyacantha sapore</i>	160.2.	<i>Scrophularia flore luteo</i>	112.2. I.
<i>Ribes quatuorplex in Helueticorum alpihus reperiat</i> , ibi vbi proveniat	ibid.	<i>Scrophularia folijs laciniatis</i>	113.1. II.
<i>Rubia montana angustifolia</i> , 145. 1. I. vbinam proveniat	ib.	<i>Secale latifolia</i>	26.2.
<i>Rubia pratensis levis acuto folio</i> , 145. 1. II. vbi reperiat	ib.	<i>Scorodotis Cretica</i>	113.2.
<i>Rubia quadrifolia rotunda levis</i> , ib. III. vbi crescat	ib.	<i>Sedum tridactylites alpinum maius</i> , 131.2. I. alias <i>saxifraga alba petrea</i> i' id. simili e, sed folijs latioribus, & in ternis primum profundas laciniis divisis, ibid. aliud cauliculis rotundo, semipalmari	i' id.
<i>Rubia angustifolia spicata</i> , 155. 1. IV. vbi nascatur	ib.	<i>Sedum tridactylites alpinum minus</i> , 131.2. II. vbi reperiat	ibid.
<i>Rubeola aruensis carulea repens</i>	145.2. V.	<i>Sedum montanum ericoides</i>	132.1. II.
<i>Rubeola saxatilis</i>	ib. VI.	<i>Sedum alpinum ericoides carulorum</i> , 132.1. I. V. vbi nascatur	ibid.
<i>Rubeola maritima aspera</i> , 146.1. VII. vbi legatur	ib.	<i>Sedum saxatile hirsutum purpureum</i> , ibi I. V. vbi proveniat	ibid.
<i>Rubia cynanch ca saxatilis</i> , ibid. VIII. vbi proveniat	ib.	<i>Sedum saxatile atrovirentibus floribus</i> , ib. VI. vbi n. nihil alt. us excrecat	132.2. VI.
S.		<i>Sedum saxatile variegato flore</i> , 132.2. VII. vbi copiose proveniat	ibid.
<i>Salix alpina Pyrenaica</i>	159.2. VI.	Sedum	
<i>Salix alpina angustifolia repens</i>	ib. V.		
<i>Salix fragilis</i>	159.1. I.		
<i>Salix oblongo incano folio</i>	ib. II.		
<i>Salix subrotundo argenteo folio</i>	ib. III.		
<i>Salix humilis latifolia erecta</i>	159.2. IV.		



# I N D E X

ib. VII.	Sedum alpinum foliis crenatis asperis	132.2. VIII.	Thlaspi saxatile rotundifolium	ib. VII.
113.2. I.	Sedum aruense flore rubente, ib. IX. vbi reperitur	ib.	Thlaspi alpinum folio paruo crenato, vel Thlaspi alpinum minus capitulo rotundo	48.2. VII.
ib. II.	Serpentaria triphylla Brasiliiana, 101.2. vbinam reperitur	ibid.	Thlaspi alpinum maius capitulis rotundis	49.1.
113.2. III.	ibid.		Thlaspi montanum incanum luteum	49.2.
ur ib.	Serpillum latifolium subhirsutum	108.2.	Thlaspi alpinum repens, 49.1. VII. quomodo variet ratione loci	ibid.
et, & vbi	Seseli montanum Cicuta folio hirsutum	85.1. I.	Thlaspi biscutatum villosum flore calcari donata, 49.2. VI. I.	
ibid.	Seseli pratense tenuifolium, siue Daucus pratensis tenuifolius	85.1. & 2. II.	Thlaspi fruticosum Leucofolio latifolium	ib. IX.
reperitur,	Seseli palustre lactescens	85.2. II.	Thlaspi Alexandrinum	50.1. X.
mpore, &	Sideritis foliis oblongis glabris	111.1. I.	Thymum inodorum	158.2.
a concaua	Sideritis alsine triaginis folio, 111.2. II. vbi reperitur, ib.		Trachelium. Vide Campanula foliis subrotundis.	
ibid.	Sinapi paruum filiqua aspera	41.2. I.	Tragopogon folio sinuato	129.1. I.
a Indica à	Smyrniium peregrinum folio oblongo	82.1.	Tragopogon tenuissime laciniatum	ib. II.
ibid.	Solanum tuberosum esculentum, 89.1. I. in Austria quale habetur 90.1. I. odorem qualem refert	ib.	Trifolium montanum purpureum folio acuto crenato, 140.1. I. quo anni tempore floreat, ib. & vbinam reperitur, ib.	
ibid. I.	Solanum somniferum secundum, ib. an veteribus cognitum	90.2. II.	Trifolium montanum purpurascens folio obruso crenato, ib. d. II.	
26.1. III.	Solanum huius radicibus Indi panis loco vtuntur	ib.	Trifolium montanum lupulinum, 140.1. III. vbi nascatur ibi.	
ibid.	Solanum racemosum cerasorum forma	90.2. II.	Trifolium capitulo spumoso laui, ib. IV. quib. locis proueniat ibid.	
126.1.	Solanum triphyllum Brasiliianum	91.1. III.	Trifolium capitulo spumoso aspero maius, 140.1. V. vbi reperitur	140.2.
ibid.	Solanum Mexiocanum lasiniium Indicum dictum flore minore	91.2. IV.	Trifolium capitulo spumoso aspero minus, 140.2. VI. vbi proueniat	ibid.
i reperia-	Sonchus asper laciniatus Creticus	62.2. I.	Trifolium capitulis Thymi, ib. VII. vbi nascatur	ib.
ibid.	Sonchus asper subrotundo folio ib. II. qua eius species 61.1. II.		Trifolium capitulo oblongo aspero	140.2. VIII.
roueniat,	Sonchus laui in plurimas tenuissimas lacinias diuisus, ib. III.		Trifolium cochleatum folio minuto obruso fructu latiore	ib. IX.
79.1. I.	Sonchus angustifolius maritimus	61.1. IV.	Trifolium cochleatum polycarpon, 141.1. X. huic simile alterum, ib. quomodo ab inuicem differant	ib.
78.2.	Sonchus montanus laui laciniatus minor	ibid. V.	Trifolium cochleatum echinatum minus	141.1. XI.
varietas,	Sonchus villosus luteus minor ibid. VI à quibusdam Hieracium tomentosum dicitur	61.2. VI.	Trifolium fructu duro spinis horrido, 141.2. XII. vbi legatur	ibid.
80.2. I.	Sparganium minimum	24.2.	Trifolium folliculis corona similis, ib. XIII. vbi proueniat ib.	
112.2. I.	Sphondylium hirsutum foliis angustioribus, 83.1. I. à vulgari quomodo differat	ibid.	Trifolium peltatum Creticum, 142.1. XIV. alias Trifolium Creticum odoratum	ibid.
113.1. II.	Sphondylium alpinum paruum	ib. II.	Trifolium spinosum Creticum, 142.2. XV. alias Trifolium spinosum semper virens	143.1.
26.2.	Sphondylium alpinum glabrum	83.1. & 2. III.	Trifolium stellatum, 143.1. XVI. quo anni tempore & loco colligatur	ibid.
113.2.	Styrax liquida	158.2.	Trifolium globoso flore, vel capitulo Lagopi rotundiore, 143.1. XVII. quo mense & quo loco proueniat	ib.
saxifraga in ter-	Sumach angustifolium, 158.1. vbinam prouenire soleat, ib. T.		Trifolium globosum repens	143.2. XVIII.
ud cauli-	Anacetum alpinum	70.1.	Trifolium saxatile hirsutissimum, ib. XIX. vbi legatur ibid.	
i id.	Telephium purpureum minus, 133.2. vbinam colligatur	ibid.	Trifolium alpinum flore magno radice dulci, quib. locis nascatur, ib. eius radix quo sapore sit prædita	ib. XXI.
reperia-	Teucrium alpinum inodorum magno flore, 116. vbi nascatur	ibid.	Trifolium corniculatum minus pilosum, 144.1. XXI. vbi proueniat	Trifolium
131.1. II.	Thalictrum angustifolium	146.2. I.		
113.1. III.	Thalictrum minimum fetidissimum, 147.1. II. vbi reperitur, ib. huic simile	ibid.		
nascatur	Thlaspi vaccaea folio, Bursa pastoris filiquis	47.1. I.		
roueniat	Thlaspi vacaria incano folio minus	47.2. II.		
nnihil	Thlaspi villosum capillis hirsutis	47.1. & 2. III.		
2.2. VI	Thlaspi Creticum flore albo	48.1. IV.		
10. e pro				
ibid				
Sedum				



# INDEX.

Trifolium corniculatum frutescens tenuissimis foliis. ibid. XXII.	Valeriana alpina prima. ibid. III.
Trifolium angustifolium repens folliculis rotundis. 144. I. XXIII.	Valeriana alpina scrophularia folio. 87. I. IV. in quo cum Valeriana sylvestri conueniat. ibid.
Tussilago alpina folio oblongo 101. 2. vbi locorum proueniat ibid.	Valeriana alpina minor. 87. 2. V.
Tithymallus incanus hirsutus 133. 2. I.	Valeriana peregrina purpurea albave. ibid. VI. in quo cum Nardo montana conueniat. 88. I. VI. alias Valeriana Sicula. ibid. item Valeriana Indica Imperati, & Nardus Cretica, tandemq. Tripolium. ibid.
Tithymallus sine Esula exigua foliis obtusis, ibid. II. vbi reperiatur ibid.	Valeriana rubra angustifolia. 88. 2. VII.
Tithymallus exiguus saxatilis 133. 2. vbi proueniat ibid.	Verbascum foliis rotundis flore blattaria. 114. 2.
	Verbena nodiflora. 125. I.
	Veronica alpina bellidis folio hirsuta. 116. I. I. vbi reperitur. 116. 2.
V	Vicia Onobrychidis flore. 149. I. vbinam proueniat. ibidem.
Valeriana palustris maior profunde laciniata 86. 2. I. in quo cum Valeriana vulgari conueniat. ibid.	
Valeriana palustris inodora parum laciniata. ibid. II.	

## ERRATA.

Fol. 18. l. 14. secalina, ipsi secali, ibid. l. 19. liliacea. fol. 19. l. 11. terna, ibid. l. 29. murino. fol. 19. l. 29. asperis. fol. 20. l. 12. donatur. fol. 22. l. 2. capillaceum. fol. 43. l. 12. appellauit. fol. 63. l. 6. quandoque. fol. 67. l. 14. brachiatos. fol. 69. l. 16. absque. fol. 79. l. 14. sub asperis. fol. 90. l. 36. vernalique. ibid. l. vlt. nomine.

## FINIS.





id. III.  
o cum  
ibid.  
2.V.  
o cum  
riana  
Nar-  
ibid.  
VII.  
14.2.  
125.1  
eria-  
16.2.  
ibi-



005644670



